

801-16  
336

801-88  
8632-6

У 289  
149

ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ

# ДОМАШНІЙ ЛЕЧЕБНИКЪ

СЪ НАСТАВЛЕНІЕМЪ

ВЪ СОВОКУПНОМЪ ПОЛЪЗОВАНІИ БОЛѢЗНЕЙ

**ХОЛОДНОЮ ВОДОЮ.**

СОЧИНЕНІЕ

ДОКТОРА ГРИМА.

*Переводъ съ нѣмецкаго.*

ИЗДАТЕЛЬ А. ФОРБРИХЕРЪ.

---

**МОСКВА.**

ВЪ ТИПОГРАФІИ АЛЕКСАНДРА СЕМЕНА,  
на Софійской улицѣ.  
1857.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Цен-  
сурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва,  
Августа 20 дня 1887 года.

Ценсоръ В. Флеровъ.



68

66

ПРЕДИСЛОВІЕ

Со времени открытія докторомъ Самуиломъ Гане-  
маномъ гомеопатіи явилось много сочиненій и меж-  
ду ними много весьма дѣльныхъ и полезныхъ ,  
которыя разъяснили и сущность гомеопатіи, спо-  
собъ и образъ употребленія ея у людей и живот-  
ныхъ ; съ другой стороны люди образованные , но  
не посвятившіе себя исключительно медицинѣ, изда-  
ли свои наблюденія въ пользу страждущаго челове-  
чества ; и въ послѣднее время является множество  
сочиненій, относящихся до гомеопатіи, а потому каза-  
лось бы излишнимъ издавать въ свѣтъ этотъ незна-  
чительный трудъ. Но авторъ почитаетъ непремѣн-  
нымъ долгомъ обнародовать свѣденія въ области ле-  
ченія , сообразующагося съ природою, — свѣденія ,  
добытыя имъ долготѣною практикою. Онъ имѣетъ  
причины питать лестную надежду, что доставить го-



меопатіи, можетъ быть, нѣсколько новыхъ послѣдователей — особенно изъ числа сельскихъ жителей, которымъ книжка его можетъ принести нѣкоторую пользу. Лѣтъ десять тому назадъ провинціалы смѣялись еще надъ ничтожностію гомеопатическихъ лекарствъ, судили о медицинскомъ леченіи по количеству пущенной крови, слабительныхъ и потогонныхъ средствъ, по количеству и часто даже по цѣнѣ прописываемыхъ лекарствъ. Но теперь, не только перестали презрительно отзываться о гомеопатіи, имѣя предъ глазами примѣръ того или другаго изъ своихъ сосѣдей, но даже обратились къ ней съ любовью, потому что убѣдились, что отъ нея можно ожидать много добра и пользу въ самыхъ упорныхъ болѣзняхъ. Авторъ знаетъ и въ своемъ сосѣдствѣ много деревень, жители которыхъ лечатъ какъ себя, такъ и домашній скотъ не иначе какъ гомеопатически, и чувствуютъ себя гораздо лучше, нежели прежде. Онъ отъ души желаетъ, чтобы этотъ примѣръ находилъ болѣе и болѣе послѣдователей, чтобы гомеопатія все болѣе и болѣе укоренялась въ народѣ. Съ цѣлю содѣйствовать этому, онъ записалъ свои наблюденія. Впрочемъ у него была еще и другая побудительная причина. Нельзя отрицать пользы приносимой гидропатіею; водолечебныя заведенія, быстро распространяющіяся, опыты сдѣла-

ные надъ больными всякаго рода, доказываютъ, что гидропатія вправѣ занять мѣсто, если не выше гомеопатіи, то по крайней мѣрѣ на ряду съ нею. Такъ какъ ни одинъ разсудительный человѣкъ не можетъ не сознаться въ благотворныхъ дѣйствіяхъ той и другой методы леченія, то авторъ думаетъ, даже твердо убѣжденъ, что гомеопатія дѣйствовала бы еще блистательнѣе, если бы, въ извѣстныхъ случаяхъ, употребляли въ соединеніи съ нею и холодную воду. Желалъ бы я знать человѣка, который въра гомеопатіи, станетъ отрицать, что наружное и внутреннее употребленіе холодной воды сильно способствуетъ дѣйствію гомеопатическихъ лекарствъ. Желалъ бы я знать доктора гидропата, не враждующаго съ гомеопатіею, который не сознается, что леченіе водою приносило бы большую пользу, если бы въ тоже время позволили и гомеопатіи дѣйствовать на больного. По этому желанію и стремленію автора клонится къ соединенію обоихъ способовъ леченія, съ тою цѣлю, чтобы люди, заболѣвшіе, какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ скорѣе выздоравливали и такимъ образомъ возникло бы мало по малу болѣе здоровое, сильное человечество и упрочилось бы въ семействахъ счастье и благоденствіе.

Съ этою цѣлю, преимущественно, авторъ написалъ эту книжку, сообщая въ ней частію свои собственные наблюденія въ области гомеопатіи и гидропатіи, частію наблюденія другихъ ученыхъ медиковъ, и предлагаетъ свой взглядъ на совокупное употребленіе гомеопатіи и гидропатіи въ различныхъ болѣзняхъ.

*Докторъ Х. Гримъ.*

## ВВЕДЕНИЕ.

Такъ какъ въ новѣйшее время Гомеопатія въ сущности своей извѣстна весьма многимъ, то я считаю лишнимъ распространяться объ этомъ предметѣ. При томъ же всякому очень хорошо извѣстно, что такое : здоровье и болѣзнь, потому что первымъ онъ можетъ и долженъ наслаждаться, а послѣдняя или заставляетъ его оставаться дома, или лежать въ постели.

И такъ съ соблюденіемъ всевозможной краткости скажу о Гомеопатіи слѣдующее : Докторъ Самуэль Христіанъ Ганеманъ, родившійся въ Мейсенѣ 10-го Апрѣля 1755 года, замѣтилъ, проникъ своимъ острымъ взглядомъ слабости, несовершенства и ошибки рациональнаго способа леченія Аллопатіи и началъ неутомимо помогать преобразовать Медицину. Занятіе Химіею и Металлургіею, которымъ онъ предавался всею душою, дало ему средство къ успѣшному исполненію своего намѣренія, которое клонилось къ пользѣ человѣчества: наконецъ его железному терпѣнію удалось достигъ того, чего желалъ и къ чему

стремился — преобразовать Медицину. Конечно, его прежнія медицинскія познанія были ему въ этомъ дѣлѣ бесполезны и должны были быть брошены, что онъ и сдѣлалъ. Въ то время, когда онъ производилъ опыты въ перемежающихся лихорадкахъ надъ дѣйствіемъ хлвнной корки, какъ радостное утро послѣ темной, полной ужаса ночи, возсіяла ему надежда найти путь къ скорой, вѣрной и легкой помощи больному человечеству самыми простыми средствами. И дѣйствительно, то, что вначалѣ составляло для него надежду, то чрезъ дальнѣйшіе опыты надъ лекарственными веществами обратилось уже въ твердое знаніе. Онъ могъ уже послѣ долгихъ многолѣтнихъ опытовъ и открытій выставить на судъ свое главное правило: *Similia similibus curantur*, т. е. чтобы помогать скоро, постоянно и вѣрно надобно выбирать такія лекарства, которыя бы произвели подобную же болѣзнь, отъ которой надлежитъ избавить больного. Для этого онъ пробовалъ давать лекарства особамъ совершенно здоровымъ, замѣчалъ перемѣны отъ того произходившія и вывелъ наконецъ законъ, что симптомъ той или другой болѣзни можетъ быть устраненъ тѣмъ самымъ средствомъ, которое производитъ подобныя имъ перемѣны въ здоровомъ человѣкѣ. Лекарства, дѣйствіе которыхъ онъ испытывалъ, конечно давались въ самыхъ малыхъ приѣмахъ, въ чистомъ видѣ и притомъ совершенно здоровымъ и крѣпкимъ лицамъ, преимущественно же себѣ и членамъ своего семейства. Такимъ образомъ лечилъ онъ больныхъ. Такъ какъ онъ хорошо постигъ симптомы болѣзни и вышеупомянутымъ образомъ производилъ опыты надъ множествомъ лекарствъ и зналъ уже признаки искусственно произведенной болѣзни, то ему легко было

найти приличное средство къ удаленію предстоящей болѣзни. Но чтобы найденное средство постоянно помогало, то оно должно быть немного сильнѣе предстоящей болѣзни. Дѣленіемъ на степени и развитіемъ силы, которая находится въ этихъ средствахъ, можно дѣлать ихъ болѣе или менѣе сильными. Это многократное дѣленіе послужило поводомъ къ насмѣшкамъ различнаго рода; скоро однакоже замолкли предъ тѣми результатами, которыхъ достигло блистательное открытіе. Съ теченіемъ времени число цѣлительныхъ гомеопатическихъ лекарствъ все болѣе и болѣе возрастало и по прошествіи нѣкотораго времени еще болѣе увеличилось.

Чтобы отдалить предстоящую болѣзнь, надо главнымъ образомъ изучить ея симптомы, проявленіе ихъ и виѣшніе признаки болѣзни: ибо всякая болѣзнь имѣетъ свои признаки. Итакъ каждому, желающему быть врачомъ, какъ самого себя, такъ и своего семейства, необходимо надо познаться съ этими симптомами и посредствомъ ихъ выбирать самое вѣрное изцѣляющее лекарство. Легко достигнуть этого знанія, если кто часто станетъ справляться въ отдѣльныхъ, нарочно вызванныхъ болѣзняхъ и постарается усвоить симптомы ихъ. Не должно притомъ думать, что большой приѣмъ приноситъ болѣе пользы больному, но надо давать лекарства не болѣе предписаннаго, именно взрослому человѣку не болѣе 3, а дѣтямъ не болѣе 2-хъ капель въ шести ложкахъ воды. Взболтавъ хорошенько, давать чрезъ каждые  $\frac{1}{2}$  часа или рѣже, чрезъ часъ, 2—3—4 часа по ложкѣ, глядя по обстоятельствамъ, усиливается ли болѣзнь или уничтожается. Въ острыхъ болѣзняхъ приѣмы лекарствъ повторяются чаще, въ хроническихъ рѣже — по приѣму въ день



или чрезъ день. При этомъ больной отнюдь не долженъ ни ѣсть, ни пить ничего такого, что можетъ остановить дѣйствіе гомеопатическихъ пріемовъ. Сюда принадлежатъ на пр. всѣ приносы, соусы, все жирное и спиртуозное. Я позволяю себѣ распространиться и представить читателямъ, какая пища запрещается въ это время и какая пѣтъ, какіе можно употреблять напитки и какихъ должно избѣгать.

*Запрещенная пища.* Свиное мясо, гуси, утки, колбасы, фаршированное мясо, также маринованныя сельди, килька, устрицы, угри, старый и тминный сыръ, здобныя печенья, крутыя яйца, чеснокъ, лукъ сельдерей, горчица, хрѣнъ, петрушка, тыква, рута, пикуль, шавель, мята, пеперментъ, рѣдька, редиска, базиликъ, маіоранъ, тминъ, спаржа, палфей, водяной укропъ, укропъ, можжевельникъ, пастернакъ, прыпый корень, цикорій, корица, лавръ, лимоны, гвоздика, шафранъ, горькій миндаль, ароматный шоколадъ, инбирь, перецъ, мускатъ, каперсы, ваниль и др.

*Дозволенная пища.* Свѣжая дичь, говядина, баранина, иногда жареная телятина, куры, индѣйки, не слишкомъ молодые голуби, не жирная ветчина безъ перцу, сервелашные колбасы безъ приносовъ, форели, щуки, тщательно вымытыя сельди, также караси безъ приносовъ и уксуса, свѣжее масло, не слишкомъ старый сыръ, яйца въ смятку, икра, бобы, морковь, цвѣтная капуста, шпинатъ, картофель, рисъ, крупа, мелкая крупа, каша, просо, саго, горохъ, чечевица и бобы. Изъ плодовъ можно употреблять: сладкія вишни, сливы, яблоки, груши. виноградъ, крыжовникъ, но только совершенно спѣ-

лый, малину, абрикосы, землянику, сухіе фрукты и варенья безъ приносовъ.

*Запрещенные напитки.* Всѣ минеральныя воды, крѣпкое вино, коньякъ, аракъ, ромъ, волка, всѣ ликеры, пуншъ, бишофъ, кардиналь, глогъ, лимонадъ, кофе, цвѣточный чай, чай изъ бузины, ромашка, валеріана, мелисса, кашка, мята, всякое крѣпкое пиво и всѣ напитки, которые содержатъ уксусъ или лимонную кислоту.

*Позволенные напитки.* Самый лучший напитокъ есть чистая вода, которая можетъ быть немного подслащена или въ соединеніи съ небольшимъ количествомъ слабаго вина, чистое, не слишкомъ крѣпкое, простое пиво, отваръ изъ свѣжихъ яблоковъ и сушеныхъ плодовъ, какао, ржаной и льняной кофе, молоко, не ароматный шоколадъ, и не крѣпкій черный чай.

Во время леченія каждый пациентъ долженъ избѣгать при чищеніи зубовъ всѣхъ зубныхъ порошковъ и тинктуръ, которыя всюду прославляются, но долженъ употреблять порошокъ изъ чистаго древеснаго угля или презжеженной хлѣбной корки. Долженъ избѣгать всѣхъ помадъ съ духами, ароматической воды, цвѣтовъ съ сильнымъ запахомъ, курительныхъ свѣчей, нюхательнаго табаку съ сильными духами, долженъ также избѣгать духоты въ комнатѣ, продолжительнаго сидѣнья и спанья, пиршествъ ночью, сырыхъ комнатъ и слишкомъ большаго напряженія духа, сильнаго потрясенія души, также и досадъ, скорби, печали, гнѣва и проч., а также и частаго удовлетворенія половыхъ органовъ.

Гомеопатическія лекарства должны заботливо сохраняться. Домашнія аптеки должны быть удалены

отъ сильныхъ испареній и комнатъ, гдѣ много накурено, или гдѣ слишкомъ тепло, или слишкомъ холодно. Лучше всего сохранять эти лекарства въ такихъ мѣстахъ, гдѣ они не подвергаются ни слишкомъ большому холоду, ни слишкомъ большому жару, гдѣ не дѣйствуютъ ни солнечные, ни свѣтовые лучи. Каждая стекляночка должна быть закупорена хорошенько послѣ каждого употребленія, чтобы ничего изъ нея не перешло въ другую стеклянку, на этотъ разъ, быть можетъ, дурно закупоренную. Каждая чашечка и ложка, которыя брались для мѣшанія и потомъ принятія гомеопатическихъ лекарствъ, должны быть вымыты нѣсколько разъ въ чистой водѣ. Единственно по соблюденіи всѣхъ этихъ предосторожностей можно будетъ ожидать, что гомеопатическое лекарство произведетъ цѣлительное дѣйствіе на больного. Испорченныя лекарства не помогутъ, потому что онѣ не въ состояніи пересилить и побѣдить того врага, который дѣйствуетъ въ больномъ человѣческомъ организмѣ.

Если же въ одно время съ гомеопатическимъ способомъ леченія употребляема будетъ и гидропатія т. е. леченіе водою, и если только предстоящая болѣзнь еще не успѣла окончательно разрушить органическихъ частей въ тѣлѣ, то всегда можно быть вполне увѣрену, что здоровье легко возвратитъ въ этомъ случаѣ. Не очевидно ли для всякаго безпристрастнаго человѣка, что всякое лекарство, особенно гомеопатическое, чисто динамическое, будетъ дѣйствовать лучше, скорѣе, постояннѣе въ такомъ тѣлѣ, соки котораго очищены водою, нежели въ тѣлѣ, которое наполнено мокротами, кислотами и разными нечистотами? Или не ясно ли для всякаго, что выпитая вода мгновенно промываетъ языкъ

пѣбо, глотку и желудокъ и дѣлаетъ ихъ способными принять въ себя силу гомеопатическихъ лекарствъ и проводить къ мѣсту назначенія скорѣе, чѣмъ въ то время, когда они покрыты слизью, нечистотами и проч.? И кто бы сталъ отвергать свойство воды очищать тѣло? Она не только значительно уменьшаетъ жаръ въ тѣлѣ во время воспаленій и лихорадокъ, и слѣдовательно играетъ роль утѣлительнаго напитка, но также очищаетъ зубы, глотку, желудокъ и освобождаетъ ихъ отъ всѣхъ скопившихся нечистотъ, которыхъ естественнымъ путемъ извергаетъ наружу. Она по причинѣ своей тяжести, тонкости и жидкости проникаетъ въ самыя тонкія жилы и нервы и очищаетъ ихъ отъ всего болѣзненнаго и вреднаго для здоровья. Она изъ всѣхъ жидкихъ тѣлъ, самая способная очищать желудокъ, который, отъ скопившихся въ немъ нечистотъ, находится въ обремененіи, и удаляетъ эти нечистоты чрезъ кишки, которыя тоже промываетъ. Она отнимаетъ у крови жаръ и остроту, освобождаетъ ее отъ кислотъ и производитъ то, что дурная кровь дѣлается свѣжею и быстро разносится по жизненнымъ сосудамъ. Ослабѣвшимъ внутреннимъ частямъ она тотчасъ даетъ новое значеніе, а если будетъ употребляема снаружи, какъ на пр. при ежедневныхъ умываньяхъ и купаньяхъ: то все тѣло получить новую жизнь и силу, всѣ органы тѣмъ безпрепятственнѣе совершаютъ свое отправленіе. Если же дѣйствію гомеопатическихъ лекарствъ помогать употребленіе холодной воды, то исцѣленіе не должно ли прияти скорѣе и несравненно вѣрнѣе и не должно ли тѣло отъ постоянного употребленія холодной воды такъ окрѣпнуть, что труднѣе подвергнется опять какой нибудь болѣзни? Кромѣ того, не есть ли

это вѣрное средство надолго сохранить свою жизнь? Я столько дѣлалъ по этому случаю наблюденій надъ собою и надъ другими лицами, что не могъ уже болѣе медлить обращеніемъ вниманія людей на то, что и они могутъ пользоваться этими средствами и приобрести крѣпкое здоровье. Но чтобы вода дѣйствовала сильно и возвращала бы больному въ самомъ скоромъ времени здоровье, требуется, чтобы ее употребляли въ то самое время, когда она свѣжа, когда только что принесена изъ колодца, чтобы еще оставался въ ней колодезный газъ. Она не должна содержать никакихъ постороннихъ составныхъ частей и особенно известковыхъ, которыя дѣйствуютъ весьма вредно на мочу и въ особенности на пузырь, производя каменную болѣзнь.

Всего выгоднѣе и лучше употреблять воду такимъ образомъ: какъ скоро вы проснулись, выполоскайте нѣсколько разъ холодною водою ротъ и зубы такъ, чтобы не оставалось тамъ остатковъ пищи и чтобы освободить отъ мокротъ языкъ и глотку, потомъ выпейте стаканъ и два свѣжей колодезной воды, походите около  $\frac{1}{4}$  часа и потомъ вымойте холодною водою сперва голову, глаза, все лицо, шею, спину, грудь и руки, и наконецъ все тѣло хорошею губкою; одѣвшись, походите съ часъ по комнатѣ или, если хороша погода по чистому воздуху. Послѣ можете завтракать; при чемъ надо выпить нѣсколько стакановъ воды. Этому порядку надо слѣдовать каждый день, а вечеромъ предъ сномъ еще разъ вымыть тѣло. Послѣ нѣсколькихъ сутокъ вы почувствуете сильный аппетитъ и если вы человекъ сколько нибудь воздержный, то аппетитъ все болѣе и болѣе будетъ усиливаться. Два раза въ недѣлю берите холодную ванну; если ваше тѣло можетъ выносить

удары волнъ въ озерахъ во время купанья въ нихъ: то это еще лучше. По неизбѣжно возможности купаться на открытомъ воздухѣ, приготовляйте себѣ ванны не въ слишкомъ холодной комнатѣ или въ сараѣ. Предъ сномъ выпейте еще два стакана воды и ежели вы больны, то примите прописанное гомеопатическое лекарство и ложитесь спать съ твердою надеждою на скорое возвращеніе силы и здоровья вашему тѣлу. Если же человекъ очень страдаетъ: то нужно употреблять воду, какъ предписано въ отдѣльныхъ болѣзняхъ, но все-таки я желаю и убѣдительно прошу каждаго больного присоединять къ Гомеопатіи и леченіе водою. Съ этою цѣлію я изложилъ въ этой книжкѣ оба способа леченія вмѣстѣ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда вода участвуетъ въ этомъ леченіи.

Наконецъ, я поименую самыя употребительныя гомеопатическія лекарства и покажу, въ какихъ дѣленіяхъ или степеняхъ принимать ихъ; они суть:

*Acidum nitric.* дѣл. 30.

*Acidum phosphoricum* дѣл. 2.

*Acidum sulphuricum* дѣл. 9.

*Aconitum Napellus* дѣл. 24.

*Agaricus muscarius*, дѣл. 30.

*Agnus castus* дѣл. 30.

*Alumina* дѣл. 30.

*Antimonium crudum* дѣл. 6.

*Antimonium tartaricum* (Tart. emet.) дѣл. 30.

*Arnica montana* дѣл. 6.

*Arsenicum album* дѣл. 30.

*Aurum fol.* дѣл. 12.

*Baryta carbonica* дѣл. 30.

*Belladonna* дѣл. 30.



Borax дѣл. 15.  
 Bovista дѣл. 15.  
 Bryonia alba дѣл. 30.  
 Calcareo carbonica дѣл. 30.  
 Camphora дѣл. 3.  
 Cannabis дѣл. 3.  
 Cantharides дѣл. 30.  
 Capsicum дѣл. 12.  
 Carbo vegetabil. дѣл. 30.  
 Causticum дѣл. 30.  
 Chamomilla дѣл. 12.  
 China дѣл. 24.  
 Cina дѣл. 9.  
 Cocculus дѣл. 12.  
 Coffea cruda дѣл. 3.  
 Colchicum autumn. дѣл. 6.  
 Colocynthis дѣл. 30.  
 Crocus sativus дѣл. 3.  
 Cuprum metallicum. дѣл. 30.  
 Drosera rotundifolia дѣл. 30.  
 Dulcamara дѣл. 24.  
 Euphrasia officinalis дѣл. 3.  
 Ferrum aceticum дѣл. 30.  
 Graphites дѣл. 30.  
 Helleborus niger дѣл. 12.  
 Hepar Sulphuris дѣл. 6.  
 Hyoscyamus niger дѣл. 9.  
 Ignatia amara дѣл. 12.  
 Ipecacuanha дѣл. 6.  
 Kreosotum дѣл. 30.  
 Lachesis дѣл. 30.  
 Lycopodium дѣл. 30.  
 Magnesia carbonica дѣл. 15.  
 Marum verum дѣл. 3.

Mercurius solubilis дѣл. 30.  
 Mercurius subl. corros. дѣл. 9.  
 Mercurius vivus дѣл. 12.  
 Moschus дѣл. 6.  
 Natrum muriaticum дѣл. 30.  
 Nux moschata дѣл. 6.  
 Nux vomica дѣл. 30.  
 Odontonecrosin дѣл. 6.  
 Opium дѣл. 6.  
 Phosphorus дѣл. 30.  
 Piper nigrum дѣл. 12.  
 Platina дѣл. 6.  
 Plumbum metallicum дѣл. 9.  
 Pulsatilla дѣл. 12.  
 Rheum дѣл. 9.  
 Rhododendron chrysanthum дѣл. 12.  
 Rhus toxicodendron дѣл. 30.  
 Ruta graveol. дѣл. 1.  
 Sambucus nigra дѣл. 1.  
 Secale cornutum дѣл. 6.  
 Sepia дѣл. 30.  
 Silicea дѣл. 30.  
 Spigelia дѣл. 30.  
 Spiritus sulphuratus дѣл. 0.  
 Spongia marina tosta дѣл. 30.  
 Staphisagria дѣл. 30.  
 Stramonium дѣл. 12.  
 Sulphur дѣл. 3.  
 Sulphur дѣл. 30.  
 Tinctura phosph. дѣл. 0.  
 Veratrum album дѣл. 30.  
 Zincum metallicum 30.

Это суть самыя употребительныя гомеопатическія средства. Однакожъ есть весьма много такихъ, которыя

не вошли въ нашъ перечень, потому что человекѣ, не посвятившему себя Медицинѣ, при руководствѣ этого книжкою, весьма достаточно изложенныхъ средствъ для большей части случаевъ. Большія аптеки требуютъ и большихъ расходовъ. Но не смотря на то все-таки необходимо имѣть гомеопату кромѣ вышеупомянутыхъ средствъ стеклянку съ *Tinct. Arnicae montanae* для наружнаго употребленія, которую разбавляютъ водою и промываютъ ею раны; стеклянку *Symphitum officinale*, тоже съ тинктурѣ для наружнаго употребленія при поврежденіи костей и стеклянку *Tinct. Urticae urent.*, которою примачиваютъ обожженное мѣсто.

Арниковая примочка готовится такъ: въ чайную чашку чистой ключевой воды налить 20 капель арниковой тинктуры и хорошенько взболтавши смѣсь, промывать раны.

Всякому гомеопату необходимо имѣть аптеку, чтобы на всякій случай лекарства были у него подъ руками. Издатель этой книжки отпускаетъ тщательно приготовленныя аптеки изъ своей Центральной въ Москвѣ Гомеопатической Аптеки съ сими 80 средствами. При этомъ должно замѣтить, что лекарства будутъ въ тѣхъ разжиженіяхъ которыя означены выше, въ списокѣ медикаментовъ.

Теперь приступимъ къ леченію отдѣльныхъ болѣзней.

## ГОМЕОПАТИЧЕСКІЙ

### ДОМАШНІЙ ЛЕЧЕБНИКЪ.

#### ЧАХОТКА.

Чихотка по самому словопроизводству показываетъ такое состояніе человекѣ, въ которомъ онъ чахнетъ, теряетъ свои силы, ослабѣваетъ. Чихоточный человекѣ чувствуетъ болѣе голода, чѣмъ въ нормальномъ состояніи и, не смотря на удовлетвореніе его, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе худѣетъ, пока наконецъ, если помощь врача опоздаетъ, совсемъ ослабѣваетъ и умираетъ. Это самая трудная и опасная болѣзнь, однако нѣкоторыя выздоравливаютъ совершенно, что доказываетъ, что излеченіе этой болѣзни нельзя поставить на ряду съ невозможными. Нужно только во время послать за докторомъ и довѣриться ему, и тогда леченіе непременно уаается, особенно если найдено будетъ, такъ сказать, мѣстопробываніе этой болѣзни. Главное дѣло узнать въ скоромъ времени начальную причину, произведшую болѣзнь и проникнуть въ сущность болѣзни. Чихотка бываетъ иногда въ брѣшнихъ внутренностяхъ, въ печенкѣ, въ почкахъ, или въ гортани, въ дыхательномъ горлѣ, въ легкихъ, въ спинномъ мозгѣ, иногда даже въ первахъ и носитъ названіе по мѣсту, въ которомъ она находится; такъ говорятъ: Чихотка брюш-

ныхъ внутренностей, гортани, дыхательнаго горла, лёгкихъ или лёгочная, чахотка спиннаго мозга, нервная чахотка. Ей обыкновенно предшествуетъ воспаление упомянутыхъ органовъ, которое обыкновенно при дурномъ леченіи переходитъ въ нагноеніе и вызываетъ тогда чахотку съ обильнымъ отдѣленіемъ гнойной мокроты. Положеніе всякаго человѣка, одержимаго чахоткой, можно назвать опаснымъ, если болѣзнь эта приметъ видъ чахоточной лихорадки или изнурительной нервной лихорадки, какъ это бываетъ при чахоткѣ спиннаго мозга и при нервной чахоткѣ. Здѣсь эта болѣзнь развивается всего скорѣе и тѣлесныя силы весьма скоро уничтожаются. Сперва начинаютъ показываться, при значительной блѣдности лица, темносиніе круги подъ глазами, красныя кругловатыя пятна на щекахъ, руки бываютъ холодны и липкій потъ, который появляется по утрамъ въ большемъ количествѣ, часто бываетъ весьма непріятнаго запаха и наконецъ водянистый поносъ увеличиваетъ слабость больного. Присутствие духа падаетъ и больной вообще дѣлается раздражительнымъ; въ теплую погоду и при высокой температурѣ онъ постоянно зябнетъ. Обыкновенно появляется эта болѣзнь сухимъ короткимъ кашлемъ, частыми лихорадками, холодомъ конечностей, сильнымъ, но холоднымъ потомъ по утрамъ; съ теченіемъ времени кашель усиливается, къ нему присоединяется гнойная мокрота, часто смѣшанная съ кровью, аппетитъ увеличивается, силы все болѣе и болѣе слабѣютъ, больной не можетъ ходить безъ помощи другаго, долженъ лежать въ постели и до костей изнуренный, часто умираетъ внезапно.

Причины появленія этой опаснѣйшей болѣзни бываютъ различны. Онѣ бываютъ иногда внѣшнія,

иногда внутреннія, одинъ наследуетъ расположеніе къ чахоткѣ отъ родителей, другой получаетъ ее отъ сильнаго, скорого роста своего тѣла. Чѣмъ здоровѣе были родители, тѣмъ менѣе расположенъ ребенокъ ихъ къ этой болѣзни. Если внимательно наблюдать за ребенкомъ, не давать ему очень много потѣть и если слѣдить за ростомъ и развитіемъ его тѣла и устранять все то, что могло бы на него вреднымъ образомъ подействовать, то болѣзнь навѣрное его не коснется. Но глазъ родителей не можетъ быть всегда проницателемъ и строгъ. Эту опасную и страшную болѣзнь развиваетъ въ тѣлѣ здоровыхъ дѣтей еще сильнѣе тотъ низкій порокъ, который, все болѣе и болѣе развивался, расслабляетъ душу, тѣло и называется онанизмомъ. Какъ скоро начнетъ мучать молодое тѣло, то мальчикъ или дѣвочка, чаще первый, старается произвести выбрасываніе сѣмянн раздраженіемъ половыхъ органовъ и это сѣмя, столь необходимое для совершеннаго образованія тѣла, при безвременномъ и раннемъ выбрасываніи, влечетъ за собою слабость тѣла и разстройства нервной системы, неизлѣчимыя въ продолженіи всей жизни, если тотчасъ же не расположатъ къ болѣзни, о которой идетъ рѣчь. О наклонности дѣтей къ этому пороку родители ихъ могутъ догадываться и даже навѣрное предполагать, если у ихъ дѣтей, прежде пользовавшихся здоровьемъ, появится вдругъ блѣдность и вялость лица, синіе круги подъ глазами, разсѣянность, забывчивость, упадокъ душевныхъ силъ, скучное расположеніе духа, слабость зрѣнія; если они будутъ часто искать уединенія, долѣе обыкновеннаго лежать въ постелѣ, чаще ходить и долго оставаться въ пустомъ мѣстѣ, и если замѣтятъ на ихъ рубашкахъ и на кровати пятна. Въ это



время нельзя еще прибѣгать къ строгостямъ. Ежели поможетъ ласковое увѣщаніе, вѣрное изображеніе ожидающаго ихъ въ будущемъ несчастія: тогда этимъ можно удовлетвориться. Если же это не поможетъ: тогда нужно дѣйствовать на нихъ строгими мѣрами и стараться всячески отучить ихъ отъ этого отвратительнаго порока. Такъ какъ онанизмъ влечетъ за собою большую слабость половыхъ органовъ, то слѣдствіемъ его въ позднѣйшее время, даже когда оставленъ будетъ этотъ порокъ, бываютъ такъ называемыя поллюціи или непроизвольное изліяніе сѣмени, необыкновенно разслабляющее духъ и тѣло, и разстроивающее нервную систему. Обыкновенно они происходятъ во время пріятнаго сна. Строгий образъ жизни, сильныя работы душевныя и тѣлесныя, гулянье до изнеможенія, умѣренная пища и питье, снѣ на соломѣ или матрацѣ, стараніе не спать на спинѣ (Этого можно достигнуть весьма легко, если повязать вокругъ живота поясъ съ маленькимъ шарикомъ, который бы находился на спинѣ, для того, чтобы будить, когда сонный ляжетъ на спину), раннее вставаніе, притомъ, чтобы оно слѣдовало тотчасъ же за пробужденіемъ, и ранній ужинъ, — составляютъ прекрасныя предохранительныя средства отъ этой привычки. Онанизмъ и поллюціи суть обыкновенныя и сильныя причины произхожденія чахотки, которую можно избѣгать въ будущемъ, если будутъ удалены причины ея происхожденія. Слишкомъ скорый ростъ, вытянутое строеніе тѣла, длинная шея и вдавленная плоская грудь, особенно у дѣвушекъ, находящихся въ періодъ развитія, золотуха у дѣтей, неумѣренное употребленіе спиртныхъ напитковъ, продолжительныя и скорые танцы, шнуровка груди корсетами изъ щегольства,

слишкомъ раннее куреніе табаку дѣтей, еще не пришедшихъ въ зрѣлый возрастъ, занятіе такими работами, которыя вредно дѣйствуютъ на грудь и легкія, постоянное сидѣніе, во время котораго печень, селезенка и кишки бываютъ сжаты и страдаютъ. Все это бываетъ причинами этой болѣзни, часто имѣющей своимъ исходомъ смерть. Какъ скоро уже есть причина болѣзни, даже самая болѣзнь: то должны быть также цѣлительныя средства и потому необходимо нужно, чтобы такіе больные обращались за пособіемъ ко врачу и сообщали бы ему безъ утайки, стыда и болзни всѣ грѣхи молодыхъ лѣтъ или и другіе, которые, по ихъ мнѣнію, могли быть причиною настоящей болѣзни. Чѣмъ откровеннѣе и справедливѣе будетъ больной; тѣмъ болѣе можетъ рассчитывать на совершенное излеченіе болѣзни. Назовемъ хотя нѣсколько гомеопатическихъ лекарствъ, которыя должны быть употребляемы въ этой болѣзни, потому что для различныхъ отдѣльных случаевъ этой болѣзни не возможно назвать лекарствъ специфическихъ, и всякій случай болѣзни имѣетъ свой индивидуальный характеръ.

*Arsenicum album* попеременно съ *Nux vomica* есть главное средство, и, ежели болѣзнь не скоротечна, то принимать одинъ разъ каждый день. Ежели лихорадка, то этому лекарству должно предшествовать одинъ или два приѣма *Aconitum Napellus*. Если же болѣзнь появилась отъ простуды послѣ разгоряченія тѣла, то съ успѣхомъ можно употреблять нѣсколько приѣмовъ *Dulcamara*; ежели же она появилась отъ разслабленія благородныхъ органовъ посредствомъ онанизма, поллюцій и половыхъ излишествъ: то употреблять *Arsenicum album* съ *China*. Если же причиною болѣзни было постепенное отравленіе, происшедшее

отъ работъ надъ вредными ядовитыми матеріалами. то главное средство *Arsenicum album*. Если же основаніемъ и поводомъ къ этой болѣзни была прежде бывшая золотуха, то лучшія средства въ это время: *Sulphur*, *Calcareo carbonica* и *Magnesia carbonica*. China же употребляется во всѣхъ этихъ случаяхъ съ пользою какъ промежуточное средство (\*) потому, что она укрѣпляетъ тѣло.

Другой и главный способъ леченія чахотки заключается въ холодной водѣ, употребляемой частию внутри, частию снаружи и, безъ всякаго сомнѣнія, это леченіе принадлежитъ къ самымъ простымъ и вѣрнѣйшимъ. Сама природа указала намъ на него, а его не хотятъ употреблять и презираютъ его благотворительную силу. Сначала надо разъ въ день мыть тѣло холодною водою, начиная отъ головы до ногъ, а по прошествіи недѣли купаться въ холодной колодезной водѣ, но не должно въ ней долго оставаться и также не должно обтирать воду, послѣ купанья, но дать ей всосаться въ тѣло или испариться. При этомъ взрослому человѣку необходимо пить ежедневно отъ 5 до 6 квартъ (около 2-хъ стакановъ) совершенно свѣжей ключевой воды, а дѣтямъ отъ 2—3. Если утромъ появится холодный потъ, то надо подождать два часа

(\*) Промежуточное средство дается тогда, когда какое либо изъ выше назначенныхъ лекарствъ видимо облегчаетъ, но, въ сѣдствіе слабости жизненныхъ силъ, не вполне обнаруживаетъ свое дѣйствіе. Хину слѣдуетъ принимать по прошествіи 24 часовъ, послѣ принятаго до сего лекарства, и дать ему столько же времени дѣйствовать.

предъ купаньемъ. Весьма полезно вытирать тѣло при купаньи шерстяною матеріею или мягкою щеткою или губкою, и преимущественно мѣста, болѣе страдающія. Много также способствуетъ къ выздоровленію гулянье послѣ мытья или купанья, продолжительное или короткое, смотря по силамъ больного. Вечеромъ надо еще разъ вымыть холодною ключевою водою грудь и половые органы, и выпить стаканъ или 2 воды предъ тѣмъ, какъ ложиться спать. Спать лучше всего на матрацѣ, набитомъ конскимъ волосомъ. Тѣмъ, которые страдаютъ сухоткою спиннаго мозга, очень полезно частое натираніе ступни хребта шерстяною матеріею, обмоченною въ хододной водѣ. По прошествіи 14 дней больной уже почувствуетъ желанную перемѣну, или лучше поправленіе здоровья, и чѣмъ постояннѣе будетъ продолжать это леченіе, тѣмъ скорѣе выздоровѣетъ. Если послѣ мытья тѣла холодною водою, вытереть хиннымъ спиртомъ мѣста, болѣе другихъ нездоровыя, то это принесетъ еще болѣе пользы. Въ чашку чистаго виннаго спирта кладутъ отъ 5—6 капель хинной настойки, избалтываютъ хорошенько и трутъ тѣло этимъ составомъ. Авторъ этой книги совѣтовалъ многимъ больнымъ эти холодныя ванны и натираніе спиртомъ, и они въ непродолжительномъ времени всѣ выздоравливали. Если же въ это время употреблять еще прописанныя гомеопатическія лекарства; то болѣзнь должна непременно пройти, если только еще не произошло совершенное разрушеніе благородныхъ органовъ. При этомъ нужна легкая, но укрѣпляющая пища и какъ выздоравливающіе, такъ и здоровые должны знать, что лучше меньше ѣсть, чѣмъ много, потому что не все количество употребляемой пищи укрѣпляетъ человѣка, но толь-

ко то, которое посредствомъ пищеваренія обращается въ соки.

### УЗЛЫ НА ЖИЛАХЪ.

Этимъ особеннымъ опухольямъ крововозвратныхъ жилъ на ногахъ и ляжкахъ подвержены беременныя женщины. Опухоли появляются на извѣстныхъ мѣстахъ или отъ напряженія живота, преимущественно въ послѣднихъ мѣсяцахъ ихъ беременности или отъ давленія ребенка на кровеносныя жилы. Эти узлы, которые бывають темнокраснаго или свинцоваго цвѣта, причиняють женщинамъ сильную боль при хожденіи или стояніи, и наконецъ, когда они увеличиваются, то лопаются, при чемъ бывають большая потеря крови. Во время сидѣнія или лежанія особъ, одержимыхъ этою болѣзнію, опухоли уменьшаются и боль утихаетъ. Главное лекарство отъ этой болѣзни есть *Pulsatilla* (по 2 капли 2 раза въ день). Можно также бинтовать ногу и ляжку, но только не слишкомъ крѣпко. Если они лопаются, то нужно позвать доктора Хирурга, чтобы онъ перевязалъ рану; если же время не терпитъ, то положить на рану сложенный въ четверо компрессъ, намоченный въ арниковой водѣ и потомъ забинтовать ногу у беременныхъ женщинъ.

Эту болѣзнь можно вылечить также холодною водою; для чего берутъ полотняный компрессъ, намачивають его въ холодной водѣ и кладутъ на эти узлы и почаще наливають на компрессъ холодную воду, потомъ слегка бинтуютъ ногу и приводятъ ее въ спокойное положеніе. Такимъ образомъ уменьшается величина и боль опухоли, а часто она и совсѣмъ пропадаетъ.

### ДОСАДА.

Досада есть дурное расположеніе духа въ слѣдствіе какаго нибудь вѣшняго вліянія, которое иногда слабѣе, иногда сильнѣе дѣйствуетъ на весь организмъ. На разныя лица она и дѣйствуетъ различно: у одного она вызываетъ вспыльчивость, у другого внутреннее огорченіе. Большая часть людей послѣ сильной досады страдаютъ затрудненнымъ пищевареніемъ и остановкою кровообращенія. Въ этихъ случаяхъ особенно помогаетъ *Chamomilla*. Если досада перешла въ гнѣвъ или вообще сильную страсть, то надо принять *Bryonia*, а по прошествіи 3 часовъ *Belladonna*. Если же досада будетъ имѣть слѣдствіемъ внутреннюю болѣзнь и если сюда присоединится еще печаль и стыдъ: то *Ignatia amara* въ этомъ случаѣ специфическое лекарство. Если при ознобѣ или дрожи; употребляютъ *Chamomilla*; если въ то же время присоединяется сюда чувство боязни, то принимать *Arsenicum album*. *Aconitum Napellus* есть специфическое лекарство, когда къ досадѣ присоединится тотчасъ страхъ. Это состояніе самое опасное и при этомъ необходимо стараться обратить вниманіе больного на какой нибудь другой предметъ, чтобы такимъ образомъ успокоить его; вмѣстѣ съ тѣмъ надо принимать *Aconitum Napellus* (3 капли на 6 ложекъ воды, черезъ  $\frac{1}{4}$  часа по ложкѣ).

Холодная вода также служитъ прекраснымъ лекарствомъ отъ досады. Только здѣсь нужна большая предосторожность, чтобы употребленіе ея не подействовало на организмъ разрушительно и даже



смертельно. Ванна или только питье воды непосредственно за досадою бываетъ иногда соединены съ опасностію жизни. Чтобы отвратить такія въ этомъ случаѣ опасныя дѣйствія воды и чтобы воспользоваться только успокоительными ея качествами, надо окунуть сперва палецъ въ воду, потомъ всю кисть, наконецъ всю руку и держать ее въ водѣ около 5 минутъ. Потомъ можно выпить немного воды, послѣ еще нѣсколько, наконецъ вымыть тѣло и потомъ уже взять ванну. Такимъ образомъ удаляются всѣ дурныя послѣдствія досады.

### ЗУДЪ ВЪ ЗАДНЕМЪ ПРОХОДѢ.

(См. въ статьѣ о геморроѣ).

### КОШМАРЪ, НАВАЛЪ.

Кошмаръ есть тягостное чувство во время сна, похожее на то, когда давить человѣка какая нибудь большая тяжесть; но это чувство не одинако у всѣхъ людей, именно одинъ чувствуетъ большую тяжесть на себѣ, другому кажется, что у него на груди сидитъ кошка или дикій звѣрь, третьему, что карликъ или домовой сѣлъ ему на животъ и намѣренъ покататься на немъ. Авторъ книги страдалъ этою болѣзнію въ ранней молодости; однажды послѣ обѣденнаго сна началъ давить его кошмаръ, но этотъ кошмаръ былъ совершенно особеннаго рода. Ему снились пиры и веселья, потомъ вдругъ поднялась буря, пальба изъ пушекъ, изъ ружей и тысячи различныхъ голосовъ достигали до его уха. Между этими голосами онъ внятно могъ слышать голосъ жены и дѣтей, которые разговаривали между

собою. Онъ хотѣлъ кричать о помощи, но не могъ выговорить ни одного слова. Ему казалось въ то время, что онъ задыхается, что сердце его разрывается на части. Долго ли это продолжалось, онъ не помнитъ, но когда онъ вдругъ проснулся отъ этого страшнаго сна, то почувствовалъ себя въ высшей степени утомленнымъ и всѣ члены его были какъ будто разбиты, холодный потъ покрывалъ лобъ и руки, ноги были холодны, пульсъ бился скорѣе и слабѣе, нежели прежде, въ ушахъ былъ слышанъ легкій шумъ и пестрѣло въ глазахъ. Безошибочно можно предполагать, что причиною этого мучительнаго положенія было то, что онъ ѣлъ предъ этимъ много сухой, мучной пищи и заснулъ на спинѣ, — потому что къ обыкновеннымъ причинамъ, производящимъ это явленіе, какъ то: полнокротію, испорченному пищеваренію, причисляютъ еще и отягощеніе желудка трудно переваривающеюся пищею и спанье на спинѣ. Обыкновенно отъ этого бываетъ скопленіе и остановка крови въ желудкѣ. Кошмаръ исчезаетъ, когда человѣкъ приучитъ себя къ правильной діетѣ и будетъ больше дѣлать движенія на свѣжемъ воздухѣ. Должно вообще избѣгать всякой трудно переваривающейся пищи, особенно мучной и мясной, какъ то: телятины, свинины, колбасы, жира и мяса со шпикомъ; не должно употреблять кофе, зеленый чай, пиво, ликеры, вино, пушъ, грогъ и всѣ спиртные напитки. Напротивъ того должно пытаться растительною пищею, употребляя говядину только въ небольшомъ количествѣ и самую лучшую, также дичь, преимущественно жареную и какъ можно больше пить воды. Изъ самыхъ употребительныхъ гомотеопатическихъ лекарствъ въ этой болѣзни особенно замѣчательна: *Nux vomica*, утромъ и вечеромъ по

одному приему, состоящему изъ двухъ капель въ столовой ложкѣ воды. Если же къ этому присоединяется бѣненіе сердца и постоянно затрудненное дыханіе, то чрезвычайно полезно давать въ промежуткахъ (за часъ до обѣда) *Aconitum Napellus* въ такомъ же приемѣ. Если же *Nux vomica* не поможетъ въ этой болѣзни, то употребляютъ *Opium*, а когда при этомъ бываетъ упорный запоръ; то употребляютъ *Plumbum metallicum*.

Кошмаръ вымечивается еще скорѣе, если присоединяется къ означенному гомеопатическому леченію и діетѣ леченіе холодною водою. Такимъ образомъ лечился и авторъ, когда былъ одержимъ этою болѣзнію. Онъ выпивалъ всякій разъ утромъ, послѣ обѣда и вечеромъ 2 стакана свѣжей холодной воды, купался ежедневно и теръ особенно мокрыми руками животъ, ставилъ иногда клистиръ изъ холодной воды, ѣлъ только легко переваривающіяся кушанья, гулялъ ежедневно по нѣсколькимъ часамъ, съ  $\frac{1}{2}$  часа рубилъ и пилилъ дрова и вотъ уже 22 года тому назадъ, какъ оставила его болѣзнь и болѣе не возвращалась. Питье холодной воды и купаніе есть величайшее благодѣяніе, которое можно оказать тѣлу.

#### ПРИЛИВЪ КРОВИ КЪ ГОЛОВѢ, ГРУДИ И ОРГАНАМЪ ЖИВОТА.

Этой болѣзни подвержены собственно тѣ люди, которые при занятіяхъ, сопряженныхъ съ напряженіемъ духа, — вынуждены вести сидячую жизнь, и которые притомъ для мнимаго укрѣпленія своего, по большей части, слабаго тѣлосложенія, любятъ

пить крѣпкій кофе или чай, крѣпкія вина и хорошенько покусать. Отъ этого происходитъ остановка въ обращеніи крови и она вмѣсто того, чтобы обращаться равномерно по всему тѣлу, стремится въ большомъ количествѣ къ одной какой нибудь особенной части, и такимъ образомъ если приливъ бываетъ къ головѣ, то причиняетъ сильную головную боль, полнокровіе головныхъ жилъ и сильную красноту щекъ, нестроту въ глазахъ, шумъ въ ушахъ, или если приливъ крови бываетъ къ груди: тогда происходитъ въ ней стѣсненіе, дыханіе затрудняется, сердце бьется сильнѣе, нежели прежде и даже чувствуется въ немъ иногда колотье. Когда кровь прильетъ къ органамъ живота, что случается въ особенности у людей, подверженныхъ ипохондріи, истерикѣ и геморрою, то животъ обыкновенно бываетъ полонъ и жестокъ, появляется чувство лѣнности, въ животѣ боль и чувство жженія, большею частію запоры. Противъ этой болѣзни, въ какой бы изъ трехъ сказанныхъ частей тѣла она ни развилась, болѣе всего помогаетъ строгая діета, воздержаніе отъ всякой трудно варимой пищи и питья; воздержность въ удовлетвореніи половыхъ потребностей, и при томъ движеніе на чистомъ воздухѣ, тѣлесныя упражненія: бѣганье, игры, копанье земли, садка деревьевъ, и частое треніе подъ ложечкою голою рукою, сообщая ей кругообразныя движенія. Такіе больные должны заботиться, чтобы ноги ихъ всегда были теплы. Изъ гомеопатическихъ же средствъ, при напорѣ крови къ головѣ, лучшее конечно есть *Aconitum Napellus* утромъ и вечеромъ по 2 капли въ столовой ложкѣ воды, а на третій день *Nux vomica*. Еслибы *Aconitum* почему либо не принесъ пользы, то даютъ *Belladonna*. Эти же средства

употребляютъ и при приливахъ крови къ груди и къ животу. Женщинамъ и дѣвцамъ, которыя страдаютъ приливами крови, особенно къ груди, во время регулъ, должно принимать послѣ *Nux vomica* еще *Pulsatilla*. Обыкновенно съ наступленіемъ очищеній прекращаются и болѣзненные припадки.

Но болѣзнь несравненно скорѣе устраняется, если вмѣстѣ съ гомеопатическими средствами употреблять леченіе холодною водою; скажемъ больше, люди которыя пользуются этимъ способомъ постоянно, купаясь въ холодной водѣ или употребляя ее въ питье, никогда не подвергаются описываемой болѣзни. Потому что вода, употребляемая внутрь или снаружи, очищаетъ кровь, возбуждаетъ кровообращеніе, воспрещаетъ застою ея въ какой-либо части тѣла и постоянно очищаетъ желудокъ. Съ этою цѣлію пьютъ воду ежедневно и притомъ прямо изъ источника, чтобы пить ее вмѣстѣ съ газами, содержащимися въ проточной водѣ; моютъ больную часть тѣла, голову или грудь, или животъ, 3 раза въ день, и если этого мало, то прикладываютъ на сказанныя части компрессы полотняные, намоченные въ холодной водѣ, и смачиваютъ ихъ снова, какъ скоро они нагрѣются или высохнутъ. Неумоимо и непрерывно пейте воду, купайтесь, мойтесь въ ней и почувствуете себя свѣжимъ, бодрымъ и здоровымъ. Сколько тысячъ людей вылечилось водою и какъ пріятно надѣяться, что столько еще выздоровятъ, если одолѣютъ страхъ и недовѣріе къ такому спасительному средству.

## БОЛЯЧКИ НА ЛИЦѢ У ДѢТЕЙ.

Эта болѣзнь преимущественно бываетъ у такихъ дѣтей, которыхъ матери кормятъ дурнымъ молокомъ; болячки образуются изъ наполненныхъ жидкою, желтоватою и острою лимфою, маленькихъ пузырьковъ, которые лопаются, покрываются коростой и причиняютъ постоянный зудъ и жаръ. Такія матери, изъ любви къ своимъ дѣтямъ, которыя страдаютъ этою болѣзнію не должны употреблять тѣхъ кушаній и напитковъ, способныхъ испортить молоко, питаться тѣмъ, что въ состояніи привести молоко въ лучшее, здоровое состояніе. Онѣ должны избѣгать всѣхъ пряностей, пить чистое молоко, хорошее простое пиво, ѣсть хлѣбъ съ масломъ и употреблять въ пищу такое мясо, которое можетъ доставить имъ хорошее молоко. При этомъ они должны ежедневно принимать по одному приему *Sulphur* (двѣ капли въ водѣ), держать въ теплѣ грудь и избѣгать досады. Дѣтямъ же давать чрезъ каждыя 2 дня по  $\frac{1}{2}$  капли *Sulphur* въ чайной ложечкѣ молока. Тогда эта болѣзнь мало по малу исчезнетъ.

Вода въ этой болѣзни оказываетъ самыя полезныя услуги. Мать, чтобы очистить молоко, должна ежедневно пить побольше воды, почаще мыть грудь холодною водою, хоть всякій разъ послѣ кормленія.

## АПОПЛЕКСІЯ, УДАРЪ.

Апоплексія, или ударъ, есть внезапно послѣдовавшее уничтоженіе вліянія нервной системы. Боль-



ной вдругъ впадаетъ въ совершенно безчувственное положеніе, лице дѣлается синевато-красное, опухшее, и если не умираетъ тотчасъ, то дышетъ сильнымъ хрипомъ. Въ это время необходима скорая помощь врача. Но такъ какъ деревенскіе жители, по дальнему разстоянію отъ города, должны ждать доктора часто отъ 3—4 часовъ: то до его приѣзда должно позаботиться объ томъ, чтобы снять съ больного всякое стѣсняющее его платье, чтобы онъ лежалъ въ прохладной комнатѣ и притомъ такъ, чтобы голова лежала повыше, а ноги гораздо ниже, даже чтобы совсѣмъ висѣли на полу, только въ послѣднемъ случаѣ надобно закрыть ихъ теплѣе и растирать. На затылокъ и на руки надо поставить нѣсколько пѣвковъ и давать больному по 1-му приему *Belladonna* (3 капли) чрезъ каждые  $\frac{1}{4}$  часа. При этомъ нужно почаще мыть голову холодною водою, или еще лучше, положить на голову холодные компрессы. Для этого берутъ салфетку, складываютъ ее въ четверо, намачиваютъ ее въ холодной со льдомъ водѣ и кладутъ на голову, вокругъ лба и затылка и какъ скоро она согрѣется, то сейчасъ переменяютъ ее другою болѣе холодною. Дальнѣйшее леченіе надо предоставить врачу.

Гидропатическое леченіе, къ которому въ этомъ случаѣ прибѣгаетъ всякій докторъ, какъ гомеопатъ, такъ и аллопатъ, уже описано выше. Когда такимъ образомъ больной выздоровѣетъ, то чтобы избавиться отъ подобной болѣзни и на будущее время, онъ долженъ, при строгой діетѣ, побольше пить воды, мыть нѣсколько разъ въ день голову холодною водою и почаще купаться.

## ПОТЕРЯ АППЕТИТА.

Причинами недостатка аппетита бываютъ нечистоты въ желудкѣ и кишечномъ каналѣ, которыя происходятъ отъ отягощенія желудка тяжелою и пряною пищею и горячительными напитками, или отъ употребленія трудно переваримой пищи, отъ слишкомъ продолжительнаго сидѣнія, отъ распутной жизни, часто же отъ горестей и печали. Къ потерѣ аппетита присоединяется обыкновенно тошнота, отрыжка, кислый и горькій вкусъ во рту, совершенно бѣлый языкъ, головная боль, лѣнность и сонливость. *Nux vomica* по двѣ капли на ночь можетъ принести больному большую пользу, но въ томъ лишь случаѣ, когда онъ будетъ вести другой образъ жизни. Онъ долженъ воздерживаться отъ всѣхъ раздражающихъ кушаній и напитковъ, часто и много гулять, пить побольше воды, разъ въ день купаться, ѣсть очень жидкій супъ, кусочекъ хорошо испеченаго хлѣба съ малымъ количествомъ соли, пить при этомъ нѣсколько стакановъ свѣжей воды, и аппетитъ скоро возвратится. Отнюдь не должно прибѣгать къ эликсирамъ и укрѣпляющимъ средствамъ, — они еще болѣе разстроятъ желудокъ. Если они вначалѣ и помогутъ, то это произойдетъ единственно отъ сверхъестественнаго раздраженія ими желудка, послѣ чего онъ дѣлается еще слабѣе въ отправленіи своихъ функций и если хотите укрѣпить его еще болѣе, то этого можно достигнуть только самыми сильными лекарствами, отъ которыхъ желудокъ уже совершенно разстроится. Самое лучшее и

здоровое возбуждающее средство или лучше возста-  
навливающее потерянный аппетитъ есть и будетъ  
ежедневное употребленіе холодной воды; она очи-  
щаетъ, избавляетъ отъ слизи и укрѣпляетъ совер-  
шенно ослабѣвшій желудокъ отъ находящихся въ  
немъ нечистотъ. Конечно есть много людей, кото-  
рые думаютъ, что водою еще болѣе желудокъ ослаб-  
ляется и которые поэтому крѣпкіе напитки пред-  
почитаютъ чистому натуральному питью. Если бы эти  
несчастные попробовали хотя въ продолженіи одного  
дня пить воду: то со стыдомъ должны бы были со-  
знаться, что отъ этого напитка аппетитъ возста-  
новляется несравненно лучше, нежели отъ пива,  
вина, или водки.

Вода и 3—4 приѣма *Nux vomica* совершенно воз-  
вратятъ вамъ здоровье, между тѣмъ какъ дорого  
обходятся всѣ эти укрѣпляющія желудокъ лекарства,  
которыя на самомъ дѣлѣ только расслабляютъ его.

### УТОМЛЕНИЕ РУКИ ВО ВРЕМЯ ПИСАНІЯ ИЛИ ИГРАНІЯ НА ФОРТЕПІАНО.

Часто случается, что у тѣхъ, которые въ продол-  
женіи дня должны слишкомъ много писать или  
играть на Ф. П. или органѣ, рука устаетъ до не-  
возможности поднять ее и наконецъ при дальнѣй-  
шемъ писаніи или игрании совершенно не въ состоя-  
ніи дѣйствовать. Тогда должно дать рукѣ немного  
отдохнуть, потомъ мыть холодною, со льдомъ, водою,  
и хорошенъко тереть ее; при этомъ можно употреб-  
лять арниковую воду, составленную изъ 1-ой части  
*Tinct. Arnicae* и 10 частей свѣжей воды и не обти-

рая руки, просунуть въ рукавъ, чтобы находящійся  
въ водѣ газъ лучше дѣйствовалъ на руку. Четыре  
часа послѣ втиранія можно принять отъ 1—2 приѣ-  
мовъ *China* и рука по прежнему будетъ отправлять  
свои обязанности.

### ЗЛОВОННОЕ ДЫХАНІЕ.

Надо употреблять всѣ старанія, чтобы удалить эту  
очень значительную болѣзнь. Бываютъ разныя при-  
чины ея появленія: иногда дурные зубы, иногда  
испорченный желудокъ, или цынга, нарывъ во рту  
или въ горлѣ и др. Нѣкоторыя особы такъ мало  
заботятся о своихъ зубахъ и въ тоже время такъ  
много ѣдятъ и пьютъ то теплое, то холодное, что  
вовсе не удивительно встрѣчать черные, пустые  
зубы, десны въ нарывахъ, цыngu и проч. Отъ всѣхъ  
этихъ причинъ дыханіе получаетъ заражающій за-  
пахъ, такъ что всѣ избѣгаютъ говорить съ такими  
людьми.

Люди, которые имѣютъ подобный запахъ изъ рта,  
сами знаютъ очень хорошо, что они этимъ отда-  
ляютъ отъ себя другихъ людей, однакожь не пред-  
принимаютъ или ничего, или очень мало къ удале-  
нію этой болѣзни. Если кто хочетъ лечиться го-  
меопатически, то долженъ сперва справиться о при-  
чинѣ своей болѣзни. Если человѣкъ дѣлалъ чистить  
зубы ежедневно и вонючее дыханіе происходитъ отъ  
скопившейся на зубахъ слизи или отъ находящихся  
между зубовъ нищи, которая весьма легко перехо-  
дитъ въ гніеніе: то легко устранить болѣзнь, вычи-  
щая зубы всякое утро ключевою водою и легкою

щеткою или, по недостатку ея, указательнымъ пальцемъ то правой, то лѣвой руки, выполаскивая холодною водою и счищать съ языка насквѣвшую на него слизь тоненькою пластинкою изъ китоваго уса, взявъ ея обѣими руками за оба конца и соскабливая ею языкъ во всѣхъ направленіяхъ. Для чищенія зубовъ можно употреблять легко истолченный липовый уголь или сожженную хлѣбную кору. Цынготныя отложенія на зубахъ должно удалить по возможности въ скоромъ времени и если пациентъ не можетъ самъ этого исполнить, то пусть предоставитъ это зубному врачу. Если же вся полость рта въ болѣзненномъ состояніи, ежели въ ней и на деснахъ образуются нарывы: то нужно употреблять ежедневно утромъ и вечеромъ по 1-му приему (2 капли) *Mercurius vivus*. Однакожъ у многихъ причиною этой болѣзни бываютъ непорченные соки желудка и такимъ особамъ рекомендуется держать ротъ въ чистотѣ: но этимъ однимъ они еще не уничтожатъ болѣзни, и имъ еще нужно принимать по чередѣ намъ *Mercurius vivus* и *Nux vomica*. Если болѣзь не пройдетъ отъ этого: то надобно заблаговременно воспользоваться леченіемъ опытнаго врача, если они не предпочитаютъ гидронатическій способъ леченія этой въ высшей степени непріятной болѣзни, ибо леченіе водою приноситъ гораздо скорѣйшую помощь и исцѣленіе. Должно не только каждый день утромъ чистить щеткою зубы, мыть десны и языкъ водою и повторять это послѣ всякой ѣды, но даже пить ежедневно, какъ можно болѣе свѣжей воды, два раза въ недѣлю купаться и мыть ежедневно тѣло губкою и въ особенности кругообразно тереть мокрою рукою животъ и пупокъ. Вода, проникая тончайшіе каналы и жилки, мало по малу освобождаетъ желудокъ отъ

острыхъ испорченныхъ соковъ и выносить ихъ вонъ естественнымъ путемъ. Слизь въ желудкѣ и все нездоровье въ немъ уничтожается ежедневнымъ купаньемъ и желудокъ посредствомъ воды опять окрѣпнетъ.

### ПРОЛЕЖНИ.

Въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ больные принуждены лежать весьма долго на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, чаще всего на спинѣ, напр. при переломѣ ноги или въ болѣзняхъ изнурительныхъ, во время которыхъ больной по большой слабости постоянно лежитъ въ постелѣ, отъ чего и происходятъ пролежни на тѣхъ мѣстахъ, которыя прикасаются къ матрацу и особенно на копчиковой и нижней части крестцовой кости. Эти язвы могутъ легко перейти въ антоновъ огонь, если не будетъ подана скорая помощь; онѣ причиняютъ больнымъ довольно значительную боль и слѣдовательно увеличиваютъ и безъ того тягостное и мучительное ихъ положеніе.

Для этого надобно мыть больныя мѣста свѣжею ключевою водою, къ которой прибавляется нѣсколько капель арниковой настойки (на стаканъ воды 10 капель) положить подъ нихъ мягкую дубленую кожу дикой козы, мѣхомъ внизъ, и дать нѣсколько приемовъ *Arnica* (3 капли на 6 ложекъ воды, утромъ и вечеромъ по ложкѣ). Когда больныя мѣста начнутъ переходить въ антоновъ огонь, то употребляютъ вмѣсто арниковой настойки хинную, смѣшанную съ водою, и нѣсколько приемовъ *China* вмѣсто *Arnica*. Отчасти предохраняетъ больныхъ отъ этого недуга, поставленная подъ кровать свѣжая ключевая вода въ



сосудѣ, или въ подрѣ. Такъ какъ употребленіе холодной воды уже описано, то излишне особенно упоминать о ней и о родѣ и образѣ употребленія ея.

### РАСТРЕСКИВАНІЕ КОЖИ.

Только тѣ особы, которыя отъ природы имѣютъ жесткую кожу, по большей части подвергаются въ суровые и холодные мѣсяцы, и также при суровыхъ вѣтрахъ, растрескиванію кожи то на рукахъ, то на губахъ, иногда на тѣхъ и другихъ вмѣстѣ. Хотя это не болѣзненное и не опасное состояніе, но все таки очень непріятное и тягостное; на губахъ это еще тѣмъ болѣе усиливается, что такія особы обыкновенно мочатъ губы слюною, такъ какъ это приноситъ мнѣшное облегченіе и уменьшаетъ стягиваніе; но чрезъ это жесткость кожи еще болѣе увеличивается и кожа трескается еще легче. Это зло легко можно устранить, если обмазывать треснувшія мѣста кокосовымъ масломъ или губною помадою, а за неимѣніемъ ея просто и хорошо промытымъ, не соленымъ свинымъ саломъ, и сидѣть дома во время суровой и холодной погоды. Такія особы должны также мыть свое лице и руки не мыломъ, а пшеничными отрубями, которые имѣютъ свойство дѣлать кожу нѣжною и мягкой. Однако часто эта болѣзнь основана на внутреннемъ предрасположеніи, и потому должно употреблять приличное средство. Противъ такого отвердѣнія кожи, которое произошло отъ внутренней болѣзни, слѣдуетъ употребить *Mercurius solubilis* попеременно съ *Chamomilla* черезъ день по 3 капли, а противъ облупленія кожи *Serpi*.

Такъ какъ холодная вода по своимъ свойствамъ не только укрѣпляетъ, но и сообщаетъ мягкость и гибкость, то при частомъ употребленіи снаружи и внутрь она должна принести большую пользу. Если болѣзнь обнаружилась въ слѣдствіе внутренней болѣзни, то леченіе водою есть одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ

### ВОСПАЛЕНІЕ ГЛАЗЪ.

Воспаленіе глазъ не только самая непріятная болѣзнь, но когда оно очень сильно, можетъ сдѣлаться въ высшей степени опаснымъ. Оно имѣетъ мѣсто въ внутреннихъ частяхъ и обыкновенно обнаруживается сильною краснотою, жаромъ, то сильною, то слабою болью глаза, теченіемъ слезъ, а часто также выпотѣніемъ клейкой матеріи. Причины производящія его, бываютъ или внѣшнія, или внутреннія. Къ внѣшнимъ относятся: слишкомъ сильное напряженіе глаза при чтеніи и письмѣ или при другихъ мелкихъ работахъ, утомляющихъ глазъ, занятіе на фабрикахъ, гдѣ употребляютъ вредныя для глазъ вещества (хлоръ, сѣра) работа при слишкомъ яркомъ свѣтѣ или въ сумеркахъ, частое смотрѣніе на свѣтъ при ясной погодѣ и ясномъ солнцѣ, прониканіе сильной пыли въ глаза и тому под. Такое воспаленіе глазъ отъ внѣшнихъ причинъ можно легко устранить, — или оставить тѣ занятія, которыя причиняли болѣзнь и дать глазу приличное спокойствіе и обмывать глазъ ежедневно холодною водою нѣсколько разъ и этимъ его укрѣпить. Какъ самое главное средство къ устраненію этого зла и укрѣпленію глаза должно

еще рекомендовать, чтобы больной весною и лѣтомъ смотрѣлъ на зеленѣющую природу и покоилъ свой глазъ на зеленомъ полѣ, и если можно, то дѣлать это по нѣскольку часовъ. Зимой, когда въ зелени природы мы должны отказать себѣ, можно направлять зрѣніе на густой, однако не яркій зеленый цвѣтъ, на коврѣ, сукнѣ, и т. под. Если причина состоитъ во внутренней болѣзни, если соки больного испорчены не правильно излеченными болѣзнями, или скрывшимися сыпными болѣзнями, или больной, можетъ быть, имѣлъ прежде всерическую болѣзнь, и она не была совершенно вылечена, если что нибудь осталось въ тѣлѣ отъ оспы, кори, золотухи, ревматизма и т. под., то конечно гомеопатическое леченіе должно сообразоваться съ производящими причинами. Здѣсь лучше попросить на совѣтъ гомеопатическаго врача и открыть ему прямо и безъ уклончивости, какими болѣзнями прежде было одержимо тѣло и какими средствами ихъ пользовали; только такимъ образомъ врачу будетъ легко поступать съ увѣренностію.

Если воспаленіе произошло отъ введенія посторонняго тѣла въ глазъ, то прежде всего должно его удалить, однако съ большою предусмотрительностію. Для этого внутри вѣкъ обводить тонкою длинною кисточкою или скатанною въ трубочку бумажкою, причемъ постороннее тѣло легко пристаётъ къ кисточкѣ. Желѣзные осколки могутъ быть извлекаемы съ помощію маленькой петли изъ лошадиного волоска, которые водятъ взадъ и впередъ въ глазъ, или также съ помощію магнита, который приближаютъ къ занозѣ металлической. Если же она крѣпко сидитъ въ глазѣ, то должно тотчасъ призвать врача. Глазные ванны особенно должно

рекомендовать, хотя нѣкоторые врачи и противнаго мнѣнія; особенно онѣ нужны, когда въ глазѣ проникли легко растворимыя вещества: чрезъ это вредныя вещества водою разбавляются, и я именно совѣтовалъ бы эти примочки, потому что вредное вещество можетъ быть совершенно удалено, вымыто посредствомъ продолжительнаго мытья и промыванія. Масло хорошо употребить, когда во внутренность глаза проникли острые кислоты и соли. Но прежде всего должно отсвѣтывать треніе глазъ пальцами, потому что это только усиливаетъ воспаленіе и потомъ усиливаетъ боль. Главнѣйшее средство гомеопатіи противъ воспаленія глазъ есть *Aconitum Napellus* (3 капли на 6 ложекъ воды черезъ 2 часа по ложкѣ), а если оно не совсѣмъ устранило боли, то 2 раза въ день по 2 капли *Spiritus sulphuratus*. Если по удаленіи попавшаго въ глазъ тѣла останется еще теченіе слезъ то должно употребить главное средство для этого случая *Euphrasia*. Въ воду, которою обмываютъ воспаленный глазъ, можно капнуть нѣсколько капель. *Tinct. Arnicae* (на стаканъ воды 5 капель), а внутрь принять нѣсколько приѣмовъ *Arnica* въ высшемъ дѣленіи. Если воспаленіе глазъ катарально, если оно зависитъ отъ катарра, при чемъ края вѣкъ, а также яблоко бываютъ красны, также съ жженіемъ и покалываніемъ или давленіемъ, какъ будто въ глазу находится несокъ; вмѣстѣ съ тѣмъ лихорадка и сухой кашель и изъ глазъ идутъ слезы, то и здѣсь должно дать *Aconitum Napellus* и послѣ четырехъ приѣмовъ онаго на ночь 2 капли *Nux vomica*, и если послѣднее средство не поможетъ то *Belladonna* или *Euphrasia* по 2 приѣма въ день; послѣднее же средство особенно при свѣтобоязни и теченіи слезъ изъ глазъ. Если же суще-

ствуютъ причины болѣе глубокия, или остались еще слѣды золотухи, чесотки, сифилитической болѣзни, то необходимо, какъ я выше замѣтилъ, посоветоваться съ врачомъ.

*Новорожденные дѣти также часто страдаютъ воспаленіемъ глазъ, то одного, то другого, иногда обоихъ вмѣстѣ. Глазъ сначала судорожно закрытъ, слегка опухъ, а на краяхъ вѣкъ незначительное воспаленіе. Слезящійся глазъ обнаруживаетъ при этомъ большую свѣтлостойкость и необыкновенную чувствительность при движеніи вѣкъ; водянистое отдѣленіе и выпотѣніе заклеиваютъ края ихъ, и дитя не можетъ болѣе открыть глаза. При усиленіи болѣзни образуется болѣе и болѣе гноеобразная матерія, она течетъ изъ глаза по щекамъ и образуетъ по причинѣ ѣдкости своей полоски похожія на растреснувшую древесную кору. Если можно открыть слипающійся глазъ и отклонить вѣки, чего конечно нельзя сдѣлать безъ сильной боли для дѣтей, то внутри вѣкъ увидятъ маленькія, кровянокрасныя бородавки. Дитя болѣе или мѣнѣе въ лихорадкѣ, въ высшей степени безпокойно, не можетъ спать отъ боли и видимо худѣетъ. Если здѣсь не будутъ употреблены приличныя средства, то глазъ или зрѣніе легко можетъ подвергнуться опасности, ибо роговая оболочка воспаляется, темнѣетъ и размягчается. Къ причинамъ, которыя произвели воспаленіе, можно отнести болѣзни родителей, какъ то: подагру, золотуху, венерическую болѣзнь, чесотку, которыя легко переходятъ въ соки ихъ дѣтей; пребываніе дѣтей въ тѣсныхъ воспитательныхъ домахъ, въ которыхъ развивается много вредныхъ испареній отъ числа вмѣстѣ живущихъ людей, и гдѣ не всегда можно заботиться о чистотѣ комнатъ и воздуха; тя-*

желые роды, при которыхъ голова, особенно же лобъ, долго оставались внутри маточнаго рукава, тогда внутреннее воспаленіе бываетъ отъ сильнаго давленія; далѣе зараза дитяти другимъ дитяемъ съ подобнымъ воспаленіемъ въ родильныхъ госпиталяхъ; внѣшнее поврежденіе нѣжныхъ частей глаза обмываніемъ жесткими губками или бумажными матеріями; вдавленіе постороннихъ тѣлъ въ глазъ, слишкомъ яркій свѣтъ для глаза, который должно бы содержать въ темнотѣ, ѣдкій дымъ и паръ въ комнатѣ и неопытность при уходѣ за младенцемъ, и его слабымъ тѣломъ, неправильная діета и т. дал.

Главнѣйшія средства противъ этого и особенно въ началѣ, когда воспаленіе еще не слишкомъ сильно, и глазъ только гноится, есть *Aconitum Napellus*, *Chamomilla*, *Euphrasia officin.* и *Ignatia*; при этомъ нужно употребить большую заботливость о содержаніи въ чистотѣ дитяти и глазъ должно обмывать и обтирать слегка нѣжною и мягкою губкою, обмакнутою въ воду. Если же болѣзнь усилится и при большей краснотѣ и воспаленіи показывается болѣе крѣпкое склеиваніе краевъ вѣкъ, если сонъ дитяти очень не спокоенъ и дитя быстро худѣетъ и становится очень слабымъ, то слѣдуетъ употреблять *Belladonna*. Если убѣждены будутъ, что мать прежде страдала чесоткою или венерическою болѣзнію, или даже была въ ревматизмѣ, золотухѣ, то должно дать матери, если она питаетъ дитя грудью, *Mercurius vivus*, рано утромъ и вечеромъ по 1 приему, если она была сифилитическою; или *Sulphur*, если она была золотушною, ревматическою, и чесоточною. Дитяти которое уже болѣе не питается грудью, должно дать *Aconitum Napellus*, потомъ приема два *Sulphur*, а потомъ *Nux vomica* и *Bryonia*



( $\frac{1}{2}$  капли названныхъ средствъ въ столовой ложкѣ молока, по чайной ложки чрезъ 3—4 часа на самый большій приёмъ для нѣжныхъ дѣтей). Если воспаление перешло въ нагноеніе, если изъ-подъ вѣкъ вытекаетъ густой гной и оставляетъ за собою при теченіи по щекамъ корку, то специфическія средства будутъ: *Mercurius vivus*, *Hepar Sulphuris* и *Belladonna*. При судорогахъ вѣкъ должно давать *Hyoscyamus*, *Crocus*, *Veratrum album* и *Stramonium*. Если притомъ воспалена роговая оболочка, что большей частию происходитъ отъ золотухи, ревматизма и ломотныхъ болѣзней, то должно давать попеременно *Euphrasia officin.* и *Hepar Sulphur* утромъ одно, вечеромъ другое; также *Jodium* и *Spigelia*, *Cannabis* и *Acidum nitri*, если первыя средства не приведутъ къ желанной цѣли. Если же не внутренняя болѣзнь причинила воспаление, но оно произошло отъ внѣшняго поврежденія, когда за воспаленіемъ потомъ слѣдуетъ потемнѣніе роговой оболочки, то можно употреблять снаружи арниковую воду, которую готовятъ изъ чайной чашки воды и 10—12 капель *Tinct. Arnicae*; внутрь 1 или 2 приёма ( $\frac{1}{2}$  капли) разведенной *Arnica*, дабы устранить это зло.

Что холодная вода можетъ быть употребляема съ большою пользою противъ воспаленія глазъ у взрослыхъ, это не подлежитъ ни какому сомнѣнію, хотя есть врачи совсѣмъ противнаго мнѣнія. Ничто не можетъ отвратить наступающее воспаление легче и скорѣе холодной воды, но только врачъ можетъ опредѣлить, въ какихъ случаяхъ она можетъ быть полезна или вредна. Не противорѣчаютъ ли врачи часто сами себѣ, сначала запрещая холодную воду, и потомъ сами ее употребляя, когда всѣ средства уже не помогаютъ, и предлагаютъ даже ледъ напри-

мѣръ при воспаленіи мозга; холодная вода не только облегчаетъ жаръ и воспаленіе, и устраняетъ его совершенно, но она разъединяетъ жидкія жгучія и острыя жидкости и отнимаетъ ихъ совершенно. Если глазъ будетъ воспаленъ, то обмывай его простою холодною водою почаще или кладь компрессъ изъ полотна, сложенного вдвое или втрое, обмакнувъ его въ холодную воду; а потомъ переменяй другимъ компрессомъ, когда первый согрѣется и высохнетъ. Но тереть воспаленный глазъ вовсе не должно ни рукою, ни губкою, ни компрессомъ; этимъ только усилишь и увеличишь воспаленіе. Если глазъ по утрамъ послѣ ночнаго сна слѣпился вѣками; то не старайся насильно его раскрыть, но смягчи его прежде холодною водою, пока глазъ самъ не откроется; также не отрывай насильно отъ рѣсницъ кусочки гноя, но дождайся, пока они сами прилипнутъ къ мокрой губкѣ и отдѣлятся. Въ тоже время промывай глазъ нѣсколько разъ въ день и если при этомъ соблюдать означенныя гомеопатическія правила, то въ скоромъ времени явится возможность радоваться излеченію глаза. Конечно здѣсь должно быть даваемо и соответственное внутреннее гомеопатическое лекарство, сообразуясь съ причинами, ибо никакія смачиваніе и примочки ничего не помогутъ, если изнутри прибываетъ постоянно новая матерія. Если же все было сдѣлано къ устраненію болѣзненной матеріи изнутри, то ничто не можетъ сравниться съ дѣйствіемъ холодной воды.

При слабости зрѣнія взрослыхъ особъ, будутъ ли они дальнорукі или близоруки, холодная вода окажетъ отличныя услуги и даже тотъ, кто имѣетъ слабое зрѣніе, можетъ надѣяться, что послѣ ежедневнаго употребленія холодной воды для купанья и ежедневнаго

обмыванія или же питья, будетъ видѣть ясно и зорко. Но отнюдь не должно спѣшить надѣвать очки и вооружать ими свой ослабленный глазъ: всякій долженъ спросить сначала опытнаго врача и если этотъ найдетъ нужнымъ купить очки, то должно выбрать по его предписанію нумеръ выпуклыхъ или вогнутыхъ стеколъ, смотря по степени близорукости или дальнозоркости глаза. Также должно покупать стекла круглыя, а не овальныя подобныя лѣйцу, потому что первыя болѣе закрываютъ глазъ и менѣе бросаютъ тѣни на глазъ. Зеленые очки или такъ называемые консервы никуда не годятся, а болѣе портятъ зрѣніе, чѣмъ помогаютъ. Противъ слабого и тусклаго зрѣнія можно употреблять, кромѣ холодной воды гомеопатическія средства: *Cannabis*, *Stramonium*, *Hyoscyamus*, *Pulsatilla*, *Carbo vegetabilis* черезъ день или два по приему, состоящему изъ 2 капель, и каждое средство не менѣе 2 недѣль.

### ВЫПАДЕНІЕ ВОЛОСЪ.

Послѣ всякой болѣзни, особенно послѣ первой горячки случается часто, что выпадаетъ много волосъ, самыя волосы рѣдѣютъ и тончаютъ. Должно укрѣплять голову, обмывая ее ежедневно холодною водою и натирая ее помадою изъ 8 зол. бычьяго мозга, въ которую примѣшана одна капля тинктуры *Cantharid.* Часто волосы сами вырастаютъ безъ участія другихъ какихъ либо средствъ; если же этого не случится, то поступай, какъ сказано выше и остриги кончики волосъ, когда луна будетъ прибывать. Всѣ восхваляемыя средства, которыя должны произвести

сильнѣйшій ростъ волосъ, помады и масла никуда негодятся; они стоятъ дорого, но все таки не имѣютъ общаею силы. Мой, чеши и гладь щеткою ежедневно свои волосы, употребляй вышеозначенную помаду, при большой слабости употребляй внутрь нѣсколько приѣмовъ (разъ въ день по 2 капли) *China* и послѣ того *Ferrum aceticum*, также *Nerac Sulph.* и скоро волосы окрѣпнутъ.

Какъ должно употреблять холодную воду и до какой степени, это уже сказано, но еще должно прибавить, что всѣ друзья холодной воды и всѣ тѣ, которые употребляли ее снаружи или внутрь, рѣдко бываютъ лысыми.

### ОПУХОЛЬ ЩЕКЪ, ФЛЮСЪ.

Опухоль щекъ, флюсъ можетъ происходить отъ многихъ причинъ, но чаще всего онъ бываетъ послѣ сильной зубной боли, которая обыкновенно проходитъ, когда появится опухоль. Тѣ же самыя средства, которыя употребляются для уменьшенія и истребленія зубной боли, могутъ быть употреблены также и противъ флюса, таковы: *Arnica montana*, *Mercurius vivus*, также *Chamomilla* и *Nux vomica* повторяя приемъ черезъ 2 часа. Если при этихъ средствахъ опухоль не пройдетъ, то можно также прикладывать для разрѣшенія ее снаружи мѣшечки съ теплыми ржаными отрубями или льняною мукою.

Холодная вода и тутъ оказываетъ полезныя услуги: возьми ее нѣсколько въ ротъ и склонись въ ту сторону, гдѣ опухоль, положи снаружи примочки изъ холодной воды, или мой почаще ею распухшее

мѣсто, и опухоль скоро пройдетъ; всякая боль и болѣзненное чувство сжиманія скоро пропадутъ.

Есть еще родъ опухоли щекъ, извѣстный подъ именемъ *зушницы*, и въ самомъ дѣлѣ не иное что, какъ воспаленіе одной изъ околоушныхъ слюнныхъ железъ. Эта опухоль соединена съ значительною болью и препятствуетъ всякому жеванію и глотанію. Это воспаленіе рожистое и соединено съ сильною лихорадкою, языкъ бываетъ сильно обложенъ. Эта болѣзнь обыкновенно наступаетъ весною и осенью, особенно въ сырыхъ мѣстахъ, распространяется часто подобно заразѣ, поражаетъ преимущественно юношество и при томъ мужескаго пола. Она сама по себѣ не опасна, хотя тягостна и болѣзненна; но можетъ слѣдаться опасною; больной не долженъ выходить изъ комнаты цѣлую недѣлю и употреблять въ точности означенныя средства и скоро болѣзнь его оставитъ. Лучшее средство и особенно въ началѣ *Aconitum Napellus* и потомъ 3 раза въ день по 2 капли *Mercurius solubilis*. Если же воспаленіе рожистое, если оно перейдетъ на мозгъ и произведетъ бредъ, то должно принять также *Belladonna*, а если она не поможетъ, то *Hyoscyamus niger*. Если опухоль очень тверда и не будетъ уменьшаться, то должно употреблять *Carbo vegetabilis*, если же ночью начнутся сильные лихорадочные припадки, то должно дать *Rhus toxicodendron*. Въ прошломъ году я вылѣчилъ многіе случаи этой болѣзни *Aconitum* и *Mercurius solub*; а не сильное затвердѣніе посредствомъ *Calcareae carbonica*.

#### СОЛИТЕРЪ.

Солитеръ есть глеста длинная, отъ 15 до 60 футъ и болѣе, плоская, широкая, лентообразная, почти

четырёхъугольная, съ ясно означенными членами бѣлаго цвѣта. Она имѣетъ пребываніе въ тонкихъ кишкахъ, причиняетъ судороги, конвульсіи и слабость, и сильно изнуряетъ того человѣка, который ее имѣетъ. О существованіи ея всего яснѣе можно убѣдиться по отдѣльнымъ частямъ этой глесты, выходящимъ во время испражненія, другіе же знаки, какъ то зудъ въ рукахъ и въ ногахъ, подъ носомъ, боль въ животѣ, урчаніе въ животѣ, тошнота и рвота, сильной голодъ, который скоро уступаетъ чувству сытости, всѣ они обманчивы и могутъ привести къ заключенію о существованіи другихъ глестовъ. Что производитъ эту глесту въ кишкахъ, переходитъ ли она наследственно отъ родителей къ дѣтямъ, попадаютъ ли яйца этой глесты туда съ питьемъ или пищею и превращаются тамъ въ глесту, или избытокъ и излишекъ лимфы воспитываетъ ее, ученые врачи не совѣмъ согласны; но опыты показываютъ что эта глеста, какъ и всѣ глесты вообще, заводится преимущественно въ кишкахъ, при неправильномъ отправленіи ихъ, и исчезаетъ сама собой, если устранить неправильное отправленіе. Солитеръ питается не самими кишками, а нечистотами ихъ, и онъ остается тамъ, пока состояніе кишекъ одинаково съ тѣмъ, при которомъ онъ образовался и выросъ; но онъ начинаетъ обременять, т. е. беспокоить и причинять упомянутые припадки, какъ скоро положеніе его измѣнится т. е. когда начнутъ на него дѣйствовать лекарствами для истребленія.

Гомеопатическія средства, которыя должно употреблять противъ солитера преимущественно, и признанныя врачами за специфическія, суть *Filix mas*, *Mercurius vivus*, *Sabadilla*, *Arsenicum album*, *Natrum muriaticum*, *Phosphor.*, *Sabina* и *Valeriana*. Въ боль-



шой части случаевъ довольно и одного *Filix mas*, *Sabina*, *Sabadilla* и *Valeriana* утромъ и вечеромъ по приему, предполагая, что существованіе солитера не подлежитъ сомнѣнію. Но однако здѣсь потребенъ совѣтъ врача, который лучше можетъ выбрать требуемое лѣкарство, сообразное симптомамъ.

Если же съ гомеопатическимъ лѣченіемъ соединить лѣченіе водою, этотъ ужасный истребитель уступитъ поле сраженія или, лучше сказать, выйдетъ въ поле чрезъ кишки. Опытъ показываетъ, что эта глиста (и вообще глисты) образуется и живетъ у дѣтей, которые волучили неправильное физическое воспитаніе, и которыхъ кормили очень жирными, мучнистыми, трудноваримыми кушаньями, какъ то, картофелемъ, и т. п., даѣе у такихъ дѣтей, которые растутъ въ сырыхъ, темныхъ и неопрятныхъ комнатахъ и болотистыхъ странахъ. Кишечной каналъ у такихъ людей болѣзненно измѣненъ; массы нечистотъ отложились въ кишкахъ, гдѣ глисты чувствуютъ себя спокойно, живутъ какъ бы въ своей сферѣ. Если же больной перемѣнитъ образъ жизни, не будетъ болѣе ѣсть пищи благопріятной для глистовъ, будетъ пить много холодной воды, которая также способна выгонять нечистоты изъ желудка и кишекъ самымъ естественнымъ образомъ, тогда глисты становятся не ловко; если же безпрестанно будетъ дѣйствовать на нее такое не свойственное ей питье, а выгодныя для нея условія уменьшатся, то она выйдетъ вонъ съ остатками нечистотъ. Если это случится, то каждый день должно вышивать значительное количество холодной воды и ѣсть здоровую, крѣпительную и растительную пищу; также тѣло должно часто купать, мыть, желу-

докъ и животъ тереть рукою или губкою съ водою покрѣпче.

## ВОСПАЛЕНІЕ ВЪ ЖИВОТѢ.

Воспаленіе въ животѣ, къ которому относится всѣ воспаленія органовъ, лежащихъ въ полости живота, какъ то: печени, желудка и кишекъ, узнается преимущественно по слѣдующимъ симптомамъ: сильному запору при постоянной надутости живота, холоду въ конечностяхъ, по тоскѣ и безпокойству, сильной лихораикѣ, по обсунувшемуся, блѣдному и часто темному цвѣту лица, по колючей, рѣжущей и жгучей боли въ той или другой части живота. Оно есть одна изъ опаснѣйшихъ болѣзней и легко можетъ причинить смерть, если не довольно рано будетъ искорено, потому излеченіе этой болѣзни предоставлено искусному врачу. Не-врачъ не всегда могъ бы приискать средства, сообразно случаю, особенно же потому, что при извѣстныхъ перемѣнахъ симптомовъ должны быть даваемы другія средства, а глазъ не ученато, хотя опытнаго, не можетъ быть довольно проницателенъ. Поэтому здѣсь должно сказать, что долженъ дѣлать больной или его окружающіе въ первые часы, когда болѣзнь еще только образовалась и развивается даѣе, прежде чѣмъ врачъ можетъ быть призванъ на помощь, для того чтобы сдѣлать теченіе болѣзни менѣе опаснымъ или отнять у него первую силу. Надутость живота не должна побуждать къ клистирамъ, этимъ только можно усилить болѣзнь. Опасность для больного напротивъ того тогда только начинается, когда появится поносъ. Чѣмъ дольше запоръ, тѣмъ болѣе надежды на скорое выздоровленіе.

Потому при наступленіи симптомовъ воспаления въ животѣ, должно тотчасъ послать за врачомъ, а до пріѣзда его давать больному нѣсколько приѣмовъ Aconitum (3 капли на 6 ложекъ воды) съ короткими или долгими промежутками, смотря потому сильнѣе или слабѣе становится болѣзнь. Жажду больного дол по утолить холодною водою и давать ему иногда слизистую пищу. Въ деревнѣ, гдѣ нѣтъ врача и когда онъ можетъ прибыть спустя нѣсколько часовъ, должно давать больнымъ, если послѣ приѣма Aconitum Napellus усилятся боль въ животѣ, одинъ или даже два раза по 2 капли Arsenicum, а потомъ по прошествіи 3 часовъ опять Aconitum. Если болѣзнь очень сильна, то должно давать эти средства черезъ каждую четверть часа. Если же нѣтъ вблизи гомеопатическаго врача, то должно продолжать эти средства, давать также Nux vomica, Carbo vegetabilis и употреблять въ тоже время холодную воду ввѣтру и снаружи; послѣдую не иначе, какъ по назначенію врача. Иные люди покачаютъ головой, а иные врачи будутъ говорить о нецѣлности этого, но все таки вода поможетъ удалить воспаление, потушить жажду, произведетъ правильное и здоровое испражненіе и дастъ кишкамъ новую дѣятельность. Для этой цѣли должно выпивать черезъ четверть часа по хорошему стакану воды, положить холодныя примочки на воспаленное мѣсто живота; а другую примочку держать уже на-готовѣ; первую отнять, какъ скоро она нагрѣется и приложить вторую и такимъ образомъ продолжать перемѣну, пока пройдутъ всѣ симптомы этой болѣзни и больной перестанетъ чувствовать боль, хотя въ началѣ этого леченія больному будетъ и хуже, больной будетъ дрожать отъ холода, но не должно заблуждаться на счетъ этого, въ скоромъ

времени обнаружится польза этого леченія и наступитъ скорое выздоровленіе. При этомъ должно употреблять и упомянутыя немногія гомеопатическія средства.

## ПЬЯНСТВО.

Это одинъ изъ самыхъ низкихъ и постыдныхъ пороковъ, которымъ человѣкъ можетъ предаваться; въ такомъ состояніи онъ не можетъ болѣе управлять своими чувствами и членами, стоитъ ниже животнаго и обыкновенно становится посмѣшищемъ юности и предметомъ сожалѣнія для всякаго образованнаго человѣка. Между тѣмъ какъ укоренился онъ въ нижнемъ классѣ народа! Желательно, чтобы человѣчество скорѣе отказалось отъ него, и освободилось отъ его ига. Опьяненіе есть слѣдствіе излишне употребленнаго количества водки, пива или даже вина, и обнаруживается у человѣка шатающею походкою, пристальнымъ взглядомъ, болтливостію, и рвотою всего съеденнаго и т. д. Лучшее, что можно присовѣтывать пьяному, это— чтобы онъ выпилъ двѣ чашки крѣпкаго кофе и потомъ положить его въ постель; если же ему нужно скоро протрезвиться, то, когда онъ здоровъ и силенъ, ему можетъ помочь щекотаніе и поворачиваніе бородакою пера въ глоткѣ, послѣ чего послѣдуетъ сильная рвота, которая уничтожитъ опьяненіе. Хорошо съѣсть горькую миндалину при опьяненіи виномъ, а соленая вода годится при опьяненіи водкою. Гомеопатическія средства отъ него суть: Belladonna, Opium и Nux vomica. Очень скоро достигаютъ цѣли съ помощію холодной воды, лучшаго изъ всѣхъ средствъ,

при леченіи всякаго рода пьянства. Всякій, кто легко пьянъ и еще управляетъ своими чувствами, когда хочетъ, чтобъ хмѣль его не былъ замѣченъ, выпьетъ два стакана воды въ той увѣренности, что она возвратитъ ему полный разумъ, свѣжесть и силу; поэтому совершенно пьянаго нужно поскорѣ заставить выпить сряду нѣсколько стакановъ воды, а если онъ отъ того отказывается, или уже не можетъ пить отъ переполненія желудка спиртными напитками, то должно поливать голову холодною водою или лучше все тѣло. Это его скоро протрезвитъ. Въ деревняхъ не церемонятся съ пьяными людьми, найденными на улицѣ. Ихъ приносятъ къ ближайшему колодезю и скорѣ послѣ того они сами уже могутъ отыскивать свои жилища. Пьяные, которые имѣютъ еще нѣсколько стыда и скоро желаютъ протрезвиться, а потому желали бы знать средство, чрезъ которое можно скрыть слѣды большого пьянства, могутъ достигнуть желаемой цѣли, если приложить къ бедрамъ и къ дѣтороднымъ органамъ платки, намоченные холодною водою.

#### ВѢТРЫ ВЪ ЖИВОТѢ. КОЛИКА ОТЪ СКОПЛЕНІЯ ВѢТРОВЪ ВЪ ЖИВОТѢ.

Хотя эти припадки нельзя причислить къ настоящимъ болѣзнямъ, но они, какъ видно изъ названія, такъ часто мучаютъ, беспокоятъ больныхъ, что могутъ лишить ихъ нѣкоторыхъ удовольствій и выгоды. Обыкновенно такіе особы подвержены имъ, которыя принуждены по своему роду занятій вести сидячую жизнь и потому имѣть мало движенія, ко-

торыя рѣдко пользуются чистымъ свѣжимъ воздухомъ и часто употребляютъ горячительные напитки къ мнимому укрѣпленію своего тѣла; также такіе особы, которыя ослабили органы пищеваренія удобствами разнаго рода, ѣдою, питьемъ и чрезмѣрнымъ удовольствіемъ плотскихъ побужденій; желудокъ у нихъ потерялъ свою силу и сократительность. Также геморроидальная болѣзнь способствуетъ этимъ припадкамъ. Такіе особы мгновенно страдаютъ сильными болями, если что нибудь съѣдятъ отдѣляющее кишечные газы, какъ то: жирныя кушанья, овощи, кушанья изъ капусты, луку, чесноку, гороху, сыру и проч., также молодое пиво и свѣжее или кислое молоко.

Животъ при этомъ сильно раздувается, грудь стѣсняется, дѣлается одышка, сердцебиеніе, члены дрожатъ, голова значительно болитъ, и боль лишь тогда уменьшается, когда выйдетъ нѣсколько вѣтровъ. Какъ средства отвращающія должно присоединять частое, ежедневное движеніе на чистомъ воздухѣ, теплое содержаніе ногъ, оставленіе всѣхъ тѣхъ кушаньевъ и напитковъ, которые способны производить вѣтры и умѣренное употребленіе кушаньевъ легко варимыхъ и укрѣпляющихъ желудокъ, хлѣба съ масломъ, хорошаго и крѣпкаго супа съ говядиною, жаркое въ маломъ количествѣ, особенно изъ дичи, хорошее переброженное пиво и стаканъ хорошаго цѣльваго вина и особенно краснаго. Изъ гомеопатическихъ средствъ особенно слѣдуетъ употреблять: *Nux vomica*, *China*, *Pulsatilla* по 2 капли два раза въ день, а при сильномъ раздутіи живота *Colchicum autumnale*.

Еще лучше вмѣстѣ съ употребленіемъ гомеопатическихъ средствъ соединить также и леченіе водою.



Пить прилѣжно холодную воду, купаться, тереть въ купальнѣ животъ рукою покрѣпче кругообразно, брать иногда холодныя ванны до пояса такимъ образомъ: небольшую ванну до половины налить водою и сѣсть туда такъ, чтобы вода доходила до живота и безпкойные вѣтры не только пройдутъ въ скоромъ времени, но и ослабшіе органы пищеваренія обыкновенно окрѣпнутъ. Если при этомъ дѣлать много движенія на воздухѣ, то не только со временемъ боль совершенно уничтожится, но больной уже будетъ въ состояніи ѣсть безъ всякаго вреда и безпкойства кушанья, которыя способны были прежде, при слабости пищеварительнаго аппарата, причинять сильныя вѣтры.

### ОСПА.

Оспа есть повальная сыпная болѣзнь, которой предшествуютъ при ея началѣ лихорадка, безпкойство, бессонница, дрожь, мутность глазъ, сильная жажда, зудъ въ носу, запоры, и которая первоначально показывается на лицѣ, потомъ на шеѣ, рукахъ, на груди и наконецъ на животѣ, въ видѣ красныхъ пятенъ, кои иногда въ продолженіи нѣсколькихъ часовъ переходятъ въ волдырьки. Изъ нихъ развиваются въ послѣдствіи, при опухлости кожи, маленькіе пузырьки, которые содержатъ свѣтлую жидкость, и имѣютъ на верхушкѣ маленькое углубленіе. По прошествіи 7 дней, въ теченіи которыхъ пузырьки переходятъ въ большіе (до величины зерна чечевицы или же мелкаго гороха), жидкость содержащая въ пузырькахъ, превращается въ

гной, первоначальныя ямочки при верхушкахъ пропадаютъ, окружность оспинъ воспаляется, болѣзнь достигаетъ полного развитія. Лице дитяти очень распухло и вѣки его совершенно закрыты. Дыханіе дурнопахуче, моча очень мутна, дитя чрезвычайно вяло и слабо, голосъ его очень слабъ. Черезъ 2 или 3 дни пузырьки опадаютъ, лопаются и освобождаются отъ гноевиднаго содержимаго, потомъ засыхаютъ. Послѣ они отпадаютъ въ видѣ коры, оставляя значительныя рябины, сначала темнокрасныя, а потомъ остающіяся часто до самой старости. Смотря потому, гдѣ были пузырьки по одиночкѣ или слились вмѣстѣ въ большемъ числѣ на значительномъ прогяженіи, остаются болѣе или менѣе замѣтныя рябины. Оспа по большей части злокачественна, часто причиняетъ смерть или обезображиваетъ человѣка, потому что оставляетъ очень замѣтные слѣды на его лицѣ, и на всемъ тѣлѣ вообще. Многіе люди совершенно ослѣпли отъ этой болѣзни; другіе же имѣли отъ нея слабое зрѣніе. Благодарность благо разумному Дженнеру, который посредствомъ такъ называемаго оспопрививанія положилъ предѣлъ этой господствующей прежде болѣзни и прекратилъ ее; а если даже бываетъ оспа у человѣка съ привитою оспою, то все таки она далеко не такъ опасна, какъ у человѣка съ непривитою оспою.

Если мы будемъ отыскивать вещественныя причины этой опасной болѣзни, то не найдемъ другихъ причинъ кромѣ свойственнаго всѣмъ людямъ, а особенно дѣтямъ, расположенія къ ней или восприимчивости. Климатическія и атмосферныя явленія содѣйствуютъ тоже ея образованію; но ближайшая причина есть зараза. Самое зараженіе происходитъ частію отъ прикосновенія тѣломъ, частію изъ

атмосфернаго воздуха, который переноситъ заразительную матерію на нѣжныя и легко поражаемыя части дѣтскаго тѣла. Употребительныя гомеопатическія средства суть: въ началѣ лихорадки: Aconitum Napellus (3 капли на 6 ложекъ воды черезъ часъ по ложкѣ) Coffea cruda; Bryonia назначается, когда сыпь быстро высыпаетъ. Если дитя жалуется на сильную головную боль, или часто трогаетъ рукою голову, то должно дать 1 или два приема Belladonna. Если оспины дѣйствительно прорвались, то можно съ пользою употреблять утромъ и вечеромъ по 2 капли Mercurius vivus, позже Sulphur. Если при этомъ лихорадка, то должно дать приема два Aconitum. Arsenicum album тамъ назначается, гдѣ жидкость слѣдается гноевидною и должно опасаться антонова огня, также полезны здѣсь Lachesis, Hyoscyamus, Carbo vegetabilis; если начнутся боли въ животѣ, то должно дать нѣсколько приемовъ Ipecacuanha, Antimonium crudum и Bryonia. Если оспины совершенно пропали и остаются еще слѣды болѣзни, какъ то глубокія ямки, хроническое страданіе глазъ, или даже слѣпота, то должно давать Sulphur, Baryta carb., Rhus toxicodendron, Euphrasia и Arsenicum album по одному приему въ день. Часто послѣ оспы случается и костоѣда, противъ нея преимущественно дѣйствуютъ Silicea, Acidum Nitri. Однако эти средства рѣдко употребляютъ, потому что высыпаніе натуральной оспы предупреждается прививаніемъ коровьей оспы. Однако въ мѣстѣ жительства автора случилось 6 лѣтъ тому назадъ, что многіе, даже взрослые, заболѣли натуральною оспою и прошли чрезъ всѣ степени этой болѣзни. Подобно какъ и здѣсь, и въ другихъ мѣстахъ могутъ произойти подобные случаи, должно упомянуть, что эти

особы носятъ весьма явственную печать этой болѣзни на своемъ лицѣ.

Есть еще другой родъ или видоизмѣненіе этой болѣзни, болѣе слабый видъ настоящей оспы. Онъ извѣстенъ подъ именемъ *ложной оспы*; съ виду она весьма походить на натуральную, но при ней лихорадка гораздо слабѣе, лимфа въ пузырькахъ не переходитъ въ гной и часто также совѣмъ лимфы не бываетъ, онѣ поэтому и не образуютъ такой сильной и жесткой коры и не оставляютъ углубленій; и въ сильной степени болѣзни они представляютъ только красныя возвышенныя пятна.

Средства, которыя здѣсь должно употреблять, суть тѣже самыя, какъ и были выше упомянуты, сообразно появившимся симптомамъ.

Есть еще третій родъ, который называется *летучею оспою*. Однако она очень походить на настоящую оспу, но весьма слаба и доброкачественна и проходить гораздо скорѣе первой. И здѣсь существуетъ лихорадка, однако большею частію безъ жажды больного, жаръ не распространяется по всему тѣлу, но сосредоточивается въ какой-либо отдѣльной части. Также оспа открывается не на лицѣ, а съ начала на спинѣ, груди, на членахъ и все это совершается въ теченіи 4 часовъ. Оспины бываютъ по большой части отдѣльно и скоро переходятъ въ маленькія воспаленныя шишки, которыя содержатъ въ верхушкахъ водянистую, прозрачную матерію. Со временемъ свѣтлая матерія эта дѣлается мутною, желтою и вытекаетъ вонъ или засыхаетъ и образуетъ тонкіе желтоватыя струнья, которые чрезъ нѣсколько дней спустя опадаютъ, не оставляя углубленій, однако остаются красныя пятна нѣкоторое время. Хотя

этотъ родъ обыкновенно доброкачественъ, и скорѣе проходитъ, чѣмъ настоящая оспа, но все таки онъ можетъ причинить дитяти много боли, особенно если онъ осложнится, а родителямъ много безпокойства и страха. Такъ часто присоединяется еще лихорадка отъ прорѣзанія зубовъ, и болѣзнь дѣлается еще опаснѣе. Тутъ должно тотчасъ дать 1 или 2 приема *Aconitum Napellus*. Если начнутся конвульсии, то должно принимать *Chamomilla* черезъ два часа по 2 капли, а если голова въ жару, горяча на ощупь, то *Belladonna* 3 раза въ день по 2 капли; послѣднее средство особенно должно рекомендовать, уважать и принимать потому, что оно можетъ отвратить водяную болѣзнь въ полости черепа, которая возможна при воспаленіи мозга. Если болѣзнь сама по себѣ и не осложнилась, то главнѣйшее средство противъ нея *Pulsatilla* (3 приема въ день). Также это средство дѣйствуетъ какъ предохраняющее.

Но при натуральной оспѣ, какъ при летучей и ложной оспѣ, должно непременно призвать искуснаго врача.

Холодная вода также оказываетъ здѣсь свое хорошее дѣйствіе, но ее не должно употреблять иначе, какъ подъ руководствомъ врача и притомъ слѣдующимъ образомъ: дитяти должно давать для питья чистой рѣчной воды, должно мыть пораженные мѣста нѣжною и мягкою губкою или льняною тряпкою, особенно лице и преимущественно глаза, когда они болятъ или мокнутъ, или поражены оспою, тогда болѣзнь пройдетъ гораздо скорѣе и безопаснѣе, и лице впоследствии не будетъ обезображено.

## БЛѢДНАЯ НЕМОЧЬ.

Блѣдная немочь сама по себѣ не опасна, но легко можетъ слѣлаться таковою, если ее не лечить, или же употреблять средства негодныя. Большею частію ей подвержены бывають молодыя дѣвушки, которыя еще не имѣли регулъ, или у которыхъ появленіе оныхъ затруднено. Симптомы ея, какъ видно изъ самаго названія, суть: очень блѣдный цвѣтъ лица и губъ, синія полосы вокругъ глазъ, раздутой животъ при трудномъ испражненіи, біеніе сердца, тягость въ членахъ, увеличивающаяся слабость, головокруженіе, тоска и т. д. Дурная діета еще болѣе усиливаетъ эту болѣзнь, равно также, какъ и употребленіе большаго количества теплыхъ напитковъ. Лучшія средства противъ нея суть ежедневное движеніе на воздухѣ даже по нѣсколькимъ часамъ, регулярная діета, однако крѣпительная и не дѣлающая запора, спанье на матрасѣ, посѣщеніе общества, въ которомъ господствуютъ веселость, образованныя бесѣды, путешествіе, всего лучше пѣшкомъ, а если этого не позволить слабость, то въ повозкѣ, которая доставитъ тѣлу необходимое движеніе, но не должно класть пуховиковъ или много подушекъ. При этомъ должно принимать черезъ два дни по одному приему *Platina*. Также *Vryonia* приноситъ пользу.

Чрезвычайно благотѣльно и крѣпительно дѣйствуютъ на такихъ больныхъ питье холодной воды и купанье въ ней; еще сильнѣе дѣйствуютъ морскія ванны. Гдѣ этого нельзя слѣлать, тамъ должно ежедневно мыть все тѣло водою, только что взятою изъ колодца, и особенно должно тереть позвоночникъ внизъ по направленію къ заднему проходу, потому



бедра и половые органы, и должно ежедневно брать по нѣскольку разъ холодныя поясныя ванны. Холодная вода укрѣпляетъ ослабшія связки и весь ослабшій организмъ, приведетъ въ нормальное состояніе кровообращеніе и возстановитъ правильныя очищенія, недостатокъ которыхъ и застой причинили эту болѣзнь; скоро блѣдный цвѣтъ лица исчезнетъ и во всю щеку разцвѣтутъ розы здоровья.

### СЛѢПОТА. ТЕМНАЯ ВОДА.

Объяснить эту болѣзнь, симптомы ея и средства противъ нея я считаю излишнимъ, потому что ее должно поручить при самомъ началѣ и во время полнаго развитія искусному главному врачу. Болѣзнь, предшествующія слѣпотѣ или болѣзни, условливающая слѣпоту, должно читать въ воспаленіи глазъ.

### ПОРАЖЕННЫЕ МОЛНІЕЮ.

Если въ домѣ человѣкъ будетъ пораженъ молніею, то должно поскорѣе открыть окно и двери, чтобы разошлись сѣрные пары и поскорѣе могли войти свѣжій атмосферный воздухъ; но должно быть самому осторожнымъ и держать сырой платокъ передъ носомъ и ртомъ, чтобы отстранить отъ себя опасность задохнуться. Слѣдуетъ пораженнаго молніею перенести на воздухъ, предполагая, что молнія не разрушила внутренняго организма и не сожгла человѣка, и что еще существуютъ признаки жизни, или еще они могутъ быть; должно возобновить къ нему доступъ свѣжаго воздуха, или чтобы его смочило дождемъ; если дождь неидетъ уже болѣе, то

должно sprysнуть холодною водою или укусуемъ, го лице, виски, подъ ложечку, и положить холодныя примочки на голову. Если есть подъ рукою нашатырный спиртъ, то должно его держать не со всѣмъ однако подъ носомъ; за неимѣніемъ его должно взять бородку отъ пера, сжечь ее на свѣчкѣ и стараться, чтобы коснулся этотъ дымъ до носа больного. Должно скорѣе призвать врача или оператора.

Если человѣкъ былъ пораженъ молніею въ полѣ, то свѣжій воздухъ и дождь сами оказываютъ первыя услуги, и тогда только нужно разрыть землю и потомъ привести его въ полусидячее, въ полулежащее положеніе и прикрыть его слегка землею до самага лица. Также и здѣсь можно давать нюхать нашатырный спиртъ. Если дыханіе возвратится, сдѣлается замѣтнымъ легкое дыханіе; глаза опять начнутъ двигаться, то должно расположить лице въ тѣни, чтобы свѣтъ солнца не дѣйствовалъ вредно на глаза, потомъ его должно перенести въ домъ, дать нѣсколько пріемовъ Nux vomica и передать дальнейшее медицинское пользованіе врачу или хирургу. Довольно часто были случаи, что люди, пораженные молніею, были возвращены къ жизни посредствомъ сообразнаго леченія, однакоже они не были непосредственно поражены молніею. Если бы послѣднее случилось, то всѣ попытки сдѣлались бы тщетными. Люди, которые поражены молніею въ комнатѣ, вѣроятно повергнуты бываютъ на полъ и оглушены силою удара въ другіе предметы, находящіеся въ комнатѣ и также страхомъ задохнуться отъ сѣрнаго дыма; такіе люди могутъ опять быть возвращены къ жизни при вышеупомянутомъ леченіи. Дѣйствительно пораженные молніею не

могутъ быть опять оживлены, хотя ударъ былъ слабъ и повредилъ только отдѣльныя части тѣла

### КРОВОХАРКАНІЕ, КРОВОТЕЧЕНІЕ ГОРЛОМЪ И КРОВОТЕЧЕНІЕ ИЗЪ ЛЕГКИХЪ И МАТКИ.

Кровохарканіе весьма серьезная болѣзнь, вынуждаетъ тотчасъ призвать искуснаго врача, и если оно не будетъ скоро прекращено, то можетъ превратиться въ настоящее кровотеченіе и подвергнуть жизнь большой опасности, даже можетъ случиться мгновенная смерть. Кровью кашляющій или харкающій уже заранѣе чувствуетъ, что такой кашель наступитъ, появляется частое покалываніе, жженіе и колюще въ груди, чувство возвышеннаго тепла въ груди, искры въ глазахъ и сладковатый вкусъ, который поднимающаяся кровь приносить съ собою. Если сдѣлаются такіе признаки начинающагося кровохарканія, то должно оставить всякое тѣлесное усиліе, остерегаться громкаго разговора, пѣнія, крика, или поднятія большихъ тяжестей, должно лечь однако такъ, чтобы голова и грудь лежали повыше, содержать ноги въ теплотѣ, завернувъ ихъ въ шерстяныя одѣяла, и сначала натереть хорошенъко щеткою или поставить въ теплую ванну. Употребленіе холодной воды при кровохарканіи допущено быть можетъ лишь по назначенію врача и тогда грудь должно мыть водою, холодною какъ ледъ, или прикладывать примочки изъ платковъ, окунутыхъ въ холодную воду и какъ скоро согреются, прикладывать новыя. Кровохарканіе легко этимъ устраняется, или очень уменьшается. Внутри же должно

дать нѣсколько пріемовъ *China* и *Arnica montana*. Обмываніе груди съ примачиваніемъ должно продолжаться. Если кровохарканіе прошло, или вовсе не являлось отъ употребленія холодной воды, то должно мыть грудь отъ 3—4 разъ ежедневно холодною водою, также все тѣло; употреблять болѣе холодныя, чѣмъ горячіе напитки, особенно воду, избѣгать всякихъ сильно приправленныхъ кушаній, спиртныхъ напитковъ, всякой работы сильно утомляющей тѣло, и дѣлать ежедневно не большое и не утомляющее движеніе, избѣгать сильнаго противнаго вѣтра при ходьбѣ, избѣгать всякаго дыма, пара, сѣрныхъ паровъ, куренія табаку, и должно выставить грудь почаще впередъ, что можно легко сдѣлать, если сложить обѣ руки на спинѣ и въ такомъ положеніи прохаживаться нѣкоторое время. На гуляньяхъ тоже можно это дѣлать. Все это необыкновенно укрѣпляетъ и усиливаетъ грудь и припадки не такъ скоро возвратятся. Если леченіе водою будетъ продолжаемо наружно и внутренно до конца жизни, то такой конецъ придетъ только въ глубокой старости, а до тѣхъ поръ человекъ можетъ пользоваться наилучшимъ здоровьемъ. Кромѣ *China* должно употреблять *Arnica*, *Bryonia*, *Carbo vegetabilis*, *Mercurius vivus*. Что касается до причинъ, причиняющихъ кровохарканіе, то ихъ должно искать то въ слишкомъ давленіи на грудь, въ ударѣ, паденіи на грудь, то въ остановкѣ обычныхъ кровоизліяній, то въ излішествахъ, особенно въ плотской любви и отъ того произшедшей слабости, или въ дурно вылеченной сифилитической болѣзни, или въ геморроѣ, который наступилъ въ слишкомъ ранній лѣта; или въ самой груди, слишкомъ плоской, мало округленной и маловыпуклой, у молодыхъ особъ, которыя

быстро выросли. Такъ какъ послѣ кровохарканія, плеванія кровью и кровотеченій, хотя они и не убиваютъ человѣка, легко образуются болѣзни опасныя для жизни, какъ то: сухотка, лёгочная чахотка, то должно противодѣйствовать имъ возможными средствами; лучшія же средства противъ нея суть діета, ежедневное движеніе на воздухѣ, избѣжаніе всякихъ спиртныхъ напитковъ, по крайней мѣрѣ въ юномъ возрастѣ и употребленіе снаружи и внутрь холодной воды, однако ежедневно, съ современнымъ употребленіемъ гомеопатическихъ средствъ.

*Кровотеченія изъ лёгкихъ* болѣе опасны, чѣмъ кровохарканіе и плеваніе кровью, потому что здѣсь за одинъ разъ изливается много крови черезъ ротъ, или какъ говорятъ: кровь течетъ гортанью. Такое кровотеченіе можетъ тотчасъ пресѣчь жизнь. Должно позвать врача, но прежде, чѣмъ онъ прійдетъ, должно сдѣлать все возможное, при неожиданности случая, для уменьшенія опасности. Но то, что здѣсь, можетъ быть употреблено, упомянуто уже выше при кровохарканіи; хорошо однако, если можно тотчасъ поставить ноги въ горячія ванны. (Горячая вода съ золою, съ солью и приведенная къ едва сносной теплотѣ и перевязки лѣвой руки и праваго бедра платкомъ такъ крѣико, какъ только можетъ переносить больной). Также должно дать нѣсколько разъ China попеременно черезъ часъ съ Arnica и употреблять прилѣжно холодную воду.

Очень опасны бываютъ *кровотеченія изъ матки* у беременныхъ женщинъ, или же вскорѣ послѣ выхода послѣда. Должно перенести больную въ постель, если она ходила, и приказать ей или доставить ей совершенное спокойствіе и неподвижность. Въ домѣ и въ комнатѣ должно остерегаться всякаго шума.

Должно дать ей понюхать уксусу, также потереть немного имъ виски и половые органы и давать ей пить, если есть жажда, только одинъ прохладительный напитокъ — воду.

Въ тоже время должно дать нѣсколько приѣмовъ Arnica и потомъ China. Ipecacuanha тамъ специфиченъ, гдѣ кровотеченіе сильно и упорно, тѣло дрожитъ отъ холода и голова въ значительномъ жару. Если кровь окрашена въ темнокрасный цвѣтъ, то должно давать Bryonia. Но лучшимъ средствомъ остается China. Тѣ, которые не имѣютъ подъ рукой гомеопатической аптеки, и должны далеко посылать за лекарствами, хорошо бы сдѣлали, если бы взяли въ ротъ кусокъ корицы и жевали его, прежде чѣмъ подоспѣютъ средства; если же имѣется дома настойка корицы, то должно капнуть 2 капли этой тинктуры въ чайную чашку воды, размѣшать хорошенько, принять чайную ложечку полную, а потомъ и еще, если припадокъ возвратится. Лучшія услуги и здѣсь окажетъ холодная вода именно въ примочкахъ къ животу между бедрами. Нечего и напоминать, что такіе больные послѣ случившейся болѣзни должны себя беречь, а если онѣ хотятъ и на будущее время быть свободны отъ такихъ кровотеченій, то имъ слѣдуетъ продолжать употреблять сказанныя средства и водолеченіе; ибо они могутъ повториться при всякой новой беременности.

#### ЧИРЬИ. ВЕРЕДА.

Эти воспалительныя опухоли въ клѣтчаткѣ въ высшей степени болѣзненныя могутъ образоваться во всякой части тѣла и часто достигаютъ величины голубинаго яйца. Они не легко могутъ быть разрѣ-



шены, однако есть средства, чтобы сдѣлать скорѣ ихъ теченіе, т. е. скорѣ привести ихъ къ зрѣлости и къ выпуску гноя, который мало по малу образуется посреди ихъ. Послѣдній въ началѣ смѣшанъ съ кровью, глубже въ нарывѣ остается стержень или толстая затычка вязкая, изъ гноя, которая должна быть вынута, дабы не причинила новыхъ нарывовъ и опухолей. Но хотя его насильное удаленіе причиняетъ не малыя боли, однако лучше ихъ вытерпѣть, чѣмъ быть обременену нарывами вновь и на долго. Тѣ средства, которыми обыкновенно употребляются, чтобы ускорить ходъ болѣзни, всѣ никуда не годятся, даже равнее созрѣваніе, ибо гнойная матерія, которая находится въ центрѣ нарыва, остается тамъ и новые нарывы могутъ опять образоваться. Поэтому не должно допустить прикладываніе жаренаго лука, меда, сахара и многія другія, исключая развѣ жеваннаго хлѣба съ масломъ. Внутри же слѣдуетъ принять нѣсколько пріемовъ *Agnica montana*, а если новые нарывы будутъ образовываться, то *Spiritus Sulphuratus*. Въ послѣдствіи же должно черезъ каждые 2 дни принимать по одному пріему *Sulphur*, можетъ быть въ теченіи 14 дней, съ тѣмъ, чтобы самая причина этихъ нарывовъ была изгнана изъ тѣла.

Если раны очень болятъ, и если онѣ, вмѣсто краснаго, синяго цвѣта, то должно принимать *Lachesis* отъ 2—3 пріемовъ. Такъ какъ водѣ очень свойственно очищать соки и истреблять всякое засореніе ихъ въ сосудахъ кожи, то это лучшее средство, которое можетъ оказать здѣсь пользу и оказываетъ ее. Хотя она и не можетъ истребить существующій нарывъ, и лишить его боли, но все таки она умень-

шаетъ боль при внутреннемъ употребленіи, при ежедневномъ питьѣ и при наружномъ употребленіи, прикладываніи холодныхъ примочекъ, ускоряетъ раскрытіе и удаляетъ причины къ образованію новыхъ чирьевъ.

### КРУПЪ.

Крупъ есть особенное воспаленіе дыхательнаго горла и преимущественно книзу отъ глотки; предшественники состоятъ въ нѣкоторыхъ катаральныхъ припадкахъ, какъ то: въ насморкѣ и кашлѣ, охриплости и пр. Они часто пренебрегаются родителями, пока особенный кашель, по большой опасности своей, не озаботитъ ихъ; этотъ кашель нельзя передать словами, и только тѣ, которые слышали его во время крупа у дѣтей, знаютъ хорошо его особенный звукъ. Этотъ кашель коротокъ, отрывистъ и послѣ каждаго кашля слѣдуетъ короткое свистящее дыханіе; похожъ онъ на лай маленькой собачки или на пѣвіе молодаго пѣтуха, съ сипящимъ крикомъ; сначала по большей части сухой, потомъ хриплый отъ мокроты и потому часто топокъ звукомъ, обыкновенно же передается въ высокій дискантъ. Часто дѣлаются паузы въ этомъ кашлѣ, но однако припадки дѣлаются все съ меньшими промежутками, сильнѣе и все опаснѣе. Лице дѣлается блѣднымъ, губы синеватыми и вздутыми, пульсъ ускореннымъ, жажда усиливается, моча очень окрашена, дитя очень слабо и сонливо. Ощупываніе шеи причиняетъ значительную боль; больной ищетъ облегченія въ отклоненіи головы назадъ и наклоненіи шеи впередъ. Въ тоже время дитя рветъ слизистою массою, похожею на сметану или сыръ, послѣ чего припадки уменьшаются и предполагается скорой ц

благоприятный исходъ болѣзни. Но очень скоро наступаютъ новые и сильные припадки кашля; дитя страдаетъ больше прежняго, выдыханія дѣлаются быстрѣе и свистящій тонъ становится сильнѣе. Артеріи шейныя и височныя бьются сильнѣе прежняго, синеватый цвѣтъ губъ дѣлается темнѣе, опасность задушенія все болѣе и болѣе. Кашель, который въ предпоследнемъ періодѣ слѣдовалъ быстрѣе прежняго, перестаетъ совершенно въ последнемъ періодѣ, но дыханіе дѣлается все труднѣе, свистящѣе и съ явнымъ напряженіемъ всего туловища; при этомъ пульсъ все дѣлается тише, оконечности холодѣютъ. Подергиванія начинаются въ тѣлѣ, холодный потъ покрываетъ его и наконецъ приходитъ избавительница, смерть дитяти, который въ ужасной тоскѣ и скорчилъ отъ сильной боли. Крупъ есть одна изъ жестокихъ и опаснѣйшихъ дѣтскихъ болѣзней и рѣдко имѣетъ благополучный исходъ при теперешнихъ аллопатическихъ способахъ леченія, и обыкновенно на 2 или на 3 день слѣдуетъ смерть. Большею частію противъ нея употребляются тѣ средства, которыя, хотя и пресѣкутъ жестокость болѣзни, но слишкомъ способны для того, чтобы впоследствии причинить молодому тѣлу продолжительную болѣзнь.

Но на долю гомеопатіи выпалъ счастливой жребій вылечивать скоро и легко эту болѣзнь, если она не слишкомъ запущена; и преимущественно въ началѣ болѣзни, весьма мало надо для ея основательнаго излеченія. Но все таки должно совѣтывать призвать гомеопатическаго врача, потому что онъ можетъ сообразить симптомы съ болѣе спокойнымъ и безстрастнымъ взглядомъ и сообразно съ тѣмъ предписать лекарства. Однако здѣсь должны быть названы тѣ различныя средства, которыя должны быть даваемы

сообразно различнымъ симитомамъ, дабы родители, особенно въ деревнѣ, гдѣ долго должно дожидаться прибытія врача, тотчасъ могли знать, какое средство должно дать дитяти сообразно тѣмъ или другимъ признакамъ.

Въ 1 періодѣ, періодѣ воспаленія, при короткомъ и быстромъ, но не шипящемъ кашлѣ, при большомъ жарѣ и сильной жадѣ должно давать черезъ каждыя  $\frac{1}{2}$  часа по одному приему *Aconitum Napellus*; 1 каплю въ чашку воды, хорошенько размѣшать и давать въ такіе промежутки по полной ложкѣ. Если воспаленіе устранено, но существуетъ сухой, отрывистый кашель, громкое свистящее дыханіе, тогда должно дать нѣсколько приемовъ *Spongia marina tosta* и наконецъ когда слышно будетъ хрипѣніе слизистой массы, находящейся въ дыхательномъ горлѣ, но кашель уменьшается, то *Hepar Sulphuris* черезъ часъ по 1 каплѣ. Если родители очень внимательны къ своимъ дѣтямъ и при 1-мъ началѣ дадутъ *Aconitum*, то этимъ вообще отклоняется сильная буря. Но если на самое начало не будетъ обращено должнаго вниманія или болѣзнь вдругъ наступила во всей силѣ, и не повинуются вышеозначеннымъ средствамъ, то должно давать въ короткіе промежутки отъ 3—4 приемовъ *Phosphorus*, *Moschus* и *Cuprum metallicum*. Но призванный врачъ уже опредѣлитъ средства, которыя должно принимать.

Эта болѣзнь поражаетъ только дѣтей отъ 1—10 года жизни, а если взрослые особы подвергались ей, то эти случаи принадлежатъ къ исключеніямъ. Расположеніе къ ней условливается мѣстными и атмосферными вліяніями, холодными и сырыми странами и мѣстами, холодною и сырою погодою, туманомъ, сырыми комнатами, которыя рѣдко имѣютъ доступъ

для вѣшняго воздуха и рѣзко очищаются, слишкомъ легкое одѣяніе и предшествовавшія кожные сыпи; но все это дѣйствуетъ къ образованію этой болѣзни у дѣтей, потому что въ этомъ возрастѣ развивается организмъ, особенно органы голоса и дыханія. Мальчики и сверхъ того сильныя болѣе подвергаются этой болѣзни, чѣмъ слабыя дѣвочки; дѣти также нѣсколько разъ могутъ заболѣвать крупомъ. Должно также упомянуть, что дѣти, которые перенесли эту опасную болѣзнь, должны долгое время оставаться въ теплой комнатѣ и тщательно предохраняемы отъ сквознаго вѣтра и простуды. И эта столь часто смертельная болѣзнь можетъ быть уничтожена скоро и вѣрно чрезъ употребленіе холодной воды, особенно въ 1 періодѣ. Должно полоскать глотку холодною водою такъ часто, какъ только можетъ литья; и должно положить холодныя примочки кругомъ шеи и смѣнять новыми, какъ скоро положенныя нагрѣются. Въ періодѣ воспаленія оно этимъ очень скоро устраняется. Но если уже наступило нагноеніе и вѣсть съ нимъ болѣзнь подвинулась далѣе, то должно немедленно поставить нѣсколько банокъ за уши и по сторонамъ шеи. Одинъ искусный гомеопатическій врачъ, который много сдѣлалъ наблюденій, и въ этой болѣзни совѣтуетъ при употребленіи холодной воды и банокъ приложить еще на означенныхъ мѣстахъ испанскій пластырь шириною около 2 поперечныхъ пальцевъ спереди, кругомъ шеи и полоскать холоднымъ глотку; этимъ уничтожается расположеніе къ нагноенію.

### ГРЫЖИ.

Есть различныя грыжи; смотря по мѣстамъ на человѣческомъ тѣлѣ, гдѣ онѣ образуются или вы-

ходятъ, онѣ имѣютъ различныя названія. Такъ есть грыжа мошонки, кила, паховая грыжа, брюшная и пупочная грыжи. Грыжи представляются въ видѣ мягкой, болящей опухоли, которая содержитъ въ себѣ вышедшій изъ живота кусокъ сальника или кишки, и случается по большей части послѣ большаго напряженія силъ, подъема тяжестей или также отъ паденія и ушиба. Подверженныя грыжѣ поэтому не должны поднимать большихъ тяжестей и прыгать много и высоко. Если грыжа вышла, то большой долженъ лечь на спину и искусный врачъ или хирургъ долженъ вложить назадъ вышедшую часть, а потомъ приложить такъ называемый бандажъ, чтобы прежняя грыжа не вышла снова. Возможность такого случая причинила бы такъ называемую ущемленную грыжу, которая гораздо труднѣе вымечивается, именно потому, что ее трудно возвратитъ на свое мѣсто и можетъ имѣть слѣдствіемъ воспаленіе, апоплексію и самую смерть. Грыжу тогда называютъ ущемленною, когда все болѣе и болѣе кишекъ вытѣсняется наружу и грыжа достигаетъ значительной величины и толщины, а по этому самому не легко можетъ быть возвращена назадъ черезъ узкую щель грыжи. Грыжи брюшныя и пупочныя не требуютъ бандажа, но только широкой туго повязанной подвязки, которая должна быть носима извѣстное время.

Внутреннее употребленіе гомеопатическихъ средствъ здѣсь не составляетъ необходимости, если грыжа вправлена и бандажъ ее удерживаетъ, однако выхожденіе ея часто соединено съ сильною болью, тошнотою, рвотою, тоскою, часто начинается воспаленіе около мѣста грыжи, то противъ этихъ припадковъ дѣйствуютъ средства, о которыхъ здѣсь должно упо-



мянуть. Главнѣйшее средство сперва есть *Aconitum Napellus* (6 разъ въ день по 2 капли) если боль около мѣста грыжи сильна и больной находится въ жару; при рвотѣ *Nux vomica*, а если рвота сильна, то *Opium*, именно по одному приему черезъ 1 часа. *Lachesis* должно употреблять, если грыжа или около ея кожа приняла болѣе темный цвѣтъ, чѣмъ прочія части тѣла.

Вода и заѣсъ обѣщаетъ быть цѣлительною и предсказываетъ вѣрнѣйшую помощь при правильномъ употребленіи. Если грыжа легко вправляется, то не должно употреблять холодныхъ примочекъ до вправленія, прикладывать ихъ послѣ, даже когда привязанъ бандажъ, мыть то мѣсто и кругомъ его со всѣхъ сторонъ губкою, обмакнутою въ холодную воду, и нѣсколько разъ въ день. Но при ущемленной грыжѣ должно тотчасъ употребить холодныя примочки, дабы отвратить всякое воспаленіе, предохранить выходненіе новыхъ частей кишекъ и опухоль кишекъ, сильно сдавленныхъ. Вода необыкновенно укрѣпляетъ слабыя части, на коихъ произошла грыжа, и предупредить вторичную грыжу. Однако не слѣдуетъ пить слишкомъ много, потому что отъ того животъ можетъ раздуть и тѣмъ дать возможность новому образованію грыжи.

### ГРУДНИЦА.

Это есть задержаніе молока въ молочныхъ сосудахъ у женщинъ большею частію во время перваго кормленія своего дитяти или же во время отнятія дитяти отъ груди. Она происходитъ или отъ простуды, которой предшествовало разгоряченіе тѣла,

или отъ гнѣва и досады, или отъ вкушенія ящи и напитковъ, которые несвойственны для того, чтобы содержать молоко въ млечныхъ сосудахъ всегда въ жидкомъ состояніи. Если сказанныя ошибки случатся, то у матери грудь отвердѣваетъ и набухаетъ; также иногда присоединяется воспаленіе и жизни матери угрожаетъ опасность, потому что приливъ молока можетъ послѣдовать и къ другимъ частямъ тѣла, особенно же главнѣйшимъ образомъ къ головѣ. Тогда часто послѣдуетъ безпамятство и потомъ смерть. Нельзя достаточно беречь грудь матери или вѣрнѣе млечные сосуды ея; молоко должно быть всегда готово къ истеканію. Заѣсъ въ періодъ кормленія жизненная дѣятельность болѣе возвышена и отсюда дитя должно почерпать жизнь. Поэтому кому дорога жизнь своего дитяти, та должна заботиться, чтобы соски не затвердѣвали и не набухали. Этого можно достигнуть, если давать дитяти грудь вскорѣ послѣ родовъ, чрезъ что молоко притекаетъ къ груди въ большемъ количествѣ. Если дитя не можетъ этого сдѣлать, то можетъ сдѣлать взрослый человѣкъ, или должно наложить особенно для того сдѣланные стекла и цѣль будетъ достигнута. Во всякомъ случаѣ вредно по цѣлымъ днямъ не давать дитяти груди; въкоторые дѣлаютъ это, чтобы пощадить мать, когда ребенокъ слишкомъ жаденъ. Если же отвердѣніе наступило, то родильницѣ должно дать нѣсколько приемовъ *Pulsatilla*, оставя всякія смягчительныя примочки и припарки и давать въ соответствующіе промежутки и стараться привлечь молоко съ помощію высасыванія взрослыхъ особъ. Если хотятъ съ пользою давать *Pulsatilla*, то должно смѣшать 2 капли ея съ чайною чашкою воды и давать принимать родильницѣ черезъ 2 часа по полной столовой

ложки. Если затвердѣніе очень сильно и даже сдѣлалось нагноеніе, то слѣдуетъ употребить *Silicea* и *Arsenicum album* такимъ же образомъ. Послѣ каждаго кормленія грудь должна быть чисто обмываема; этимъ грудь и молоко содержатся въ свѣжести и здоровомъ состояніи. Очень часто случается также, что соски изъязвляются и растрескиваются, именно отъ слишкомъ сильнаго сосанія ихъ дитятею. Такъ какъ эти раночки и трещины соединены съ большими болями для матери, и препятствуютъ часто кормить дитя, то должно заботиться объ излѣченіи сосковъ, смачивать ихъ почаще Арниковою водою. Для этой цѣли должно чайную взять чашку воды, капнуть туда 10 капель тинктуры *Agnicæ*, помѣшать чистою деревянною или чайною ложечкою, взять лоскутокъ чистаго полотна, окунуть его туда и прикладывать его на нѣсколько минутъ къ больнымъ соскамъ и даже каждые четверть часа, пока рана заживетъ. Также можно употреблять чистую холодную воду. Всѣ жиры и масла должны быть оставлены, развѣ свѣжія сливки могли бы быть употреблены, однако и тѣ не должно держать долго, потому что онѣ легко могутъ окиснуть. Всѣ жирныя вещества, обыкновенно употребляемыя, уже потому должно оставить, что мѣста, ими смазанныя, еще болѣе размягчаются и возбуждается нарываніе, также часто запахъ, соединенный съ ними, бываетъ противенъ дитяти, мѣшаетъ ему брать грудь, въ слѣдствіе чего наступаетъ затвердѣніе груди и усиливается боль. Если нельзя устранить растрескиваніе наружнымъ употребленіемъ Арниковой воды, то должно нѣкоторое время давать внутрь рано утромъ и вечеромъ по одному приему *Sulphur* и потомъ *Calcareæ carbonica*. Однако должно непремѣнно давать сосать

ребенку какъ можно чаще, чтобы отъ опущенія этого обстоятельства не произошло большаго вреда.

Если начинается рожистое воспаленіе груди, то должно тотчасъ принять нѣсколько приѣмовъ *Bryonia alba* и потомъ *Belladonna*, черезъ 3 часа по 1 капль; но все таки и здѣсь также какъ и при сильномъ отвердѣніи грудныхъ сосцевъ опытной врачъ долженъ быть призванъ на совѣтъ.

Употребленіе холодной воды подъ надзоромъ врача могло бы и здѣсь имѣть особенно благотѣльные послѣдствія. Конечно, немногія согласятся на употребленіе холодной воды, которая по ихъ мнѣнію только усиливаетъ зло, и грозитъ опасностью жизни; и акушерка или врачъ, котораго спросятъ или спросятъ, скажутъ тоже самое. Но все таки холодная вода сдѣлала бы много добра и пользы и вылечила бы скорѣе и лучше всякаго другаго средства затверденіе грудныхъ желѣзъ и уничтожила бы растрескиваніе ихъ, гдѣ таковое уже началось. Для этого должно положить холодныя примочки на больную грудь и перемѣнять почаще нѣсколько дней сряду, и боль скоро пройдетъ, а новое отверденіе не сдѣлается снова при ежедневномъ обмываніи груди холодною водою. Первая холодная примочка доставить матери особенное впечатлѣніе, но дальнѣйшія она вытерпитъ легче, и потомъ съ каждою новою примочкою она болѣе ихъ будетъ любить, потому что скоро придетъ увѣренность, что вода оказываетъ благотѣльную и цѣлебную силу. Профессоръ Эртель воспользовался этимъ средствомъ для своей жены, которая передъ этимъ употребляла самыя хваленныя средства для размягченія грудныхъ желѣзъ, и что же? это средство было увѣнчано полнымъ успѣхомъ. И почему же нѣтъ? вѣдно сред-

ство не имѣетъ такой смягчительной силы, какъ вода, ни одно не проходитъ такъ глубоко въ поры, какъ вода, ни одно такъ не очищаетъ отъ вредныхъ матерій, ни одно не укрѣпляетъ и не оживляетъ болѣе чѣмъ она, и ни одно не возбуждаетъ при своемъ дѣйствіи болѣе высокую теплоту, какъ вода. Хотя націенткъ и немного страшно будетъ чувство холода, но тѣмъ пріятнѣе теплота, которая затѣмъ слѣдуетъ. Какъ охотно будетъ пить дитя изъ такой опрятной груди жизненное молоко. Если и не сдѣлалось затвердѣнія въ грудяхъ, то все таки было бы очень полезно для матери и для дитяти обмывать грудь и сосцы холодною водою послѣ каждаго кормленія и прикладывать чистое полотно къ нимъ; этимъ не только будетъ предупреждена всякая болѣзнь груди, которая могла бы произойти отъ нечистоты, когда остается нѣсколько молока и дѣтской слюны, или отъ рубашки запачканной молокомъ и чрезъ это прокисшей, но и молоко отъ этого будетъ чище, здоровѣе, я обильнѣе, и дитя будетъ замѣтно разцвѣтать. Если же при этомъ будетъ она пить холодную воду, свѣжую, ключевую, каждое утро и вечеромъ по 2 маленькихъ стакана, то дитя и мать будутъ чувствовать при этомъ себя хорошо и оба наслаждаться сладкимъ и крѣпительнымъ сномъ. Какое безпокойство для матери, когда дитя безпрестанно будитъ ее своимъ крикомъ! Но этого неслучится, если мать прилежно будетъ пить воду и тѣмъ уничтожать кислоту и остроту своихъ соковъ. При всемъ этомъ должно еще при затвердѣніи желѣзъ принимать вышеозначенныя гомеопатическія средства и въ сказанныхъ количествахъ.

## ВОСПАЛЕНИЕ ВЪ ГРУДИ.

Это есть воспаленіе легкаго или перепонки, окружающей легкое и соединено съ колотьемъ въ бокахъ. Оно случается по большей части при большомъ холодѣ или же весной, при внезапной перемѣнѣ теплой погоды на холодную, при сѣверныхъ и западныхъ вѣтрахъ. Оно производитъ слѣдующіе симптомы: холодъ и дрожь во всемъ тѣлѣ и послѣдующій затѣмъ сильный жаръ, всего сильнѣе по вечерамъ, нѣсколько слабѣе рано по утру. Голова очень болитъ, щеки весьма красны, пульсъ скорый и твердый. Послѣ этого начинается колотье въ боку, въ груди, которое чувствительно при дыханіи, и при кашлѣ очень больно. Дыханіе при этомъ горячее и жажда сильная. Кашель сначала сухой, но потомъ при уменьшеніи болѣзни становится легче и отдѣляется мокрота, но бываетъ также съ сильною и кровавою мокротою. Давленіе рукою на воспаленныя мѣста причиняетъ большую боль и кашель. Я уже выше сказалъ, что къ этой болѣзни располагаютъ сильная стужа и рѣзкіе западные вѣтры во время весны, но большею частію присоединяются и другія причины, какъ то: внезапное охлажденіе послѣ предшествовавшаго разгоряченія или сильное дѣйствіе этихъ холодныхъ вѣтровъ послѣ разгоряченія. Холодное питье при сильномъ волненіи можетъ причинить его. Легкіе катарральные случаи при небреженіи могутъ также довести до этой болѣзни. Самая болѣзнь можетъ быть смертельна, если скоро не будетъ подана помощь и не будутъ приняты необходимыя средства, смотря по причинамъ его произведшимъ. Гомеопатія здѣсь чрезвычайно много пред-



ставляетъ выгоду, и тотъ, кто захочетъ лечиться гомеопатически, навѣрно можетъ полагать, что вскорѣ выздоровитъ. Но конечно тутъ должны быть оставлены кровопусканія, банки и пѣвки, — средства, которыя не служатъ ни къ чему другому какъ къ окончательному ослабленію тѣла и замедляютъ излеченіе. Главнѣйшее и специфическое средство въ Гомеопатіи противъ всѣхъ воспаленій, а также и противъ грудныхъ воспаленій есть *Aconitum Napellus*, и часто достаточно 6 или 7 приѣмовъ его, чтобы уменьшить боль и устранить ее совершенно. Это средство должно давать смотря по силѣ, съ которою наступило воспаление. Въ самыхъ сильныхъ случаяхъ по одному приѣму черезъ 5 или 10 минутъ, при менѣе сильныхъ припадкахъ черезъ каждые 2 часа по одному приѣму; однако это средство должно давать до тѣхъ поръ, пока вовсе не прекратится лихорадка. Противъ колючей боли, если она осталась, должно употреблять, но съ большими промежутками, *Bryonia alba*. У дѣтей также должно употреблять *Aconitum* и *Chamomilla*.

Если же воспаление чрезвычайно сильно и не уступаетъ дѣйствию *Aconitum* и *Bryonia*, если легкое во-все испорчено и почти разрушено, то должно призвать искуснаго гомеопатическаго врача и передать ему дальнѣйшее лечение больного.

Если прибавить къ этимъ гомеопатическимъ средствамъ еще лечение холодною водою, и именно снаружи и внутрь, то въ короткое время будетъ въ виду излеченіе болѣзни. Съ этою цѣлю должно взять чистый платокъ или салфетку, обмокнуть ее въ холодную воду изъ колодца, дать напитаться, выжать ее немного, сложить въ четверо и приложить на

больную сторону и тотчасъ переменить на новую холодную примочку, когда потеряетъ свой холодъ отъ притекающей теплоты; и такимъ образомъ продолжать, пока утихнетъ весь жаръ; при этомъ больной долженъ пить прилежно холодную воду. Нѣтъ впрочемъ сомнѣнія, что лечение этой болѣзни холодною водою необходимо предоставить опытному врачу.

### СУДОРОГИ, СПАЗМЫ ВЪ ГРУДИ.

Эта болѣзнь въ высшей степени тягостная и непріятная, часто угрожающая жизни, случается болѣею частію съ ипохондрическими, истерическими и нервными особами и начинается внезапнымъ ощущеніемъ задушенія дыхательнаго горла, затрудненнымъ дыханіемъ, томленіемъ, безпокойствомъ, переходомъ отъ жара къ холоду, часто также склонностію къ плачу. Часто это состояніе производится незначущими обстоятельствами. Какъ причины производящія должно упомянуть гнѣвъ, внутреннюю злобу и досаду, страхъ, приливъ крови къ груди, остановка и задержка мѣсячныхъ кровей. Смотри по различію причинъ, разнятся и гомеопатическія средства противъ нея. При гнѣвѣ или послѣ него специфически дѣйствуетъ *Chamomilla*, при внутренней досадѣ *Ignatia amara*, при страхѣ *Aconitum Napellus*, при приливѣ крови, при остановкѣ регулъ *Pulsatilla* въ повторныхъ приѣмахъ; если при судорогахъ въ груди въ то же время присоединится и тошнота съ слюнотеченіемъ изо рта, то специфическое средство есть *Ipecacuanha*. *Nux vomica* особенно полезна въ такомъ случаѣ для особъ, которыя имѣютъ сильную и здоровую комплекцію. При сильнѣйшихъ

припадкахъ грудныхъ судорогъ, гдѣ чрезвычайно затруднено дыханіе помогаетъ *Arsenicum album*.

Въ большей части случаевъ, гдѣ тотчасъ найдены причины производящія, должно дать *Coffea cruda*; однако это средство только тѣмъ принесетъ пользу, которые не привыкли къ ежедневному употребленію кофе.

Дѣти часто подвергаются судорогамъ въ груди внезапно посреди ночи; они громко вскрикиваютъ, но ихъ крикъ коротокъ потому что ему препятствуетъ недостатокъ воздуха, затѣмъ слѣдуетъ глухой, сухой кашель. Такъ какъ эти припадки у дѣтей въ высшей степени опасны, то должно тотчасъ послать за врачомъ, но до его прихода дать дитяти одинъ приемъ *Sambucus nigra* или *Cocculus, Platina, Nefeloborus nig.* Должно въ тоже время заботиться о теплотѣ ногъ дитяти.

Противъ судорогъ въ особенности, каковы бы ни были причины производящія болѣзнь, большую пользу принесли бы примочки изъ холодной воды, если больной не очень разгоряченъ; примочки должно часто повторять, также мыть грудь холодною водою; при упорной долгой боли обливать шею и грудь изъ маленькой лейки или также обернуть шею и грудь въ обмакнутое въ холодную воду очень намоченное шерстяное одѣяло и не перемѣнять его, держать себя тепло, пока больной сильно вспотеетъ; при чемъ не должно забывать питья холодной воды. Особы, которые разположены къ этой болѣзни, и часто испытываютъ возвраты, избавятся отъ нея на будущее время, если обратятся къ леченію водою. Бывъ студентомъ, я зналъ одного молодого человѣка, котораго

часто посѣщала эта болѣзнь; онъ бросался на землю, царапалъ ногтями полъ и старался ртомъ глотать воздухъ. Онъ испробовалъ всѣ средства но не могъ вылечиться, и только съ помощію ежедневнаго обмыванія груди холодною водою и обильнаго питья воды получилъ облегченіе, уменьшеніе этой болѣзни и наконецъ совершенное исцѣленіе.

## ХОЛЕРА.

Эта болѣзнь конечно одна изъ опаснѣйшихъ и часто всего скорѣе убивающихъ, и уже одно ея имя наводитъ на робкаго человѣка страхъ и ужасъ. Тысячи и тысячи людей она погубила и миллионы еще будутъ добычею ея, прежде чѣмъ будетъ найдено противъ нея всеобщее специфическое средство. Съ тѣхъ поръ, какъ она сдѣлалась извѣстною въ Европѣ, появилось о ней множество брошюръ, а также и цѣлыхъ томовъ у книгопродавцевъ; но одно сочиненіе противорѣчитъ другому, и что одинъ превозноситъ похвалами, какъ специфическое, другой отвергаетъ, какъ нигде негодное. Вездѣ недостаетъ цѣлости, точности и удовлетворительности. Даже многіе не могли согласиться насчетъ имени болѣзни. Многіе производятъ названіе холеры отъ *cholē* холера, желчь, хотя по словамъ одного опытнаго врача основательный наблюдатель этой болѣзни не видалъ ни капли желчи, которая бы отдѣлилась или рвотою, или съ испражненіемъ; и это случается только при спорадическомъ поносѣ и рвотѣ, которая однако есть болѣзнь совершенно отличная отъ холеры. Другіе даютъ ей названія *Cholera morbus*, какъ будто бываетъ другая холера, которая не есть *morbus* (болѣзнь). Настоящее словопроизводство этой

болѣзни отъ греческаго слова холера, *cholera* жолобъ на крышѣ, до сихъ поръ большой части неизвѣстно, говоритъ тотъ врачъ, хотя этимъ производствомъ очень рѣзко обозначаются оба характеристическіе признака болѣзни: рвота и поносъ, которые дѣлаются легко и безъ усилія подобно потоку, или какъ дождевая вода стекаетъ изъ жолоба на крышѣ; это названіе лучше обозначаетъ болѣзнь, чѣмъ имена многихъ другихъ болѣзней. Каковы бы не были имена, но холера остается одною изъ сильнѣйшихъ и самыхъ острыхъ болѣзней.

Главнѣйшіе симптомы ея суть: всеобщее утомленіе, слабость, унылость, головокруженіе, рвота, поносъ, и то и другое безъ затрудненій, судороги въ мышцахъ, особенно въ нижнихъ частяхъ тѣла, въ икрахъ; холодъ сначала въ нижнихъ оконечностяхъ, потомъ во всемъ тѣлѣ, синій цвѣтъ кожи, холодъ, дрожь, едва слышный голосъ, однообразно искривленныя черты лица, гипократическое лице; глаза глубоко впавшіе, тусклые и безъ блеска, особенный тихій голосъ, недостатокъ пульса, прекращенная дѣятельность почекъ; всѣ эти и еще многіе другіе симптомы то сильнѣе, то слабѣе.

Касательно заразительности холеры возникалъ сильный литературный бой, приличива она или нѣтъ. Но она не приличива, это доказано; иначе ею должны бы заразиться всѣ члены семейства, если одинъ изъ нихъ подвергнется холерѣ. Она распространяется путемъ миазмовъ, посредствомъ воздуха и это разительно подтверждается необыкновеннымъ свойствомъ воздуха, который на пр. въ послѣднюю холеру въ С. Петербургѣ не давалъ электрическихъ искръ на элекрич. машинѣ, а магниты потеряли своей силы. Она часто не распространяется,

не смотря на связи, съ одного мѣста на другое, а появляется вдругъ въ отдаленномъ мѣстѣ на нѣскольکو миль, гдѣ не было ни какой заразы; этой болѣзни подвергаются люди, у которыхъ нельзя было замѣтить ни малѣйшаго сношенія ни личнаго, ни непосредственнаго, ни посредственнаго съ зараженными холерою. Такимъ образомъ самое тщательное уединеніе людей какъ порознь, такъ и цѣлыхъ домовъ не могло остановить распространенія болѣзни; даже въ открытомъ морѣ, говоритъ этотъ врачъ, на одномъ англійскомъ кораблѣ, который прибылъ изъ Англіи, когда она вовсе не знала холеры и который не имѣлъ никакого сношенія въ дорогѣ, вблизи отъ Риги заболѣвали люди холерою. Страны болотистыя, обильныя водою преимущественно привлекаютъ болѣзнь эту; въ нихъ она долго держится и оттуда разпространяется; замѣчено что во многихъ мѣстахъ, при наступленіи холеры заболѣваетъ большое число людей, а въ другихъ мѣстахъ только 1 или 2 человека, что противорѣчитъ прямо личному сообщенію и зараженію. Какъ несогласны врачи касательно названія холеры, ея способа и образа распространенія также несогласны они и касательно существа и свойствъ этой болѣзни. Ихъ воззрѣнія часто различны и даже противорѣчатъ другъ другу; они болѣе думали о средствахъ, какъ покорить эту болѣзнь, нежели о ея сущности; но средства до тѣхъ поръ не будутъ истинными, пока не будетъ узнана сущность болѣзни. То, что выдумала теорія, не оправдывается на практикѣ. Одинъ думалъ найти мѣсто-пробываніе болѣзни въ нервной системѣ, другой въ сосудахъ, третій въ кишкахъ; иной думалъ что болѣзнь должно искать въ лёгкихъ, другой думалъ, что она въ сердцѣ; третій, что она въ узловой нер-



вной системѣ, наконецъ четвертый, что она въ кожѣ. Одинъ считалъ эту болѣзнь за воспаленіе, другой за нервную болѣзнь, третій считалъ за перемежающуюся сильную лихорадку. Коротко сказать, нѣтъ того органа въ тѣлѣ человека, котораго не рассматривали бы какъ мѣстопробываніе этой болѣзни.

Докторъ Флейшеръ, который написалъ очень пространное сочиненіе о холерѣ, находитъ истинное существованіе болѣзни въ параличѣ, разслабленіи сердца, такъ что сердце теряетъ силу и не можетъ прогонять массу крови къ периферіи, поэтому и бываетъ холодъ и синій цвѣтъ кожи. Отъ разслабленія сердца приостанавливается малое кровообращеніе черезъ лёгкія, процессъ окисленія крови не совершается; сильно обугленная кровь скопляется въ сосудахъ живота; и такъ какъ обычное отдѣленіе угольной кислоты и азотнаго газа изъ лёгкихъ не можетъ совершаться, то дѣлается смѣшеніе и выдѣленіе всѣхъ водянистыхъ веществъ въ желудокъ и кишечный каналъ, которое и выходитъ вонъ въ видѣ рвоты и поноса. Слѣдовательно при началѣ нужно заботиться о главной цѣли восстановленія кровообращенія; притомъ самое сообразное леченіе при болѣзни постепенно развивающейся, также и развившейся есть лѣченіе діафоретическое — потогонное.

Весьма хваленое средство противъ холеры, употребляемое даже въ послѣднемъ періодѣ, есть средство Док. Бонета въ Парижѣ. Онъ даетъ больному каждые полчаса чашку чая изъ липоваго цвѣта, мяты, мелиссы, аниса, укропа, и др., и немного сахара, прибавивъ туда 4 капли нашатырнаго спирта и именно 4 раза, что составитъ 16 капель въ 2 часа. Реакція должна быть почти мгновенная. Пульсъ тотчасъ

долженъ начать биться опять, хотя и неровный, синія пятна должны исчезнуть, тѣло, лице и оконечности покроются сильнымъ горячимъ потомъ и чрезъ нѣсколько часовъ больной будетъ внѣ опасности. Реакція бываетъ слишкомъ сильна, и тогда должно поспѣшить на помощь съ кровопусканіемъ. При этомъ слѣдуетъ для рукъ сдѣлать ванну изъ самой горячей воды, куда кладутъ стаканъ уксусу и 300 граммовъ (1½ фунта) горчичной муки, и нагрѣтый камень на желудокъ.

Хотя это средство не принадлежитъ собственно сюда; потому что здѣсь должно объяснить только гомеопатическое леченіе; однако я считаю это извинительнымъ, потому что при этой чрезвычайно острой и опасной болѣзни, когда не всякій рѣшится взяться за гомеопатическія средства, можно упомянуть съ пользою о средствѣ, которое вездѣ прославляется.

Гомеопатическія средства, которыя должно употребить въ первомъ періодѣ болѣзни, когда она имѣетъ характеръ сильной холеры, есть *Iresaciantha* въ 6-мъ разведеніи чрезъ ¼ часа по 2 капли. Если и это средство въ нѣсколькихъ пріемахъ не побѣдитъ болѣзнь, если поносъ продолжается, еще умножается и усиливается, если больной становится слабѣе и слабѣе, если мочи выдѣляется мало и съ жженіемъ въ мочевомъ каналѣ: то должно принимать *Phosphorus* въ нѣсколькихъ пріемахъ. Если и за тѣмъ болѣзнь усилится, сдѣлается склонность къ рвотѣ, и потомъ дѣйствительная рвота, если безпокойство увеличивается, жажда усилится, лице приметъ безобразный сѣросиній цвѣтъ, если оконечности похолодѣютъ, если начнутся судороги, то должно давать внутрь и нюхать *Veratrum album*. Должно въ тоже

время стараться согрѣть тѣло теплыми одѣлами, что можно произвести также и растираніемъ такими одѣлами. Если болѣзнь будетъ продолжаться болѣе, то должно давать *Surgut*, черезъ  $\frac{1}{2}$  часа по приему.

Въ случаѣ, если припадки холерыны, частію и припадки холеры уменьшатся въ своей силѣ отъ употребленія этихъ средствъ, и наступитъ очевидное облегченіе, то должно дать какъ окончательное лекарство *Aconitum*, если случится приливъ крови къ головѣ и пульсъ силенъ, полонъ и бьется скорѣе обыкновеннаго: если одно это не поможетъ, то *Belladonna*, *Bryonia* и *Phosphorus* должно употреблять тогда, когда разовьется можетъ быть изъ этой болѣзни слизистая лихорадка, а при тифѣ, который часто дѣлается послѣ излеченія холеры, слѣдуетъ употреблять *Opium* и *Mercurius solubilis*.

Ганнеманъ ввелъ еще средство особенно для этой жестокой и опасной болѣзни, которое принесло пользу несмѣтному количеству больныхъ холерою; это именно камфорный спиртъ, который онъ давалъ больному въ частыхъ, но очень малыхъ приѣмахъ. Слѣдуетъ давать именно немного и выжидать дѣйствія этого средства. Вотъ всѣ средства, которыя употребительны противъ холеры. Я позволяю себѣ еще упомянуть о гидропатическомъ леченіи этой болѣзни, и сначала обратить общее вниманіе на то, что это леченіе есть лучшее и вѣрнѣйшее при употребленіи въ тоже время и гомеопатическихъ средствъ, такъ какъ первые и величайшіе авторитеты въ медицинскомъ мірѣ выхваляли пользу и дѣйствіе воды. Такъ какъ авторъ не дѣлалъ самъ наблюденій касательно этого предмета, то онъ ссылается на тѣхъ, которые были открыты и сдѣланы на этомъ пути искусными врачами и

сообщаетъ ихъ совѣты. Поэтому приведемъ слова изъ сочиненія Докт. Эртеля въ Ансбахѣ: Индѣйская холера, истребляемая единственно только холодною водою (Нюренбергъ у Кампе, 1831): кто хочетъ предохранить себя отъ холеры, когда она уже не далеко, тотъ долженъ, а) избѣгать всякаго излишества въ ежедневномъ столѣ и напиткахъ; чтобы желудокъ получалъ какъ можно менѣе различныхъ и не однородныхъ веществъ для переработыванія и различнаго разложенія, слѣдовательно менѣе бы могъ приготовить матеріала для рвоты и поноса; б) ничего не ѣсть кромѣ однихъ простыхъ и легкихъ кушаній, гдѣ немного жиру, пряностей и кислоты, всего лучше только одинъ крупчатый хлѣбъ, дабы желудокъ могъ готовить одни однородные, чистые соки; в) избѣгать всѣхъ горячительныхъ, бродившихъ, теплыхъ и расслабляющихъ напитковъ, какъ то: вина, водки, мартовскаго пива, пунша, грога и чая, и напротивъ того только пить свѣжую, чистую рѣчную воду, утромъ и вечеромъ, все тѣло купать въ холодной водѣ или мыть его и притомъ хорошенько втирать свѣжую воду въ поры тѣла и потомъ покрывшись, особенно утромъ, отдохнуть часъ; а вечеромъ тотчасъ послѣ этого ложиться спать, съ тѣмъ чтобы послѣдовала испарина, которая не позволила бы заразительной матеріи проникнуть въ поры; е) неоднократно въ день вбирать носомъ свѣжую воду, нѣсколько разъ полоскать зѣвъ и ротъ; ф) утромъ и вечеромъ освѣжать воздухъ въ комнатахъ и спальняхъ, и удалять изъ нихъ все грязное, нечистое, потное, чтобъ дышать однимъ чистымъ и свѣжимъ воздухомъ; г) комнаты, палаты, ходы въ домѣ сырыскивать водою во всѣхъ направленіяхъ по нѣскольку разъ; h) коротко сказать, вообще содержать

себя болѣе всего въ опрятности, чисто, осторожно и воздержно.

Кто хочетъ спасти себя отъ холеры, которую онъ уже чувствуетъ въ себѣ, долженъ немедленно воздержаться отъ всякой ѣды и совершенно заняться леченіемъ, дабы желудокъ не получилъ ничего твердаго для переваренія и не начиналъ бы борьбы; также долженъ ничего не пить день и ночь кромѣ чистой и свѣжей колодезной воды, или лучше сказать, вовсе наводнить себя водою, съ тѣмъ чтобы желудокъ принималъ одно жидкое для переработки, одну чистую воду, и проводилъ ея цѣлительную силу во всѣ каналы тѣла; долженъ сначала обмыть все тѣло съ головы до ногъ тепловатою водою и вѣдъ за тѣмъ выкупать въ холодной какъ ледъ колодезной водѣ или же въ ваннѣ; или же обтираться водою хорошенько съ помощію большой и жесткой губки, потомъ завернуться въ фланель и лечь въ постель, чтобы такимъ образомъ хорошенько принять освѣжающую силу воды въ поры и потомъ согрѣться и вспотѣть, что и подѣйствуетъ сильнѣе нежели крѣпчайшій камфорный или нашатырный спиртъ. Если наступитъ рвота, то на желудокъ должно положить холодную примочку; если же поносъ, то положить и на животъ; также должно поставить одинъ или нѣсколько клистировъ изъ холодной воды.

При такомъ леченіи вскорѣ покажется для больного, даже въ первые часы болѣзни, благотворный кризисъ и очевидное облеченіе такъ, что едва ли чрезъ 24 часа потребно будетъ леченіе и присмотръ за больнымъ. Пусть же не думаетъ человѣкъ, боящійся холодной воды, что вода еще болѣе простужаетъ холеру, которую думаютъ уничтожать только съ помощію горячаго пота изъ тѣла; но именно вода,

холодная вода есть то средство, которое производитъ своимъ дѣйствіемъ благотворную теплоту; и гораздо скорѣе производитъ испарину, нежели всѣ искусственныя средства, которыя предписываются для этой цѣли. Выше мы видѣли, что по мнѣнію одного искуснаго врача только потогонныя средства способны излечивать холеру, но есть ли еще средство, которое скорѣе и вѣрнѣе располагаетъ къ испаринѣ, нежели холодная вода? Потому не вѣрящій и сомнѣвающійся посѣти и осмотри лечебныя заведенія, спроси тамошнихъ больныхъ, испытай это на самомъ себѣ, выкупайся въ такой водѣ, не обтирай себя, но завернись въ шерстяное одѣяло или еще лучше въ толстую фланель и ложись такимъ образомъ въ постель, спрячь и руки подъ шерстяное одѣяло и потъ, который вскорѣ послѣдуетъ, убѣдитъ тебя, что вода есть лучшее потогонное средство. Но вотъ больной холерою обыкновенно жалуется на страшную жажду, требуетъ настойчиво холодной воды; неужели ты не хочешь послѣдовать этому стремленію самой природы и подражать ему? Теперь есть даже много врачей, которые удостовѣрились въ превосходномъ дѣйствіи холодной воды въ этой болѣзни и употребляютъ ее при самомъ ея началѣ; даже они предписываютъ принимать ледъ внутрь и снаружи въ маленькихъ кусочкахъ.

Докторъ Зибенхааръ въ Дрезденѣ сказалъ: я увѣренъ, что холодная вода соединяетъ въ себѣ всѣ тѣ свойства, которыя можетъ имѣть напитокъ, слѣдующій для питья больному холерой: она успокоиваетъ тотчасъ раздраженную нервную систему, проникаетъ легче всего въ всасывающіе сосуды кишекъ и вѣрнѣе всего восстанавливаетъ сократительную силу желудка и кишечнаго канала.



Повторяю еще разъ: нѣтъ средства предохранительнаго отъ холеры вѣрнѣе и спасительнѣй, чѣмъ холодная вода, употребляемая снаружи и внутри, какъ предписано; а если при этомъ употреблены будутъ и сказанныя гомеопатическія средства, то непріятель скоро будетъ прогнанъ съ поля сраженія. Но прежде всего не должно бояться и пугаться холодной воды.

### ПЕРЕПОНЧАТАЯ ЖАБА. См. КРУПЪ.

#### СУХОТКА У ДѢТЕЙ

Эта болѣзнь, по большей части, есть слѣдствіе золотухи, или сопровождать ее, если еще она продолжается, случается обыкновенно между 4 и 5 годомъ дѣтскаго возраста. Ей предшествуютъ безсиліе, вялость, унылость и худоба при сильномъ однако аппетитѣ. Цвѣтъ лица дѣлается блѣднымъ, кожа сморщивается, носъ заостряется, глаза глубоко вдаются въ глазныя впадины, и вмѣстѣ съ ущербомъ тѣла выступаютъ наружу кости. Дѣти по большей части тихи и вялы, но со временемъ, при теченіи болѣзни сонъ дѣлается безпокойнымъ, наступаютъ жестокіе поносы съ слизистою бѣловатою матеріею. Къ этому присоединяется еще изнурительная лихорадка съ большою жаждою, рвотою, колотьемъ въ животѣ при весьма большомъ аппетитѣ, даже при страшномъ голодѣ. Наконецъ дитя худѣетъ до такой степени, что остается одинъ скелетъ.

Причины этой болѣзни, въ высшей степени опасной для дѣтей, заключаются по большей части въ

дурномъ молокѣ матери и въ искусственномъ вскармленіи пищевыми средствами, которыя склонны къ броженію; также часто болѣзнь происходитъ отъ весьма вреднаго обычая кормить ребенка соскою, для того чтобы онъ лежалъ тихо въ люлькѣ; при этомъ онъ всасываетъ въ желудокъ много воздуха, который ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть полезенъ для желудка; отъ неопрятной посуды, изъ которой дитя получаетъ пищу, отъ слабительныхъ средствъ и т. под. Но главнѣйшимъ образомъ способствуетъ къ развитію этой болѣзни дурное молоко матери или кормилицы. Такъ нѣкоторыя матери въ этомъ отношеніи чрезвычайно небрежны, пьютъ и ѣдятъ все безъ разбора, не думая о томъ, что дитя всосетъ съ молокомъ всю сущность вреднаго вещества, и напьется такимъ образомъ чистой болѣзненной матеріи. Онѣ предаются нѣкоторымъ удовольствіямъ и развлеченіямъ, разгорячаются и простужаются, предаются страстнымъ порывамъ своего темперамента и потому, ни о чемъ не заботясь, даютъ дитяти грудь для того, чтобы оно высосало отсюда смерть. Если дитя отнято отъ груди, то часто ему даютъ пищу, которая въ высшей степени вредна для слабаго тѣла, на примѣръ: картофель, рано по утру, за обѣдомъ и вечеромъ или непропеченный черныи хлѣбъ, сыръ, или неспѣлые плоды, кофе въ большомъ количествѣ и такого свойства, что окъ имѣетъ лишь одно названіе кофе, другія подобныя кушанья, которыя болѣе и болѣе портятъ желудокъ и органы пищеваренія, и дѣлаютъ фундаментъ для болѣзни такъ называемой сухотки. Также со стороны родителей очень мало бываетъ присмотру за опрятностью дѣтей, относительно платья и бѣлья, относительно мытья кожи и всего тѣла; чему же удивляться тогда, если

разовьется эта болѣзнь, если къ этому еще прибавить вредную для здоровья дѣтей жизнь въ сырыхъ комнатахъ и дѣтскихъ, набитыхъ и другими членами семейства или нѣсколькихъ семействъ, рѣдко производимое провѣтриваніе и очищеніе душныхъ и холодныхъ помѣщеній, спанье въ постеляхъ или на соломенныхъ матрацахъ, гдѣ они дрожатъ отъ холода и не могутъ заснуть? дѣйствительно, тогда намъ слѣдается понятнымъ, почему дѣти страдаютъ этою болѣзнію и превращаются въ скелетъ отъ худобы.

Средство, которое должно принимать прежде всего противъ этой болѣзни, есть Sulphur, въ частыхъ приемахъ. Должно въ теченіи 14 дней давать дитяти каждый вечеръ черезъ два часа послѣ кушанья отъ 1—2 капель этого средства, а послѣ этого времени Calcareæ Carbonica тоже въ теченіи 14 дней. Потомъ должно принимать черезъ день на ночь по 1 капль Nux vomica; если раздутие желудка и живота очень сильно, если въ немъ разовьется извѣстный газъ, который раздуетъ животъ, то должно давать Arsenicum album попеременно черезъ 4 часа съ Phosphorus и полъ конецъ должно дать для подкрѣпленія желудка нѣсколько приемовъ China. Если глисты тоже принимаютъ въ этомъ участіе, то должно дать приема 2 Cina. Если дитя имѣетъ сильную отрыжку, если она сильно пахнетъ кислотами, то слѣдуетъ давать Magnesia carbonica. Вотъ главнѣйшія средства противъ нея. Впрочемъ при большой опасности для жизни дитяти слѣдуетъ призвать искуснаго гомеопатическаго врача, который, смотря по различію обнаруживающихся симптомовъ, предпишетъ и настоящее средство. Но всѣ эти прекрасныя средства мало помогутъ или вовсе не по-

могутъ, если въ тоже время не послѣдуетъ совершенное измѣненіе вѣшняго воспитанія и содержанія дитяти. Кушанья, которыя даются дитяти, должны быть просты, легко варимы, и даваемы въ определенное время; всѣ жирныя, соленыя и копченныя яства, сыръ, картофель, тяжелый черный хлѣбъ, жирныя пироги и сыры должны быть оставлены вовсе; бѣлье должно быть часто перемѣняемо, все тѣло дитяти должно быть по возможности ежедневно утромъ и вечеромъ обмываемо или купаемо холодною водою, дабы снова возбудить силу въ ослабшихъ внутренностяхъ и кишкахъ; комнаты должны быть освѣжаемы, постѣли и кровати должны быть защищаемы отъ холода и дитя должно быть выводимо или выносно на чистый воздухъ. вмѣстѣ съ тѣмъ приличная діета и чистоплотность, употребленіе вышеупомянутыхъ гомеопатич. средствъ скоро уничтожатъ у дитяти болѣзненный видъ и позволятъ ему съ каждымъ днемъ все болѣе укрѣпляться. Должно и здѣсь снаружи употреблять холодную воду, обтирая дитя губкою, или дѣлая ванны, а внутрь часто давать свѣжую холодную воду.

### ПОНОСЪ.

Поносъ или обильное иногда водянистое испражненіе кала, смотря по причинамъ его возбужденнымъ, опасенъ болѣе или менѣе, и всякій, кто имъ страдаетъ, старается въ скоромъ времени освободиться отъ него; но при этомъ должно остерегаться крѣпительныхъ и запирающихъ средствъ, потому что они часто приносятъ гораздо больше зла, чѣмъ то, которое они должны бы устранять. Поносъ дѣлается

по большей части отъ порчи желудка, т. е. отъ не-реполненія его разнородными, не легко варямыми, но скоро бродящими яствами, отъ простуды желудка послѣ разгоряченія его, отъ питья послѣ сильного общаго разгоряченія, также послѣ досады, страха, вспышекъ гнѣва и мн. др. Смотря по этимъ причинамъ должно избирать и средство противъ него. Поносъ, сдѣлавшійся отъ порчи желудка, лучше всего устраняется посредствомъ *Coffea cruda* (2 капли черезъ 2 часа), однако такъ какъ большая часть людей болѣе или менѣе привыкла къ ежедневному употребленію кофе, то это средство не принесло бы имъ желаемой помощи; по этому они должны принимать *Pulsatilla*. Если частыя испраженія истощили больного, т. е. очень его ослабили, то можно уничтожить эту слабость двумя приемами *Nux vomica* попеременно съ *China*. Каждые 3—4 часа по одному приему *Nux* и чрезъ столько же времени *China*. Если же простуда была причиною, если болѣе живота при поносѣ нѣтъ, то удовлетворительную помощь сдѣлаютъ *Dulcamara* и потомъ *Vergonia alba*, послѣднее средство главнѣйшимъ образомъ потому, что нѣтъ болѣе въ животѣ; и также тогда, когда при боли въ животѣ испраженіе выходитъ съ болью и чувствомъ израненія въ заднемъ проходѣ. При особенно сильной боли живота и вонючемъ испраженіи слѣдуетъ употребить *Chamomilla*. Если сдѣлалось расстройство къ дурнотѣ, если испраженіе зеленовато, даже съ кровью, слизисто, то должно дать нѣсколько приемовъ *Mercurius vivus*. Если испраженіе сопровождается сильнымъ ворчаньемъ, рвзью и сильными вѣтрами, то давать *Pulsatilla* черезъ 2 часа по приему. Если же поводомъ боли испугъ, ужасъ, страхъ или же радость, то должно дать одинъ приемъ *Aconit*.

*Napellus*, и потомъ *Opium*. Если оба они не принесутъ пользы или тѣ припадки подѣйствовали очень сильно, то *Vegetrum album*. Если поносъ послѣ сильной злобы съ желчною рвотою, тяжкою головою болью, жаромъ и краснотою лица, то *Chamomilla*. Если поносъ соединенъ съ значительною болью, если онъ бываетъ попеременно съ запоромъ и позывомъ къ испраженію и вскорѣ за тѣмъ оно будетъ съ жидкими слизистыми отдѣленіями, если пациентъ будетъ слабъ, вялъ, если его лице поблѣднѣетъ и кругомъ глазъ будутъ темныя полосы, то тогда *Ipecacuanha*, а если это не поможетъ, какъ слѣдуетъ, то *Rheum*. Если испраженіе такъ остро, что въ заднемъ проходѣ будетъ чувствуемо изъязвленіе, если при томъ появится тамъ даже сыпь, то давать *Spiritus sulphuratus*. Особы, которыя подверглись поносу послѣ сильной потери крови и соковъ, и можетъ быть поносъ съ судорожными болями, найдутъ облегченіе въ нѣсколькихъ приемахъ *China*. Дѣтямъ, груднымъ дѣтямъ, которыя имѣютъ поносъ, слѣдуетъ давать *Rheum*; при сильной боли въ животѣ и краснотѣ лица *Chamomilla*, а при блѣдномъ лицѣ *Belladonna*. Если причиною было чрезмѣрное наружное тепло, то *Ipecacuanha* или *Nux vomica* помогутъ. Поносъ послѣ внезапной перемены температуры изъ теплой на холодную, *Dulcamara*. При этомъ, когда языкъ сильно обложенъ бѣлой корой, слѣдуетъ давать *Antimonium crudum*, а при видимо наступающей слабости и худобѣ лица, *Arsenicum album*.

При поносѣ, отъ какихъ бы причинъ онъ ни былъ, не должно прибѣгать къ задерживающимъ средствамъ, какъ то, инбирю, перцу, волкѣ или красному вину даже кровопусканію и мн. др.; этимъ только повреждали бы себѣ. Противъ него должно рекомендовать:



умѣренность въ пищу, теплое содержаніе живота и ногъ, чашку бульона безъ перцу.

Еще лучше, если при употребленіи упомянутыхъ средствъ обратиться тотчасъ и къ леченію водою; и въ самомъ скоромъ времени болѣзнь излѣчится, и даже такъ, что не послѣдуетъ ни какихъ вредныхъ послѣдствій. Но при этомъ слѣдуетъ предупредить, что употребленіе холодной воды негодится при поносахъ, которые произошли чисто отъ слабости, отъ дѣйствительнаго разслабленія кишечнаго канала, но полезно оно будетъ тѣмъ, у кого поносъ слѣзлся отъ простуды. Послѣдніе должны натирать себѣ животъ и желудокъ хорошенько щеткою, обмакнутою въ холодную воду, также точно и спину и задній проходъ; и потомъ выпить нѣсколько стакановъ воды и вслѣдъ за тѣмъ положить шерстяную перевязку себѣ на животъ или покрыть его шерстянымъ одѣяломъ, пробыть часа 2 въ постели для того, чтобы пропотѣть. Но еще разъ должно повторить, что не всякому страдающему поносомъ нужно непременно рекомендовать холодную воду, это причинило бы для инаго только усиленіе болѣзни.

### ОНѢМѢЛОСТЬ ЧЛЕНОВЪ.

Это есть особенное ощущеніе въ ногахъ, рукахъ и пальцахъ рукъ, зудъ и уколы въ кожѣ, которые происходятъ отъ долгаго сидѣнія, скрестивши ноги, отъ лежанія на локтяхъ или рукъ и отъ другихъ подобныхъ положеній оконечностей. Во время онѣмѣнія членовъ или въ минуту ихъ замиранія нельзя встать на ногу или дѣйствовать рукою. Это однако проходитъ чрезъ нѣсколько времени, особенно, если

потерѣть хорошенько рукою онѣмѣвшее мѣсто. Противъ этого не требуется лекарства. Только такіе люди, которые очень расположены къ этому, могутъ предохранить себя нѣсколькими приемами *Rhododendron* и *Coccus*.

### ВОСПАЛЕНІЯ НАРУЖНЫЯ, ПЕРЕХОДЯЩІЯ ВЪ НАРЫВЫ.

Это воспаленіе по большей части происходитъ отъ ранъ, вывиховъ, или укола острымъ или рѣжущимъ предметомъ, также отъ ушиба, потомъ отъ ужаленія пчелъ, шершней и другихъ насѣкомыхъ, когда внѣшнія раны были лечимы средствами не совсемъ годными для этой цѣли. Самое воспаленіе обнаруживается большой краснотой и жаромъ, болью, которая колитъ и стучитъ; вообще не стоитъ много говорить о легкихъ внѣшнихъ воспаленіяхъ, потому что только въ слѣдствіе небрежности они могутъ причинить вредныя послѣдствія. Должно употребить примочки изъ арниковой воды, внутрь также дать нѣсколько приемовъ *Arnica* въ 6 разведеніи. Если съ воспаленіемъ соединена лихорадка, то 1 или 2 приема *Aconitum Napellus* устраняетъ ее. При сильномъ воспаленіи и значительной лихорадкѣ, если она не будетъ уступать *Aconitum Napellus*, слѣдуетъ употреблять *Belladonna*; это же средство прекрасно дѣйствуетъ, когда такое воспаленіе произошло отъ внутренней причины, скрывавшейся въ тѣлѣ.

Вода и здѣсь есть прекрасное средство; она преграждаетъ своимъ холодомъ всѣ воспаленія. Если

же рана расположена къ нагноенію, которое есть признакъ заживленія, тогда холоднаго компресса прикладывать не слѣдуетъ, потому что онъ замедлитъ бы нагноеніе. Нагноеніе же обыкновенно наступаетъ, когда произошло воспаленіе по причинѣ поврежденія мягкихъ частей, когда изъ клетчатой ткани вытечетъ много крови, также когда со всего мѣста сорвана кожа и мясо. Въ этомъ случаѣ натура въ состояніи залѣчить рану посредствомъ нагноенія. Однако если рана и воспаленіе не такого свойства, если она причинена ударомъ или разрывомъ, то тутъ вода очень будетъ кстати; въ нѣсколько минутъ она уничтожитъ самую высшую степень воспаленія и опухоли. Само собою разумѣется, что при внѣшнемъ употребленіи воды не слѣдуетъ забывать и ея употребленіе внутрь,

#### ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА.

Объ этомъ говорено уже въ предшествовавшемъ параграфѣ, и я позволяю себѣ только икратцѣ замѣтить здѣсь, что при этомъ должно употреблять *Asconitum Napellus* и *Belladonna*. Последнее средство при сильной воспалительной лихорадкѣ, такъ же какъ и въ лихорадкѣ отъ ранъ, употреблять попеременно черезъ 2 часа по приему *Arnica* съ *Asconitum*. Если же воспалительная лихорадка произошла не вслѣдствіе мѣстнаго поврежденія или раненія, но появилась какъ симптомъ внутренняго пребыванія болѣзни, тогда должны быть употреблены тѣ средства, которыхъ требуетъ внутренняя болѣзнь, какъ то, воспаленіе въ груди, въ кишкахъ, въ мозгу, въ гор-

лѣ, о которыхъ есть особенныя статьи въ этомъ сочиненіи, по этому справившись въ своемъ мѣстѣ, принимать предписанныя лекарства.

#### ПАДУЧАЯ БОЛѢЗНЬ.

Падучая болѣзнь есть одна изъ весьма трудныхъ для излеченія болѣзней, потому что причины ея могутъ быть слишкомъ многоразличныя, которыя не всегда легко можно узнать. Она собственно состоитъ въ сильныхъ спазмахъ во всемъ тѣлѣ; проходитъ послѣ извѣстнаго времени сама собою, а въ извѣстные періоды времени опять возвращается. Этимъ спазмамъ, свойственнымъ собственно падучей болѣзни, предшествуютъ извѣстные признаки, которыми должны воспользоваться какъ больной, такъ въ особенности окружающіе его, чтобы сдѣлать теченіе болѣзни менѣе вреднымъ. Пациентъ долженъ быть положенъ на мягкую постель или мебель, чтобы онъ не сильно упалъ и не поранилъ себя или не сломалъ себѣ какую нибудь часть тѣла. Предвѣстники эти суть: шумъ въ ушахъ, подергиваніе членовъ, конвульсія въ лицѣ, трудный и прерывистый разговоръ, оцѣненіе, головокруженіе, печальное настроеніе духа и особенное чувство, какъ будто холодный вѣтерокъ пробѣгаетъ по тѣлу. Къ этому присоединяется бѣшеніе сердца, сильная краснота лица, большой страхъ; вскорѣ за тѣмъ большіе пальцы сжимаются въ ладоняхъ, голова сворачивается на сторону, глаза становятся неподвижными, больной начинаетъ скрежетать зубами и изъ рта показывается пѣна. Въ этомъ положеніи, часто даже

и безъ предвѣстниковъ, больной падаетъ безъ чувствъ на полъ и бьется руками и ногами. Самъ же онъ не чувствуетъ ничего въ это время. По этому, чтобы пациентъ вслѣдствіе висящаго паденія на полъ не причинилъ себѣ вреда, необходимо положить его на что нибудь мягкое, какъ скоро замѣтятъ эти предвѣстники. Самые судороги продолжаются смотря по силѣ припадка иногда  $\frac{1}{4}$  часа, а иногда и  $\frac{1}{2}$  часа. Когда этотъ судорожный припадокъ пройдетъ, то больной какъ будто пробуждается отъ сна и встаетъ, не зная, что онъ имѣлъ припадокъ падучей болѣзни. Изнеможеніе и головная боль остаются у него короткое или даже долгое время. Эта болѣзнь появляется обыкновенно въ первый разъ въ періодѣ выростанія зубовъ, появленія регулъ и наступающей возмужалости, потомъ возвращается въ извѣстное время. Часто съ лѣтами исчезаетъ она сама собою; часто же остается на всю жизнь; но она никогда не бываетъ смертельна, развѣ въ томъ случаѣ, когда пациентъ опасно упадетъ и тяжело себя поранитъ; или если въ началѣ этой болѣзни, или во время ея продолженія, присоединится къ ней параличъ. Замѣчено, что у женщинъ падучая болѣзнь, наступавшая съ появленіемъ регулъ, проходила во время беременности или послѣ родовъ.

Леченіе этой болѣзни трудно, потому что не всегда возможно изслѣдовать причины ея появленія. Когда же врачъ узнаетъ ихъ, то оно становится легкимъ. Иногда она заключается въ мозгу, иногда въ желудкѣ и на это должно обращать вниманіе при леченіи. Но до сихъ поръ еще не объяснено, какимъ образомъ мозгъ дѣйствуетъ мгновенно такъ сильно на органы движенія, между тѣмъ какъ его вліяніе на органы чувствъ вовсе не существуетъ. Предрас-

полагающія причины падучей болѣзни бываютъ различны: иногда онѣ бываютъ наследственные, ибо замѣчено, что родители, подверженные этой болѣзни, имѣютъ и дѣтей таковыхъ же. Иногда эти причины кроются въ неправильномъ образованіи мозга; иногда можетъ какая нибудь поздне перенесенная болѣзнь сдѣлаться предрасполагающею причиною, если мозгъ и вся нервная система будутъ не соразмѣрно раздражаться. Падучей болѣзни очень подвержены люди тупоумные, съ большими головами, гдѣ органическое пороковое образованіе въ нихъ и въ мозгу, препятствуетъ его нормальнымъ отправленіямъ.

Глисты, особенно солитеръ, отягощеніе желудка, легкія отравленія, частое употребленіе опиума, сыпныя болѣзни, сильныя кровотеченія въ геморроидальной болѣзни и во время мѣсячнаго очищенія, также способны развить падучую болѣзнь. Въ послѣднемъ случаѣ леченіе бываетъ легко, потому что возбудившія эту болѣзнь причины скрываются близко и легко могутъ быть найдены. Вообще можно принять, что эта болѣзнь пройдетъ сама собою, если припадки ея при возвращеніи своемъ будутъ слабѣе и короче, и сонливость, которая слѣдуетъ за тѣмъ, уменьшится. Если же припадки продолжаются долѣе, увеличивается сонливость, наступаетъ большое безпамятство, быть можетъ даже бредъ, сильнѣйшее метаніе, то болѣзнь эту можно считать неизлечимою. Изъ гомеопатическихъ средствъ, которыя при этомъ употребляются, должно прежде всего замѣтить *Calcareo carbonica*. Дѣтямъ съ большимъ усидчивомъ даютъ это лекарство попеременно съ *Belladonna*. Если же припадокъ бываетъ очень сильный, тогда даютъ *Cuprum metallicum* и *Hyoscyamus niger*. Cam-



rhoга тоже прекрасное лекарство, если на лицѣ показывается большая краснота и одутловатость, съ горячимъ и клейкимъ потомъ, пѣна изо рта и сонливость. Хорошо давать въ этомъ случаѣ также Stannum.

Употребленіе холодной воды бываетъ и въ этой болѣзни очень полезно, потому что въ гидропатическихъ сочиненіяхъ приведено множество примѣровъ, какъ подобные больные во время припадка вдругъ приводимы были въ чувство вспрыскиваніемъ и умываніемъ холодною водою, а также посредствомъ низверженія на нихъ воды сверху. Внезапное купаніе такого рода вредно лишь весьма полнокровнымъ особамъ, потому что отъ того можетъ произойти легко ударъ; но весьма полезно для больного, если его обмывать губкою, окунать его руки въ холодную воду и слегка вспрыскивать голову. Когда припадокъ кончится и пациентъ придетъ нѣсколько въ чувство, то сперва онъ долженъ пить свѣжую ключевую воду въ маломъ количествѣ, потомъ больше и больше, наконецъ пить и ежедневно въ большихъ размѣрахъ, мыть ежедневно все тѣло или еще лучше ежедневно купаться въ ней, особенно долженъ мыть голову или окунать ее; ѣсть меньше и довольствоваться легкою пищею, и припадки, если не совсѣмъ пройдутъ, то по крайней мѣрѣ значительно ослабѣютъ, и наконецъ совсѣмъ прекратятся. Одинъ врачъ, страдавшій этою болѣзнію и не знавшій ея причины, прибѣгъ къ леченію водою и употреблялъ только растительную пищу, недугъ его ослабѣвалъ постепенно, а наконецъ и совсѣмъ исчезъ. Итакъ леченіе водою вмѣстѣ съ употребленіемъ вышеозначенныхъ гомеопатическихъ средствъ, избираемыхъ сообразно съ указанными причинами, мо-

жетъ ослабить совершенно эту болѣзнь и скоро совсѣмъ ее уничтожить. Нужно только постоянно и твердо держаться леченія водою и діеты, съ точностію употреблять вышеупомянутыя лѣкарства и если у больного при этомъ окажется уменьшеніе и облегченіе припадковъ болѣзни, то и этого уже слишкомъ достаточно. Если этого достигли, то можно ожидать и совершеннаго устраненія недуга.

### РВОТА.

Рвота можетъ происходить отъ разныхъ причинъ: иногда случается она отъ переполненія желудка, отъ испуга, отъ досады, отъ простуды желудка, отъ слабости желудка; иногда отъ ѣзды, отъ паденія на голову, отъ чего нибудь ядовитаго въ пищу. И такъ сообразно съ этими причинами должно избирать и врачебныя средства. Если желудокъ отягощенъ различною пищею, если испорченъ аппетитъ, дурной вкусъ во рту, если наступаетъ головная боль, слабость, дрожь, уныніе, то должно, принять 1—2 чашки чернаго кофе и предпринять на продолжительное время строгую діету, и всего лучше, ѣсть только хлѣбъ, при томъ черствый и пить воду. Позднѣе, особенно если желудокъ совершенно испорченъ, принимать Pulsatilla попеременно съ Ipecacuanha. Здѣсь и Antimonium crudum и Nux vomica суть специфическія средства. Если рвота произошла отъ простуды желудка, въ слѣдствіе употребленія въ пищу холодныхъ плодовъ или мороженаго, и при томъ есть спазмы подъ ложечкой, то давать попеременно Pulsatilla и Arsenicum album. Если причину

слабость желудка, или къ рвотѣ присоединится поносъ съ большою слабостію въ членахъ, если при томъ извергается вязкая бѣлая слизь, то должно давать *Pulsatilla* попеременно съ *Bryonia alba*. *Nuxvomica* въ этомъ случаѣ также помогаетъ.

Если рвота появилась отъ внезапнаго испуга, съ сильнымъ знобомъ и подергиваніемъ тѣла, тоскою и оцѣпенѣніемъ, то помогаетъ *Opium* попеременно съ *Sambucus nigra*; а происшедшая отъ досады съ тоскою и безпокойствомъ, головою болью, рѣзью въ животѣ и поносомъ, проходитъ отъ *Chamomilla*. Если это лекарство не совершенно изцѣлитъ, то дать *Vegetrum album*.

Многія особы не могутъ выдерживать ѣзды въ открытыхъ экипажахъ, въ которыхъ они подвергаются лучамъ солнца и во время скорой ѣзды не могутъ переносить вида слишкомъ скоро движущихся, быстро появляющихся и опять исчезающихъ окружающихъ ихъ предметовъ; получаютъ въ слѣдствіе этого головокруженіе и рвоту, которая бываетъ часто такъ сильна, что производитъ совершенное опорожненіе желудка, имъ помогаетъ *Cocculus* и ѣзда въ закрытомъ экипажѣ и не слишкомъ скорая.

Если причиною рвоты было паденіе на голову, то даютъ нѣсколько приѣмовъ *Agnica montana*; если паденіе было сильно, то должно посоветоваться съ врачомъ. При наступившей лихорадкѣ и спазмахъ *Beladonna* — специфическое средство.

Отъ сильной рвоты особенно помогаетъ холодная вода. Пьяные, легко подвергающіеся рвотѣ, должны пить много холодной воды и мыть въ колодезной водѣ половые органы или класть вокругъ нихъ холодные компрессы, которые можно класть и на животъ, если рвота продолжительна. Если причиною

этого большое накопленіе мокротъ, то вода, выпитая въ большомъ количествѣ, особенно способствуетъ къ разведенію слизи и удаленію ихъ естественнымъ путемъ. Люди, особенно расположенные къ рвотѣ, могутъ вылечиться отъ этой болѣзни весьма легко и надежно, употребляя холодную воду снаружи и внутрь. Авторъ этой книги вылѣчилъ жену свою совершенно въ 4 недѣли, настоятельно советуя ей употребленіе холодной воды противъ рвоты, которой она часто и легко подвергалась, и въ слѣдствіе этого ослабѣвала и страдала сильною головою болью.

#### ПОДАНИЕ ПОМОЩИ УДАВЛЕННЫМЪ, ПОВЪШЕННЫМЪ, ПОДАВИВШИМСЯ.

Если еще есть надежда возвратить къ жизни удавленнаго, повѣшеннаго или подавившагося, то ихъ сперва должно раздѣть и положить такъ, чтобы голова и шея были выше остальнаго тѣла и потомъ растирать постоянно тѣло теплою салфеткою и ставить почти чрезъ каждыя  $\frac{1}{2}$  часа клистиры изъ воды, смѣшанной съ одной каплей *Tinct. Opii*. Потомъ должно приложить нагрѣтые камни, завернутые въ шерстяную матерію, къ ногамъ и затылку, подъ мышки и къ бокамъ при безпрестанномъ треніи частей тѣла. Можно также мѣлко истолченную горькую миндалину смѣшать въ водѣ и давать удавленному внутрь и въ клистирѣ. Если зеркало, держимое предъ ртомъ и носомъ, покажетъ слѣды возвращающейся жизни легкимъ потускнѣніемъ онаго отъ весьма слабого дыханія, то должно продолжать тереть тѣло до тѣхъ поръ, пока жизнь не возвратится совершенно.

Если по прошествіи 2-хъ или 3-хъ часовъ не послѣдуетъ хотя самаго слабаго признака жизни, то всѣ старанія напрасны и попытки къ спасенію можно оставить. Но во всякомъ случаѣ должно скорѣе позвать врача.

Холодная вода въ этомъ случаѣ бываетъ полезна, если употреблять холодныя компрессы на голову и поливать ее водою.

### ПОМОЩЬ ЗАМЕРЗШИМЪ.

Замерзшихъ правильнымъ съ ними обращеніемъ, можно скорѣе спасти, нежели другихъ погибшихъ. Есть примѣры, что люди, пробывшіе нѣсколько дней подъ снѣгомъ или найденыя окоченѣвшими, были возвращаемы къ жизни. А потому отнюдь не должно прекращать попытки къ оживленію несчастныхъ такого рода, пока не покажутся вѣрныя и несомнѣнные признаки послѣдовавшей смерти. Но эти попытки должно предпринимать съ большою осмотрительностію, потому что окостенѣвшіе отъ холода члены легко ломаются. Такого несчастнаго сперва должно внести въ холодную комнату или амбаръ, и раздѣвъ совершенно, должно положить съ нѣскольکو возвышенною головою на слой снѣга толстотою около фута, повернуть все тѣло нѣскольکو на правую сторону и потомъ покрыть снѣгомъ на полфута, который крѣпко придавить. Голову не должно обкладывать снѣгомъ. Когда снѣгъ начнетъ таять, то должно обложить свѣжимъ. За неимѣніемъ снѣга берутъ воду какъ можно холоднѣе и кладутъ въ нее замерзшаго, но такъ, чтобы носъ и ротъ

оставались свободными. Или обертываютъ тѣло тряпками, намоченными въ водѣ со льдомъ и перемѣняютъ ихъ, какъ скоро онѣ потеряютъ свою холодную температуру. Если есть ледъ подъ рукою, то должно положить его въ воду. Снѣгъ, ледъ, холодная вода имѣютъ свойство извлекать изъ тѣла холодъ, что дѣлается довольно очевиднымъ, какъ скоро тѣло покроется какъ бы ледяною корою. Эта ледяная кора иногда бываетъ толще, иногда тоньше, смотря по тому, до какой степени холодъ проникъ въ тѣло. Эта ледяная кора дѣлается видима даже тогда, когда замерзнувшій дѣйствительно умереть; если же она становится, то это несомнѣнный признакъ, что жизнь, теплота въ тѣлѣ, или скорѣе кровь, опять въ немъ двигается. Тогда должно тереть тѣло снѣгомъ, потомъ сухими ветошками, но все еще какъ можно осторожнѣе. Или вынувъ замерзшаго изъ холодной воды, тереть шерстяною матеріею и перенести потомъ въ холодную комнату въ холодную постель. Кто нибудь изъ здоровыхъ особъ долженъ вдвухъ сперва слабо, потомъ нѣскольکو сильнѣе въ открытый ротъ больного воздухъ; а если трудно открыть ротъ, то въ носъ. Можно также поставить ему клистиръ изъ холодной воды, въ соединеніи съ малымъ количествомъ камфорнаго спирта, и повторять это нѣскольکو разъ черезъ 15 или 20 минутъ. Если покажутся еще болѣе признаковъ жизни, то клистиры холодной воды надо смѣнить клистирами теплаго, чернаго кофе и стараться влить больному въ ротъ нѣскольکو чайныхъ ложекъ кофе. Чаше приставлять къ носу пухъ, чтобы видѣть, не колышется ли онъ; если онъ движется, то это есть явный признакъ, что дыханіе хотя слабое входитъ и выходитъ. Или приставляютъ для сего небольшое зеркало къ носу и ко



рту. Если оно потускнѣетъ то это есть тотъ же признакъ. Если же не смотря на всѣ старанія, ожидаемые признаки жизни не окажутся, то все таки не должно оставлять попытки къ возвращенію жизни: успѣхъ оказывается послѣ долгаго времени, иногда даже послѣ цѣлаго дня и позднѣе. При томъ должно помнить, что здѣсь дѣло идетъ о человѣческой жизни. И какъ много иногда зависитъ отъ одной человѣческой жизни! Только тогда, когда наступятъ вѣрные признаки смерти и врачъ рѣшитъ, что всѣ дальнѣйшія попытки къ оживленію будутъ напрасны, можно считать замерзшаго умершимъ и предать землѣ. Если же послѣ вышеупомянутыхъ попытокъ удалось вернуть замерзшаго на столько къ жизни, что онъ опять будетъ дышать хотя еще слабо, то должно наблюдать слѣдующее: часто случается, что тотъ или другой членъ тѣла останется еще бѣлымъ; что есть признакъ скрывающагося въ немъ озноба; въ такомъ случаѣ должно натирать этотъ членъ снѣгомъ или холодною водою до тѣхъ поръ, пока онъ потеряетъ бѣлизну и получитъ настоящій цвѣтъ кожи. Если же больной послѣ своего оживленія будетъ жаловаться на сильную головную боль, то дать ему нѣсколько приѣмовъ *Aconitum Napellus*; если же онъ жалуется на боль во всемъ тѣлѣ, то *Carbo vegetabilis* или *Arsenicum album*. Если же онъ будетъ жаловаться на сильную жажду, то дать ему холодной воды, въ особенности при началѣ. Если же ему нужно подкрѣпленіе, то дать ему овсяной кашицы, одна-кожъ чуть теплой. Только по прошествіи сутокъ, можно давать ему сперва по чайной ложкѣ, а потомъ нѣсколько болѣе крѣпкаго, но холоднаго вина. Послѣ этого больной долженъ находиться еще нѣсколько дней въ холодной комнатѣ, а постель отнюдь не

должно нагревать. Только холодомъ можно вернуть ему совершенно жизнь и здоровье. Если бы захотѣли положить замерзшаго въ теплую комнату или въ теплую постель, то онъ очень скоро перешелъ бы въ гниеніе, еслибъ даже въ немъ и оставалась жизнь. Если же замерзшій, спасенный снѣгомъ и холодною водою, будетъ перенесенъ съ своего ледянаго ложа въ теплую постель, и ему дадутъ тотчасъ же теплую пищу и напитки или водки, рому или другихъ крѣпкихъ напитковъ, то этимъ низведутъ его опять на край гроба, потому что у него слѣлается горячка, которой исходъ нельзя предвидѣть особенно у больныхъ такого рода. Зло, причиненное холодомъ, должно быть устранено нѣмъ же. И здѣсь мы видимъ истинное гомеопатическое врачеваніе: *Similia similibus curantur* (подобное лечится подобнымъ). Возьми замороженное яблоко и согрѣй его. Теплота расширитъ слишкомъ скоро части, сжатые морозомъ, и слѣлаетъ ихъ мучнистыми и гнилыми. Напротивъ, опусти такое яблоко въ воду со льдомъ; сильнѣйшій холодъ внѣшній вытянетъ слабѣйшій холодъ, заключающійся въ яблокѣ. Оно покроется ледяною корою, которую легко снять, и такимъ образомъ осушенное яблоко останется хорошимъ и здоровымъ.

### О ЛЕЧЕНІИ ОТМОРОЖЕННЫХЪ ЧЛЕНОВЪ.

Люди, которые по большей части находятся на воздухѣ, въ холодныхъ комнатахъ и палаткахъ безъ сильнаго движенія, или обращаются зимою съ холодными и сырыми предметами, отмораживаютъ преимущественно конечные члены: руки, ноги, пость,

уши и вообще части, наиболее удаленныя от сердца. Такъ на примѣръ, прачки отмораживаютъ ноги, охотники — уши, очень часто носъ и т. д. Охлажденные и отмороженные члены, сначала опухаютъ, получаютъ потомъ красный цвѣтъ, который наконецъ переходитъ въ темновснній. Первоначальный зудъ вскорѣ превращается въ жгучую боль и наконецъ члены дѣлаются неподвижными и негодными къ употребленію. Но послѣднее легко можно предупредить, крѣпко натирая свѣгомъ замерзшіе, распухшіе и болящіе члены или при недостаткѣ его, обмывая и растирая ихъ холодною водою, или просто погружая ихъ въ воду и потомъ натирая этими средствами, можно извлечь проникнувшій въ нихъ холодъ. Ни въ какомъ случаѣ не должно быть невнимательнымъ и небрежнымъ, чтобы не случилось большаго несчастія — не поразилъ антоновъ огонь; потому что кожа на этихъ темновсннихъ, распухшихъ членахъ легко лопается; образуются глубокія трещины съ жестокимъ жженіемъ и глубокіе нарывы, источающіе водянистый гной. Потомъ образуются пузыри, чувствительность пропадаетъ и членъ начинаетъ гнить.

Признано за лучшее и испытанное средство натираніе замерзшихъ членовъ свѣгомъ; но послѣ этого надобно избѣгать теплой комнаты или печки. Часто отмороженные мѣста сами собою проходятъ въ благоприятное время года, но послѣ весенняго, лѣтняго и осенняго улучшенія, опять пробуждаются и обнаруживаются прежнія явленія. Тогда въ большей части случаевъ съ успѣхомъ употребляютъ *Acidum nitri*, которое дается 3 раза въ день и по три капли. Также цѣлбно дѣйствуетъ и *Petroleum*.

**О ПОДАНИИ ПОМОЩИ ПОВѢШЕННЫМЪ, смотри:** Поданіе помощи удавленнымъ, повѣшеннымъ, подавившимся.

### О ПОДАНИИ ПОМОЩИ УМИРАЮЩИМЪ ОТЪ ГОЛОДА.

Если человѣкъ, и даже здоровый, многіе дни ничего не могъ ѣсть или, желая причинить себѣ смерть, отказывался отъ всякой пищи, и за тѣмъ послѣдуетъ обморокъ и даже мнимая смерть, то сначала должно вливать ему въ ротъ парное молоко по каплямъ, а потомъ по чайной ложкѣ. Если зубы стиснуты, такъ, что этимъ способомъ ему не возможно дать малѣйшей пищи, то надобно поставить ему нѣсколько клистировъ изъ парнаго молока. Можно также натирать все тѣло и животъ виномъ. Въ скоромъ времени въ немъ появятся признаки жизни; ротъ откроется и тогда можно вливать ему молока сначала чайною, а потомъ и столовою ложкою. Если онъ почувствуетъ голодъ и обнаружить желаніе утолить его, то не слѣдуетъ давать ему по его желанію и въ большомъ количествѣ, но приготовить ему слабый супъ (хлѣбный) или бульонъ; давать по немногу, но почаще и наконецъ подкрѣпить его самымъ малымъ количествомъ хорошаго вина. Прежде всего долженъ наступить крѣпительный сонъ, послѣ котораго можно давать пищу въ большемъ количествѣ и только по прошествіи нѣсколькихъ дней, можно давать ему достаточную, но легкую пищу. Полное удовлетвореніе голода тотчасъ послѣ оживленія было бы ему вредно и даже могло бы причинить смерть.

Можно также прикладывать къ животу голодаващаго холодныя примочки, spryskивать лобъ холодною водою и ставить клистиры изъ холодной воды, къ которой примѣшивать немного крѣпительнаго вина.

## ПРОСТУДА.

Человѣкъ можетъ простудиться весьма различнымъ образомъ; столь же различны могутъ быть и послѣдствія отъ того. Здѣсь я упомяну о легчайшихъ видахъ простуды и ихъ ближайшихъ послѣдствіяхъ, потому что важнѣйшіе случаи или ихъ дальнѣйшія и опаснѣйшія послѣдствія были разсматриваемы при особыхъ болѣзняхъ, которыя они обуславливаютъ, на примѣръ: поносъ, лихорадка, сильный насморкъ и кашель, зубная боль, ломъ въ членахъ, воспаленіе въ груди и въ лёгкомъ, подагра, ревматизмъ и проч. Какъ только почувствуешь простуду и вмѣстѣ явится непріятная, отъ холода происходящая дрожь, то не дожидаясь большихъ отъ того послѣдствій, нужно одѣться какъ можно теплѣе и особенно стараться о теплотѣ ногъ; дѣлать въ комнатѣ или въ большой залѣ много движенія, чтобы за тѣмъ послѣдовала легкая испарина; выпить нѣсколько стакановъ холодной воды прямо изъ колодца; не пить ничего спиртнаго; въ крайнемъ случаѣ стаканъ совершенно холоднаго вина; выпить чашку чуть тепловатаго бульона безъ приностей и принять нѣсколько капель Nux vomica. Когда холодъ начнетъ нѣсколько проходить и появится пріятная теплота, то должно выпить еще стакана два холодной воды, лечь въ холодную постель и пробыть въ ней до тѣхъ поръ, пока не выступитъ умѣренный потъ. Его должно поддерживать нѣсколько часовъ и потомъ встать. Этими средствами могутъ быть предупреждены всѣ другія послѣдствія, могущія произойти отъ сильной простуды. Дѣтямъ было бы

весьма полезно дать чашку самаго теплаго и подогретого молока, которое несомнѣнно произведетъ испарину, если ихъ положить въ постель не совсѣмъ холодную, но умѣренно нагрѣтую. Родильницамъ полезно давать нѣсколько приѣмовъ Chamomilla, и натирать ноги и икры фланелью до тѣхъ поръ, пока они не согрѣются.

Но наипаснѣйшія слѣдствія, происходящія отъ простуды отъ разгоряченія, смотри подъ особыми именами.

Если тотчасъ послѣ простуды употребить холодную воду внутренне и наружно, то можно быть увѣрену, что болѣзнь совсѣмъ будетъ устраниена, и если бы всѣ люди захотѣли этому слѣдовать, то было бы весьма мало такихъ тѣлесныхъ недуговъ, которые противятся всѣмъ другимъ способамъ леченія. Для этого нужны только: многократныя купанья, холодныя примочки и для питья холодная вода, или натираніе охладѣвшихъ членовъ фланелью, обмоченною въ холодную воду; выпить еще нѣсколько стакановъ воды прямо изъ колодца, лечь въ постель, ожидать и поддерживать сильную испарину, которая легко обнаружится послѣ леченія водою, и болѣзнь въ большей части случаевъ будетъ устраниена. Но все это должно быть исполнено тотчасъ же послѣ простуды, для того, чтобы она не охватила благородныхъ частей организма. Есть много примѣровъ, что лица, которыя пренебрегли простудою и послѣ имѣли сведенные члены и не могли быть излечены никакими врачебными средствами, послѣ долгаго или краткаго употребленія холодной воды, возвратили совершенно здоровье и полное употребленіе своихъ членовъ. Стоитъ только спросить въ водолечебныхъ заведеніяхъ, и вы услышите о излеченіи такихъ болѣз-



ней, которыя многими врачами считались совершенно неизлечимыми. Многие подвергаются простудѣ весьма легко; ихъ вѣжная кожа очень часто не можетъ переносить ни малѣйшаго холода, ни сыраго воздуха, ни малѣйшей переменѣ температуры; а если ей подвергнутся, то страдаютъ тотчасъ же насморкомъ и кашлемъ; ноги ихъ холодѣютъ, сами получаютъ боль головную, зубную, въ ушахъ, въ горлѣ и т. п. Такимъ особамъ не остается другаго средства для укрѣпленія своей кожи, какъ употребленіе холодной воды. Когда онѣ къ ней привыкнутъ и будутъ употреблять ее нѣкоторое время, то вскорѣ увидятъ и пользу этого леченія и уже безъ всякаго вреда для своего тѣла, въ состояніи будутъ подвергаться вѣтру и непогодѣ, дождю и бурѣ. Но люди мало употребляютъ этотъ самый естественный способъ леченія, самый дешевый и наиболѣе укрѣпляющій. Они согласны лучше цѣлую жизнь влечить болѣзненное тѣло, пока преждевременная смерть не положитъ конца ихъ жалкому существованію. Но я думаю и надѣюсь, что въ позднѣйшее время мы увидимъ болѣе сильное потомство и гораздо менѣе больныхъ, потому что водолечебныя заведенія все болѣе и болѣе процвѣтаютъ и излеченные тамъ будутъ умѣть приобрести послѣдователей (\*).

### О УТОМЛЕНИИ.

Какъ съ одной стороны необходимо и полезно для

(\*) У насъ въ Москвѣ существуютъ уже два подобныя заведенія: первоначальное, доктора Крейзера, на Тверскомъ бульварѣ въ домѣ Засѣцкаго, и недавно открытое докторомъ Редлихомъ, на Страстномъ бульварѣ въ собственномъ домѣ.

Примѣч. переводчика.

человѣческаго тѣла движеніе, чтобы силы его укрѣпились работою и движеніемъ; такъ съ другой стороны вредно, если его силы слишкомъ напряжены и изнурены; когда послѣ такихъ усилій слѣдуютъ недуги и совершенное ослабленіе. Последнее не всегда можно предупредить, и въ жизни человѣка встрѣчаются дни, требующіе большаго и необыкновеннаго напряженія силъ. Если бы за этимъ послѣдовало ослабленіе ихъ, но не совершенное, то отдыхомъ можно возвратитъ прежнюю силу. Если же напряженіе продолжится долгое время и окажется крайняя необходимость въ скорѣйшемъ возвращеніи силъ, то этого можно достигнуть тепловатою ванною. Члены, особенно руки и ноги надобно вытереть смѣсью изъ столовой ложки Tinct. Arnicae съ стаканомъ воды, а за недостаткомъ оной, во время путешествій, водкою или ромомъ. На мѣстѣ же должно принять нѣсколько капель China. Большую пользу можетъ принести Rhus toxicodendron, особенно тогда, когда послѣ необыкновенно сильнаго напряженія при поднятіи и переноскѣ болятъ члены. Если ноги послѣ долгой ходьбы потрутся или распухнутъ, то весьма полезнымъ средствомъ можетъ служить Tinct. Arnicae съ водою. Слабые люди легко падаютъ въ обморокъ; имъ должно дать Coffea, если они не привыкли пить кофе; въ противномъ случаѣ Veratrum album.

Необыкновенно укрѣпляющее средство представляетъ въ этихъ случаяхъ холодная вода: купанье удивительно скоро возвратитъ исчезнувшую силу. Выпивъ послѣ этого нѣсколько стакановъ холодной воды, можно требовать отъ своихъ силъ новыхъ трудовъ. Но и здѣсь, какъ уже сказано, надобно поступать осторожно; потому что холодное купанье

тотчасъ послѣ разгоряченія, можетъ причинить смерть.

### О ПОДАНИИ ПОМОЩИ ПОРАЖЕННЫМЪ МОЛНІЕЮ.

Здѣсь надобно обратить вниманіе на то, гдѣ человѣкъ пораженъ молніею: въ домѣ, въ комнатѣ или на чистомъ воздухѣ. Въ первомъ случаѣ, надобно какъ можно скорѣе открыть всѣ окна и двери, чтобы удалить изъ этого небольшого пространства удушливый сѣрный чадъ, и чтобы доставить свободный доступъ чистому, свѣжему, оживляющему воздуху. Тогда нужно перенести несчастнаго на свѣжій воздухъ, хотя бы во время сильнаго дождя; спрыскивать ему лице, виски и подъ ложечкой холодною водою и держать предъ носомъ нашатырный спиртъ. Какъ возможно скорѣе позвать врача, который и предпишетъ дальнѣйшее. Впрочемъ такіе случаи, гдѣ несчастному можно возвратить жизнь, весьма рѣдки; потому что съ этимъ обыкновенно бываетъ соединено такое поврежденіе внутреннихъ органовъ, что попытки возвратить ему жизнь, бываютъ тщетны. Если было одно потрясеніе или обморокъ послѣ удара молніи, который потрясъ домъ или комнату, гдѣ находился несчастный, и если происшедшій отъ того въ комнатѣ сѣрный чадъ произвелъ безпамятство, то вышеозначенныя средства могутъ возвратить жизнь, по видимому улетѣвшую. Наружныя поврежденія могутъ быть излечены врачомъ. Если молнія поразила человека на чистомъ воздухѣ, въ полѣ и при томъ не смертельно, то свѣжій воздухъ и продолжающійся сильный, освѣжи-

тельный дождь, много будутъ способствовать несчастному подать признаки жизни, и если этого одного будетъ недостаточно, то сей часъ же, по нахожденіи его, нужно прибѣгнуть къ слѣдующему: надобно выкопать въ чистомъ полѣ яму такой глубины, чтобы пораженный могъ въ ней сѣсть; потомъ засыпать его всего землею, исключая головы. Теплота, содержащаяся въ землѣ, сообщится человѣческому тѣлу и будетъ сильно дѣйствовать на него живительно. Если онъ дышетъ, что можно прежде всего узнать, приложивъ пухъ къ носу, должно брызнуть ему въ лице холодною водою, и если есть подъ рукою Nux vomica, то дать ему нѣсколько капель. Послѣ этого его можно вынуть изъ земляной бани и перенести въ домъ, чтобы тамъ съ большимъ удобствомъ продолжать пособія для возвращенія его къ жизни. Полезны клистиры изъ тепловатой воды съ нѣсколькими каплями Nux vomica. Впрочемъ и здѣсь не худо позвать врача.

Я позволю себѣ упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ предосторожностяхъ, посредствомъ коихъ можно избѣжать пораженія молніею. Если человѣкъ во время грозы находится въ чистомъ полѣ, то онъ долженъ отложить въ сторону всѣ находящіяся у него желѣзныя вещи, и если онъ знаетъ, что вблизи есть мѣсто, могущее защитить его, то можетъ идти туда потихоньку; но если такого не случится, то онъ долженъ стоять смирно, вдали отъ предметовъ возвышенныхъ и ложиться къ то время на землю, когда гроза разражается непосредственно надъ нимъ, что не трудно узнать потому, что тогда за молніею тотчасъ послѣдуетъ громовой ударъ, потомъ можетъ встать, и если гроза поутихла, идти домой. Никогда не должно искать защиты подъ де-

ревьями, ибо молнія, какъ извѣстно, поражаетъ своею пламенною и разрушающею рукою предметы наиболѣе возвышенныя. Сидящіе верхомъ на лошади, должны слѣзть и идти вблизи; ѣдущіе въ экипажахъ, должны выйти изъ нихъ и идти сзади. Если во время грозы находятся дома, то должно отворить одно окно или дверь, не стоять около стѣнъ, печей или въ дверяхъ; отложить отъ себя всѣ металлы и сѣсть посреди комнаты. Въ этомъ положеніи человѣкъ наиболѣе защищенъ отъ удара молніею, еслибъ онъ послѣдовалъ. Надобно избѣгать такихъ мѣстъ, гдѣ находятся нѣсколько человѣкъ вмѣстѣ, потому что съ одной стороны сильная теплота и большое испареніе, обуславливаютъ притяженіе молніи, съ другой стороны при ударѣ въ домъ, хотя и не въ ту комнату, гдѣ сидятъ вмѣстѣ, все таки есть опасность быть удушену во время тѣсноты въ дверяхъ при выходѣ. Во время грозы огонь на очагѣ или въ каминѣ должно погасить, потому что гдѣ огонь, тамъ и дымъ можетъ привлечь молнію чрезъ трубу. Ни въ какомъ случаѣ не должно звонить, потому что колоколъ уже самъ по себѣ какъ металлъ имѣетъ свойство притягивать молнію; но притяженіе усиливается еще болѣе отъ происходящаго во время звона сотрясенія. Не должно предаваться чрезмѣрной боязни грозы, а именно молніи, потому что она во всякомъ случаѣ во время грозы вредна. Всѣ мы находимся въ рукахъ Божіихъ; всѣ мы должны заплатить землѣ дань нашимъ тѣломъ; — страхъ здѣсь не поможетъ.

## ПОТРАСЕНІЕ ТѢЛА.

Тѣло наше можетъ потерпѣть весьма сильное потрясеніе: отъ толчка, или удара, отъ паденія, прыжка и проч. Послѣдствія того въ легчайшемъ случаѣ: сильная головная боль, головокруженіе, въ высочайшей степени сильная боль въ груди и въ поясницѣ, одышка, кашель, кровохарканіе, кровотеченіе, которыя весьма легко могутъ причинить смерть. Подвергшись потрясенію, должно лечь, протянувшись, и сильно растирать водою по поламъ съ *Tinct. Arnicae* больныя мѣста; выпить нѣсколько стакановъ холодной воды и избѣгать разгорячающихъ и соленыхъ кушаньевъ. Послѣ этого можно попробовать тихо пройтиться или дать себя водить и во время ходьбы стараться выгибать спину и грудь впередъ. Если же этимъ ужаснымъ потрясеніемъ слишкомъ растянуты или разорваны внутреннія части, что показываетъ боль и послѣдующее кровохарканіе, тогда должно призвать врача, который опредѣлитъ дальнѣйшія средства для пользованія. Если же его нельзя найти въ скоромъ времени, то прежде всего должно дать *Arnica*, *Mercurius vivus* и *China* отдѣльно, по нѣсколькимъ пріемамъ. Въ этомъ случаѣ также весьма полезно *Nux vomica*. При сухомъ и короткомъ кашлѣ безъ кровохарканія, при сильномъ жарѣ и большомъ отдѣленіи пота, нужно принять *Pulsatilla*.

Дознано и испытано, что холодная вода при такой болѣзни оказываетъ величайшія услуги. Потрясенному ударомъ или паденіемъ, надобно дать пить



побольше холодной воды, наложить холодные компрессы на ту часть тѣла, въ которой наиболѣе чувствуется боль, натирать и растирать ихъ водою, и повторять это часто, употреблять виѣстъ съ вышеупомянутыми средствами, и въ короткое время дальнѣйшія слѣдствія потрясенія будутъ устранены. Если же послѣдовало совершенное поврежденіе внутреннихъ частей, тогда леченіе надобно предоставить искусному врачу; но притомъ не должно пренебрегать употребленіемъ холодной воды какъ наружно, такъ и внутренно.

### О СПАСЕНИИ ЗАДОХНУВШИХСЯ.

Отъ угольного газа, ядовитаго газа въ колодцахъ, лишенныхъ свѣжаго воздуха и рѣдко очищаемыхъ, въ погребахъ, гдѣ окисаетъ крѣпкое мартовское пиво, задыхаются тѣ, которые неосторожно входятъ въ эти вмѣстѣлища. Изъ предосторожности должно каждый разъ предъ входомъ туда, зажигать нѣсколько лучинъ и бросить ихъ туда. Онѣ впитаютъ въ себя ядовитые газы. Лучше всего зажечь пучекъ изъ сухихъ прутьевъ. Если же они не будутъ горѣть, то должно выстрѣлять въ погребъ изъ ружья или изъ пистолета, чтобъ уничтожить дурной воздухъ. Для возвращенія жизни несчастному, вошедшему въ эти вмѣстѣлища, своды и погреба, необходимо употреблять слѣдующія средства: прежде всего его должно вынести на свѣжій воздухъ, раздѣть, растереть холодной водою или уксусомъ и спрыскивать уксусомъ подъ носомъ. Здоровый и сильный человекъ долженъ вдвухъ ему свѣжій воздухъ въ ротъ;

а если зубы стиснуты, то чрезъ носъ, сначала очень слабо, а потомъ сильнѣе. Послѣ этого положить или посадить его съ опущенными ногами по колѣна въ тепловатую воду и сильно растереть его; класть на грудь и подъ мышки компрессы изъ холодной воды, и ею же спрыскивать подъ ложечкой. Полезны и цѣлебны въ такихъ случаяхъ клистиры изъ табачнаго дыма. Кромѣ того можно держать подъ носомъ савръ оленьяго рога или нашатырный спиртъ или даже не много потереть ими подъ носомъ. Если послѣ этихъ средствъ окажутся хотя слабыя признаки жизни, то должно дать выпить чайную ложку воды, смѣшанной съ небольшимъ количествомъ уксуса, а немного спустя, столовую ложку. Но если и эти средства не возвратятъ къ жизни, то необходимо посоветоваться съ врачомъ, за которымъ вообще немедленно должно послать и предоставить ему леченіе. Нѣсколько разъ удавалось спасать несчастныхъ и по преимуществу тѣхъ, которые не долго находились въ мѣстахъ, напичканныхъ такими газами и удушливыми парами. Большая часть этихъ случаевъ происходитъ отъ вдыханія угольного газа ночью, во время сна. Поэтому въ комнатахъ, топленыхъ вечеромъ, необходимо совершенно потушить огонь въ печи прежде, чѣмъ ложиться спать. Должно также выносить и душистые цвѣты, ибо ночью они пахнутъ сильнѣе.

### О СПАСЕНИИ УТОПИХЪ.

Должно стараться какъ можно скорѣе вытащить изъ воды упавшаго туа во время купанья, катанья

на ковычках или какимъ нибудь другимъ случаемъ. Осторожность здѣсь въ особенности совѣтуется; а такъ какъ не всегда можно ею руководствоваться при собственной опасности спасающаго, главное же дѣло состоитъ въ томъ, чтобы вытащить поскорѣе изъ воды, по этому должно всѣми возможными средствами стараться достигнуть этого, если бы даже нельзя было избѣжать поврежденія какой бы то ни было части тѣла утопавшаго; потому что лучше раны, нежели смерть. Нужно тотчасъ же разрѣзать платье у вытащеннаго изъ воды; раздѣваніе слишкомъ продолжительно и кромѣ того соединено съ большимъ движеніемъ и сотрясеніемъ. Это послѣднее не только не приноситъ ни какой пользы, но напротивъ рѣшительно вредно; равно какъ чрезвычайно вредно такого несчастнаго ставить на голову, какъ то не рѣдко случается въ городахъ и деревняхъ для того, чтобы вылилась вся масса проглоченной воды. Упавшій въ воду умираетъ не отъ количества проглоченной воды, но отъ недостатка воздуха, необходимаго для жизни. Раздѣвши несчастнаго, должно насухо вытереть тѣло, наклонить голову и грудь не много напередъ въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ; согрѣвать охладѣвшее тѣло теплыми полотенцами и легко потирать ими. Можно также подвергнуть его вліянію согрѣвающихъ солнечныхъ лучей, при чемъ однако надобно прикрывать голову. Должно чаще класть согрѣтую шерстяную матерію на брюхо, на предсердіе, около ляшекъ, подъ колѣни и подъ мышки; къ ногамъ же прикладывать нагрѣтые кирпичи, обернутые въ шерстяную матерію. Въ тоже время тереть ему попеременно то одну, то другую часть тѣла и поставить нѣсколько клистировъ изъ тепловатой воды. Отъ времени до времени прикла-

дывать ко рту пухъ или зеркало, чтобы видѣть, возвращается ли жизнь. Если же послѣ двухъ-часовыхъ опытовъ не будетъ никакихъ признаковъ жизни, то должно взять клистирную трубку наполненную холодною водою и прыскать изъ нея посплѣнѣе на грудь и на предсердіе; или съ нѣкоторой высоты капать воду на голову и на упомянутыя части тѣла. Послѣ этого обтереть воду, класть опять теплые компрессы и продолжать растирать безостановочно. Если же и это не поможетъ, то растирать утонувшаго согрѣтымъ виномъ или нашатырнымъ спиртомъ, и поставить клистиръ изъ ромашки, смѣшанной съ 30-ю или 40 каплями этого спирта. Потомъ вдунуть перышкомъ немного табаку въ носъ или держать около носа тертый хрѣвъ. Если и послѣ этого не обнаружатся признаки жизни, то чтобы узнать, сохранилась ли жизнь, уколоть иглою подошву, подъ ногтями рукъ и ногъ и капать на кожу сургучъ. Если и послѣ этого не окажется ни даже слабѣйшаго содроганія; или кожа сморщится подъ сургучемъ подобно пергаменту, то утонувшій мертвъ, и всѣ дальнѣйшія средства къ его оживленію должно прекратить. Однакожъ объ этомъ должно узнать мнѣніе опытнаго врача. Если же послѣ употребленія одного изъ сказанныхъ средствъ ранѣе или позднѣе возвратится жизнь, то дать оживающему 1 или 2 приѣма Lachesis; покрыть его теплыми одѣялами и дать уснуть. Сонъ будетъ для него лучшимъ средствомъ къ совершенному выздоровленію. По пробужденіи, вытереть виски виномъ и дать выпить не много вина въ чайныхъ ложкахъ; а при появленіи аппетита, давать легкаго бульона и потомъ со дня на день постепенно прибавлять болѣе крѣпительную пищу.

## О ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХЪ РОДАХЪ, ВЫКИДЫШЪ.

Паденіе, толчекъ или сильное движеніе въ танцахъ, частый и внезапный испугъ и досада, но большею частію въ слѣдствіе болѣзненно возвышенной раздражительности матки, происходятъ на 2-мъ, 3-мъ, 4-мъ мѣсяцѣ беременности, рѣдко позднѣе, преждевременные роды, т. е. прежде временный выходъ плода. Эти роды, *abortus*, соединены съ большими болями и опасностями для матери, нежели роды наступающія въ обыкновенный срокъ. Предвѣстники послѣдующихъ преждевременныхъ родовъ суть: боли, простирающіяся къ обѣмъ сторонамъ живота; побужденіе къ испражненію мочи и кала; выходъ изъ влагалища болѣшихъ или меньшихъ сгустковъ крови. Въ такихъ случаяхъ особенно помогаетъ *Chamomilla*. Но если боль сосредоточивается на вѣшнихъ дѣтородныхъ органахъ, или наступятъ сильныя боли въ поясницѣ, то должно давать *Belladonna*. При появленіи судорогъ, оцѣпенѣнія членовъ, при безпамятствѣ, при выходѣ блѣдно-красной крови вмѣсто сгустковъ, прилично *Hyosciamus*. Если поводомъ къ этому было паденіе, толчекъ, сильное и значительное потрясеніе тѣла вообще, то *Arnica montana* въ нѣсколькихъ пріемахъ лучшее средство. Если была досада причиною, то *Chamomilla*; страхъ — то *Opium*; печаль и ненависть — то *Ignatia*.

Средства эти указаны для того, чтобъ давать ихъ до прибытія врача, за которымъ нужно тотчасъ же послать.

Такъ какъ опытъ научаетъ, что выкидышъ повторяется обыкновенно и при слѣдующихъ беременностяхъ, и при томъ въ одинакихъ мѣсяцахъ, то женщины къ тому расположенныя, еще болѣе должны остерегаться всего, что можетъ послужить поводомъ къ новому выкидышу. Онѣ не должны танцовать и прыгать; должны избѣгать всѣхъ потрясеній тѣла, какъ то: ѣзды верхомъ и въ экипажахъ; не должны предаваться гнѣву и печали, ограничиваться въ употребленіи кофе, а всего лучше вовсе не пить его. Полезно употреблять каждые 8 дней 2 капли *Sabina*.

Въ особенности должно рекомендовать женщинамъ беременнымъ вообще и преимущественно такимъ, которыя уже разъ выкинули, внутреннее и вѣшнее употребленіе холодной воды. Если онѣ всякій день будутъ обмывать все тѣло и растирать шерстяною матеріею, обмоченною въ холодную воду нижнюю часть живота, дѣтородныя части, лишки и спину, или купаться одинъ или два раза въ недѣлю, и при томъ пить много холодной воды, то онѣ постепенно такъ окрѣпнутъ, что уже новыхъ, преждевременныхъ родовъ не будетъ. Такимъ образомъ онѣ не только оградятъ себя отъ выкидыша, но и увидятъ благотворное вліяніе ея при послѣдующемъ разрѣшеніи отъ бремени, потому что оно совершится легче, скорѣе и счастливѣе, нежели безъ этого пособія.

## ЛИХОРАДКА.

Лихорадка есть болѣзнь особеннаго рода, возвращающаяся то всякій день, то чрезъ 2, 3, 4 дня съ



ознобомъ, съ жаромъ и наконецъ съ испариною, почему она справедливо называется перемежающеюся. Когда ознобъ смѣняется жаромъ, а сей испариною, наступаетъ послѣ сего состояніе совершенно свободное отъ лихорадки. Во время озноба появляется головная боль, лице блѣднѣетъ, дрожь овладѣваетъ больнымъ, конечности коченѣютъ и синѣютъ, зубы стучатъ отъ холода и все тѣло дрожитъ; дыханіе становится тяжелымъ. Періодъ этотъ бываетъ иногда длиннѣе, иногда короче. Послѣ этого ознобъ прекращается, тѣло дѣлается теплымъ, потомъ является сухой сильный жаръ, при которомъ больной томится сильною жаждою. Жаръ смѣняется испариною, въ продолженіи которой головная боль прекращается, жаръ и жажда исчезаютъ и все тѣло покрывается сильною, клейкою, зловонною испариною. За тѣмъ настаетъ время, когда больной освобождается отъ лихорадочнаго состоянія, на одинъ или нѣсколько дней, ибо тогда пароксизмъ возвращается опять и проходитъ всѣ свои періоды. Въ это свободное отъ лихорадки время, больной можетъ лечиться. Главныя средства: China въ частыхъ пріемахъ и Ipecacuanha черезъ каждые 3—4 часа. Если присоединяется къ этому сильный запоръ, увеличивающій тоску больного и даже причиняющій бредъ, то давать Nux vomica. Если же потъ на лбу будетъ очень холодный, моча темнаго цвѣта и жаръ болѣе внутренній, то для устраненія этого, должно давать Veratrum album. Должно совѣтоваться съ врачомъ.

Холодная вода здѣсь не только облегчаетъ, но и совершенно исцѣляетъ отъ болѣзни. При гидропатическомъ леченіи нѣтъ надобности дожидаться свободного отъ лихорадки состоянія, но во время са-

мага озноба обмывать и тереть тѣло фланелью или щеткой, намоченной въ холодной водѣ и давать пить черезъ каждые четверть часа по маленькому стакану воды. Это не только избавить отъ озноба, но и уменьшить слѣдующій за тѣмъ жаръ и будетъ содѣйствовать приготовленію благотворнаго и злорадоваго пота; лихорадочныхъ пароксизмовъ будетъ меньше. При этомъ леченіи употребляются выше названныя лекарства.

### О НАРЫВѢ НА ПАЛЬЦѢ, НОГТОУДѢ.

Нарывъ на пальцѣ не всегда бываетъ слѣдствіемъ наружныхъ причинъ и производитъ страшныя боли, простирающіяся часто до самыхъ плечъ и не даетъ покоя ни днемъ ни ночью. Страданія эти доходятъ иногда до такой степени, что производятъ тошноту и обмороки. Чѣмъ болѣе будутъ употреблять противъ этого врага припарокъ и пластырей и т. п. тѣмъ долѣе онъ будетъ сопротивляться и долѣе болѣть, и часто не иначе можетъ быть уничтоженъ, какъ острыми инструментами. Скорѣе исчезнетъ онъ отъ малыхъ и рѣдкихъ гомеопатическихъ пріемовъ. Съ самаго начала главнымъ средствомъ послужить Mercurius vivus; внѣшнимъ же — опущеніе пальца въ парное молоко, въ которомъ размоченъ мягкій бѣлый хлѣбъ, или же погруженіе пальца въ тупой конецъ разбитаго яйца. Но если Mercurius окажется не довольно сильнымъ, то употребить Hepar Sulphuris. Если болѣзнь продолжается уже долгое время и оба упомянутыя средства не помогутъ, то употребить Silicea по поремѣнно съ Hepar Sulphuris. Silicea

утромъ, Нераг вечеромъ по двѣ капли. Если боль сдѣлается невыносимою, то принять Lachesis; а если на пальцѣ окажется черноватый нарывъ, причиняющій много боли, то Arsenicum album будетъ специфическимъ средствомъ.

Эта болѣзнь пальца, называемая также ноготѣдою, можетъ быть еще скорѣе вылечена, если при первомъ появленіи ея, опустить палецъ въ холодную воду и продержать тамъ до тѣхъ поръ, пока пропадетъ чувствительность. Нужно какъ можно чаще мѣнять воду и если есть подъ рукою ледъ, то разбивши его, положить туда же. Еслибъ это погруженіе пальца въ холодную воду нужно было продолжать полдня или и цѣлый день, то лучше побезпокоиться одинъ день, чѣмъ чувствовать невыносимую боль въ продолженіи 4-хъ или 6-и недѣль и кончить можетъ быть изуродованіемъ пальца хирургическою операциею.

### ФИСТУЛА.

Фистула есть внутренній нарывъ, изъ котораго выходятъ наружу матерія и жидкій, злокачественный гной. Она не можетъ быть излечена безъ употребленія лекарствъ, и смотря по мѣсту нахожденія, имѣетъ различныя названія, какъ, то: зубная, слезная, заднепроходная, мочевого пузыря, легкихъ и сочлененій. Она излечивается скорѣе и вѣрнѣе посредствомъ гомеопатіи. Специфическое средство есть Pulsatilla.

Фистула можетъ быть также скоро устранена и гидропатическимъ леченіемъ. Для этого нужно ежел-

дневно обмывать тѣло ледяною водою; пить утромъ, вечеромъ, въ полдень больше воды, воздерживаться отъ острыхъ кушаньевъ и напитковъ, коними поддерживается болѣзнь; прикладывать къ фистулѣ холодные компрессы отчего она исчезнетъ въ скоромъ времени со всѣми дурными соками, находящимися въ тѣлѣ, которыя могли бы вызвать новыя болѣзни. Чистое тѣло съ чистою кровью, не знаетъ ни фистулъ, ни чирьевъ, ни чесотки, ни нарывовъ. Кровь же очищается отъ употребленія внутрь и снаружи чистой, свѣжей, родниковой воды.

### О ЛИШАѢ.

Лишай есть отвратительная кожная болѣзнь, и по большей части хроническая, причиняющая больному большія непріятности. Лишай продолжается иногда нѣсколько лѣтъ сряду и излечиваются съ большимъ трудомъ. Они бываютъ сухіе и мокрые. Эти послѣдніе очень тягостны и отвратительны. Предъ появленіемъ ихъ дѣлается сыпь изъ маленькихъ прыщей, которые лопаются, испускаютъ матерію, скорѣе высыхаютъ и превращаются въ корку, въ родѣ древесной коры или хлѣбной корки, отпадающей въ послѣдствіи въ видѣ чешуекъ и пыльных частицъ. При не соблюденіи діеты, очень скоро возвращаются. Женщины мокротнаго сложенія и страдающія болѣзнями живота; мужчины, страдающіе подагрой и золотухою, бываютъ часто подвержены этой болѣзни. При леченіи главное — держать діету и воздерживаться въ особенности отъ всѣхъ жирныхъ, кислыхъ и острыхъ вещей. Должно совер-

шенно отказаться отъ употребленія свиного мяса и солонины. Прежде чѣмъ прибѣгнуть къ отдѣльнымъ гомеопатическимъ средствамъ, можно предварительно принять Sulphur, для скорѣйшаго удаленія этой болѣзни. По принятіи Sulphur 3 или 4-хъ разъ чрезъ день по 2 капли, должно принять Rhus toxicodendron 3—4 раза съ одинаковыми промежутками времени, а послѣ этого Calcareo carbonica и Bovista. Противъ мокраго, злокачественнаго лишаа можетъ служить отличнѣйшимъ средствомъ Hepar Sulphuris. Противъ гноящихся лишаевъ давать Mercurius vivus и Silicea, Natrum muraticum и Zincum по перемѣнно.

Если при строгой діетѣ и употребленіи гомеопатическихъ средствъ, обмываться также холодной водой и много пить ее, то можно быть увѣрену, что лишаи сойдутъ въ самомъ скоромъ времени, и что они уже не явятся тамъ, гдѣ приняли противъ этого столь сильныя предосторожности.

### ПРОСОВИДНАЯ СЫПЬ.

Просовидная сыпь есть кожное страданіе, которое является или какъ самостоятельная болѣзнь, или только какъ симптомъ другой болѣзни. Мало болѣзней, къ которымъ бы она не присоединилась. Въ этой сыпи образуются пузырьки величиною съ просо, наполненные иногда чистою, иногда мутною жидкостью, которые по прошествіи нѣсколькихъ дней исчезаютъ, и на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они прежде были, кожа шелушится и лупится. Сыпь сопровождается легкою лихорадкою и сильнымъ потомъ и дѣлается зудъ, и покалываніе на кожѣ. Большею

частью это не опасно; больной долженъ только остерегаться всякой простуды; но если повodomъ къ этому было дурное пищевареніе или употребленіе жирныхъ и соленыхъ кушаньевъ и напитковъ, то перемѣна образа жизни и строгая діета, послужатъ вѣрнѣйшимъ средствомъ. Если сыпь есть вмѣстѣ и симптомъ другой болѣзни, то и проходить вмѣстѣ съ нею. Опасна можетъ быть она только для роже-ницъ, если вмѣстѣ съ ней есть сильная лихорадка. Въ такихъ случаяхъ необходимо пособіе врача. Лекарства избираются смотря по припадкамъ, предшествовавшимъ сыпи. Если предшествуютъ: сильное безпокойство, обмороки, трясеніе членовъ, потемнѣніе въ глазахъ, головокруженіе, тошнота, рвота, рѣзь въ животѣ, поносъ, то должно давать каждые два часа по двѣ капли Ipecacuanha. Дѣти легко подвергаются этой сыпи, но у нихъ она имѣетъ другой видъ, и состоитъ изъ красныхъ, круглыхъ пятнышекъ, которые всегда одинаковы, наступить ли большая или меньшая степень жара; причиняютъ зудъ а вмѣстѣ съ тѣмъ безпокойство и крикъ. Облегчающими и врачующими средствами этой сыпи служатъ: Aconitum Napellus и Chamomilla. Можно также употреблять Hepar Sulphuris. При появленіи пота, нужно стараться поддержать его. Такъ называемая *крапивная сыпь*, состоящая изъ красныхъ, гладкихъ, рѣдко возвышенныхъ пятенъ, похожихъ на тѣ, которые бываютъ, послѣ обожженія крапивой, и причиняющая, какъ и эти, колючій зудъ, можетъ легко быть вылечена посредствомъ Rhus toxicodendron. Но если при томъ лице красно и чувствуется сильная головная боль, то Belladonna будетъ специфическимъ средствомъ. У любящихъ вино и водку, дѣлается особаго рода сыпь, состоящая изъ



красныхъ, гладкихъ пятенъ, показывающихся на разныхъ частяхъ тѣла кои сильно чешутся и если удовлетворять этому желанію, то является чувство боли какъ при ранахъ. Она проходитъ сама собою, вмѣстѣ съ удаленіемъ причины. Для скорѣйшаго же устраненія болѣзни можно принять нѣсколько капель *Nux vomica*.

Чтобы лучше отличить эту сыпь отъ скарлатинной, я обозначу различіе между ими нѣсколькими словами. Въ скарлатинѣ сыпь бываетъ гладкая, жирная, пурпуроваго цвѣта, который при давленіи пальцемъ тотчасъ исчезаетъ и оставляетъ бѣлое пятно; но какъ скоро прекратится давленіе, то сей часть опять краснѣетъ. Въ сильной степени болѣзни, кожа нѣсколько опухаетъ, при чемъ однако потъ не выступаетъ. У больныхъ скарлатиною, обыкновенно дѣлается воспаленіе въ горлѣ. Отъ кори отличается тѣмъ, что пузырьки, наполненные свѣтлой жидкостью, обыкновенно бываютъ расположены кучами, и рѣдко распространяются правильно по всему тѣлу; иногда же появляются они всѣ вмѣстѣ и тогда образуютъ большую опухоль; между тѣмъ какъ въ скарлатинѣ краснота исчезаетъ подъ давящимъ пальцемъ и то мѣсто бѣлѣетъ, но вскорѣ потомъ опять краснѣетъ, въ кори они остаются красными. Въ кори не бываетъ затрудненія глотать какъ въ скарлатинѣ; слѣдовательно легко отличать корь и скарлатину отъ простой просовидной сыпи. Главный признакъ сей послѣдней, есть кислый запахъ появившагося пота,

Что касается до водолеченія въ просовидной сыпи, то я позволяю себѣ привести о томъ слова Доктора. г. Гана, на стр. 83-ей его сочиненія: *Unter-richt von der wunderbaren Heilkraft des frischen Wassers*. «Но что же дѣлать, если предвидишь по-

«явленіе оспы, кори, просовидной сыпи и самыхъ петехій? Должно ли позволять этимъ злымъ гос-«тямъ по произволу хозяйничать въ кожѣ, все ку-«сать, все осквернять и даже поражать антоновымъ «огнемъ и все губить? Нѣтъ, лучше мы нагрузимъ «ихъ вмѣстѣ съ ихъ жилищемъ въ воду и съ нимъ «вмѣстѣ утопимъ; сможемъ на чисто всю причинен-«ную нечистоту, выполощемъ и погасимъ огонь, «ежели онъ зажженъ. Я хочу сказать этимъ, что «вышеупомянутыя назожныя сыпи можно смѣло до «появленія и по наступленіи и по уничтоженіи ихъ, «смывать чистою водою, чтобъ воспаленіе не взяло «верхъ, а кожа напротивъ смягчилась для легчай-«шаго появленія сыпи, и бѣдая острота ея ослабла.» Профессоръ Эртель, при появленіи просовидной сыпи у его дѣтей, лечилъ ихъ не токмо холодною водою предъ высыпаніемъ; но и во время видимаго отсутст-вія сыпи внутренно и наружно, и теченіе болѣзни много ускорилъ, облегчилъ и обезопасилъ. Но совѣтъ тѣмъ не должно дѣйствовать въ этомъ смыслѣ безъ согласія свѣдущаго врача.

### СКРЫВШІЙСЯ ПОТЪ НОГЪ.

«Кто знаетъ по опыту, какія опасныя слѣдствія и болѣзни происходятъ отъ скрывшагося пота ногъ и отъ пренебреженія тѣмъ, тотъ будетъ совершенно согласенъ со мною въ томъ, что должны быть употреблены всѣ усилія чтобъ какъ можно скорѣе опять вызвать наружу скрывшійся потъ ногъ, какъ бы онъ ни былъ тягостенъ и неудобенъ самъ по себѣ. Опаснѣйшія боли въ груди и въ легкихъ,

часто были послѣдствіемъ скрывшагося пота ногъ. Простуда есть обыкновенная тому причина. Чтобы вызвать потъ опять, должно взять горячихъ отрубей, ржаныхъ или пшеничныхъ, поставить въ нихъ ноги до икры и держать въ этомъ положеніи отъ  $\frac{1}{2}$  до 1 часа. Въ тоже время должно принять нѣсколько капель Silicea, и когда это средство не поможетъ, то Rhus toxicodendron, дѣлая по комнатѣ какъ можно болѣе движенія. При томъ должно носить шерстяные чулки и кромѣ того положить въ сапоги или въ башмаки еще пробочную подошву. Лучше всего употреблять чулки вязанные по поламъ изъ шерсти и изъ волосъ пуделя.

Кто вообще уже знаетъ сильное и благотворное дѣйствіе холодной воды, тотъ вѣрно не будетъ недовѣрчиво смѣяться, ежели и противъ этой болѣзни будетъ предложено и похваляемо употребленіе ея. Не должно пугаться перваго ощущенія холода, производимаго водой; послѣдующее дѣйствіе будетъ ощущеніе возвышенной теплоты. Утромъ и вечеромъ должно ставить ноги въ ванну съ холодной водой, потомъ тереть ихъ то рукой, то сулкой, то щеткой до самыхъ коленъ въ продолженіи  $\frac{1}{2}$  часа; послѣ этого должны мокрыя еще ноги обернуть въ шерстяное одѣяло и лечь на  $\frac{1}{2}$  часа или на часъ въ постель. Ноги очень скоро согреются и скрывшійся потъ появится опять въ скоромъ времени. Я думаю не слѣдуетъ и упоминать о томъ что таковымъ больнымъ должно какъ можно болѣе дѣлать движенія на воздухѣ и ежедневно пить много холодной воды. Такимъ образомъ ножной потъ, обратившійся на благородные органы, возвратится посредствомъ холодныхъ ваннъ туда, гдѣ онъ долженъ находится и много потерять своего отвратительнаго запаха.

## ПОВРЕЖДЕНІЕ НОГЪ,

Причины тому могутъ быть различныхъ родовъ; но не смотря на это различіе, дѣлается ли нога недвижима, или она пухнетъ и причиняетъ боль, вѣрнѣйшимъ и скорѣйшимъ средствомъ къ излеченію послужитъ примочка изъ 1 части воды и 3-хъ частей Tinct. Arnicae, и кромѣ того пріемъ нѣсколькихъ капель разжиженной Arnica. Но если повреждена и разорвана сухая жила, что бываетъ соединено съ большимъ ощущеніемъ боли, то дать нѣсколько капель Natrum muriaticum. Но здѣсь должно прибѣгнуть къ помощи врача. При поврежденіи кости въ ногѣ, Symphitum officinale внутрь и снаружи будетъ специфическимъ средствомъ.

Можно скоро вылечить эти поврежденія холодною водою, растираніемъ ею и ваннами для ногъ. Не должно забывать при этомъ, какъ отъ воды уменьшается опухоль, умѣряется жаръ и облегчается боль.

## ЖЕЛЧНАЯ ЛИХОРАДКА.

Въ желчной лихорадкѣ печень находится въ особенно раздраженномъ состояніи: она отдѣляетъ много желчи и этимъ сильнымъ отлѣпленіемъ производитъ болѣзненное измѣненіе въ желудкѣ и въ кишкахъ. Сильная простуда послѣ предшествовавшего разгоряченія, скорая перемѣна температуры, частое и обильное употребленіе жирной пищи, особенно свинины

въ особенности ея неудобоваримаго сала, питье послѣ гнѣва и досады и проч. бываютъ причиною болѣзни. Желчная лихорадка обнаруживается легкимъ ознобомъ, за которымъ слѣдуетъ жаръ съ головою болью, сильною жаждою и тоскливымъ сномъ съ предшествовавшими: головокруженіемъ, головою болью, тошнотою, отвращеніемъ отъ мяса, рвотою, скопленіемъ вѣтровъ и упорнымъ запоромъ. Языкъ сначала бѣловатый и желтоватый, наконецъ дѣлается совершенно коричневымъ; вкусъ во рту отвратительно горькій. Моча дѣлается мутною и желтою и образуетъ густой осадокъ. Главное средство противъ этого *Chamomilla*; а ежели причиною лихорадки былъ гнѣвъ, то — *Pulsatilla*. Однако при этомъ должно посоветоваться съ врачомъ.

Если при употребленіи этихъ средствъ лечится еще водою, наблюдать строгую діету, воздерживаться отъ всѣхъ жирныхъ яствъ и пить много холодной воды, все тѣло обмывать, а желудокъ растирать ею, то въ самое короткое время окажется благоприятный исходъ болѣзни. Языкъ со дня на день будетъ чище, моча свѣтлѣе, уничтожатся всѣ вышеозначенные симптомы, а желчь придетъ въ прежнее состояніе.

### ГАСТРИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА.

Гастрическая лихорадка есть желудочная, произшедшая отъ разстройства желудка. Поводомъ къ ней бываютъ большею частію: грубая погрѣшности противъ діеты, простуда, гнѣвъ, досада, печаль. Она, какъ и желчная лихорадка, начинается озномомъ, потомъ жаромъ съ головою болью, тошнотою,

тою, скопленіемъ вѣтровъ въ животѣ, запоромъ, иногда поносомъ. Языкъ бываетъ также какъ и тамъ сперва бѣлый, потомъ желтый и наконецъ бурый. Вкусъ во рту гнилостный, кислый и горькій; за тѣмъ часто слѣдуетъ отрыжка съ наклонностію ко рвотѣ. Когда прежде всего уничтожился запоръ или послѣдовала частая рвота, то наступаетъ и облегченіе. Средства, которыя должно употребить противъ этого, суть: *Pulsatilla*, послѣ жирной пищи; *Coffea cruda*, при сильномъ позывѣ ко рвотѣ попеременно съ *Antimonium crudum*. Можно того же достигнуть одною или двумя чашками черного кофе. Если за этимъ послѣдуетъ рвота, то тѣмъ лучше. *Chamomilla* специфическое средство, когда причиною лихорадки былъ гнѣвъ, а если съ этимъ соединено еще постоянное чувство зноба, то должно дать *Bryonia alba*. *Ignatia amara* полезна, когда къ обнаруженію болѣзни способствовала печаль; а *Aconitum Napellus*, когда причиною были гнѣвъ и испугъ. *Nux vomica* употребляютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда съ послѣднимъ соединена еще изжога — жгучій кислотный вкусъ.

Послѣ многого питья холодной воды желудокъ очистится отъ всей своей нечистоты; это освѣжитъ все тѣло и слѣдуетъ то, что онъ будетъ хорошо исполнять свои отравленія. Если бы мы могли видѣть внутри этого вмѣстилища столь различныхъ и вредныхъ веществъ; если бы мы могли наблюдать эту огромную кучу, накопленную тамъ, и приготовленную для перевариванія, — мы бы удивились не встрѣчая еще болѣе болѣзней. Все это онъ долженъ измѣлчить, извлечь изъ того силу и передать всѣмъ другимъ частямъ тѣла, и опять извергнуть, не имѣя достаточно времени по требованію своего господина



исполнить это дѣло совѣстливо и ему на пользу. Если желудокъ разстроенъ, то онъ какъ будто говорить: я немогу болѣе работать, перестань меня отягощать или я все выброшу; дай мнѣ время исполнить мое дѣло, поголодай нѣсколько; дай мнѣ для подкрѣпленія какой нибудь напитокъ, который далъ бы мнѣ силу переварить пищу и легко вывести ее разложенную чрезъ мои исходные пути. Единственный напитокъ ему наиболѣе полезный и облегчающій его трудныя отправления есть холодная вода. Но пить ее должно такъ много, чтобы тамъ образовалась маленькая купальня, изъ которой размягченная пища была бы сплавлена внизъ какъ по рѣкѣ. Если эта трудная работа удалась, то послѣ этого желудокъ должно содержать въ чистотѣ и никогда уже не отягощать его и продолжать пить холодную воду. Этимъ только можно избавиться навсегда отъ легіона враговъ.

### СЛАБОСТЬ ПАМЯТИ.

Это вовсе не есть болѣзненное состояніе, однако же значительное зло для большаго числа людей имѣющихъ страждущихъ и, для устранинія котораго, они не колебались бы принести нѣкоторые жертвы. Люди, которые были долго больны, должны были перенести кровопусканія и слабительныя, или которые ослабили себя слишкомъ ранними излишествами въ любви или онанизмомъ, изнурялись тѣлесно и душевно отъ поллюцій и сифилитическихъ болѣзней, страдаютъ слабостію памяти въ позднѣйшихъ лѣтахъ жизни. Неумѣренню пьющіе вино, пиво и водку также скоро

знакомятся съ этою слабостію; однако есть тому и мѣстные причины, на примѣръ: ударъ или паденіе на голову. Если причиною была предшествовавшая потеря соковъ: то China въ нѣсколькихъ приемахъ будетъ дѣйствовать цѣлительно; пьяницамъ полезно Nux vomica, а тѣмъ, которые потеряли память отъ паденія или удара по головѣ — Arnica montana. Aconitum есть хорошее средство тогда, когда эта слабость произошла отъ сильнаго душевнаго волненія или отъ частаго прилива крови къ головѣ. Понятно, что въ тоже время приличнѣйшій образъ жизни составляетъ важное условіе для устранинія этой слабости.

Дѣйствительнѣйшее и превосходнѣйшее средство для того, чтобы уничтожить слабость памяти и возвратить прежнюю ея силу и твердость, есть холодная вода. Страждущій долженъ пить по утру и вечеромъ значительное количество воды, мыть тѣло ежедневно и купаться нѣсколько разъ въ теченіи недѣли. Во время мытья окунать всю голову и долгое время держать ее въ водѣ. Въ особенности мыть голову, глаза, виски, вбирать холодную воду въ носъ. Не забывать при этомъ опускать половые органы, Scrotum, въ холодную воду по нѣскольку разъ въ день, чтобы остудить ихъ тамъ совершенно. Тереть шерстяною тканью, омоченною въ холодную воду, позвоночный столбъ и скоро благотѣльные послѣдствія этого обнаружатся. Чѣмъ дольше это будетъ исполняемо, тѣмъ тверже будетъ становиться память. При этомъ человекъ долженъ избѣгать всякаго излещества въ любви, пищѣ и питьѣ. Этому способствуетъ еще и ежедневное, хотя не большое чтеніе, надлежащее пониманіе и размышленіе о томъ, наконецъ заучиваніе наизусть. Всѣ другія средства, которыя

восхваляются и предлагаются тамъ и сямъ, вовсе не дѣйствуютъ и не помогаютъ. Я полагаю, что всякій благомыслящій будетъ со мною согласенъ.

### ВОСПАЛЕНИЕ ВЪ МОЗГУ.

Эта болѣзнь слишкомъ быстра и сильна и опасна для жизни больного, чтобъ здѣсь же не предупредить, какъ необходима помощь опытнаго врача. По этому здѣсь изложены только вкратцѣ симптомы, которые обозначаютъ наступающее или наступившее уже воспаление въ мозгу, и упомянуты средства, которыя слѣдуетъ давать до прибытія врача. Главнѣйшіе симптомы суть: приливъ крови къ головѣ, жаръ въ ней, между тѣмъ какъ въ оконечностяхъ, рукахъ и ногахъ замѣчается поразительный холодъ. Лице принимаетъ ярко красный цвѣтъ, также и глаза, больной впадаетъ въ сонливость, или въ бредъ; голова загибается назадъ, и какъ будто вдавливается въ подушку. Руки непроизвольно притягиваются къ головѣ, какъ будто хотятъ показать, что здѣсь находится болѣзнь. Часто болѣзнь наступаетъ со всею силою, и это предвѣщаетъ не совсѣмъ хорошій исходъ. Дѣти въ особенности расположены къ воспаленію въ мозгу. Если такое воспаленіе началось, то слѣдуетъ тотчасъ послать за врачомъ, взять изъ-подъ головы пуховыя подушки и положить что нибудь охлаждающее и высокое; стараться согрѣть ноги треніемъ; положить верхнюю частію тѣла прохладнѣе и давать чрезъ каждые четверть часа по 2, 3 капли *Aconitum Napellus*. Если послѣ этого средства не послѣдуетъ уменьшеніе лихорадки, и

прибытіе врача замедлится, то должно взяться за *Belladonna* и давать каждыя 10 минутъ по такому же приему. Очень часто этими средствами прекращается болѣзнь.

Гидропатія оказываетъ здѣсь, какъ и самыя аллопаты должны сознаться, самыя лучшія услуги, потому что они сами предписываютъ, когда воспаленіе въ мозгу сдѣлается упорнымъ, примочки изъ холодной воды, даже изъ льда, перемѣняя ихъ чрезъ 5—7 минутъ или такъ часто, какъ скоро наложенный компрессъ потеряетъ свой холодъ отъ теплоты, стремящейся изъ головы. Однимъ только этимъ средствомъ были спасены многіе опасно больные воспаленіемъ въ мозгу. Должно при этомъ употреблять и вышеупомянутыя гомеопатическія средства.

### ГЛУХОТА.

Многіе страдаютъ глухотою, но не у всѣхъ и не всегда должно искать причину въ затвердѣніи ушной сѣры, или въ ударѣ по головѣ, или въ простудѣ послѣ предшествовавшаго разгоряченія. Можетъ быть прежнія болѣзни: корь, скарлатина, чесотка и многія другія такого рода, дурно леченныя, положили тому основаніе. Не окажется ли полезнымъ въ такихъ случаяхъ продолжительное антипсорическое леченіе? Я думаю, что оно должно быть очень полезно, особенно когда средства, назначенныя сообразно съ различными причинами, не могли уменьшить и ослабить болѣзни, не говоря уже о томъ, чтобы совершенно ее излечить; потому что причины лежатъ глубже.

Если глухота зависит отъ затвердѣнія слѣры, то должно стараться размягчить ее сначала парами молока, и вынуть осторожно изъ уха посредствомъ ухвертки; эти же пары слѣдуетъ употреблять и тогда, когда ухо слишкомъ засохло. Въ тоже время при послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ давать *Carbo vegetabilis*. Если же это случилось отъ простуды, если образовался ревматизмъ и бросился на слуховые органы: то *Dulcamara* есть изстоящее средство. Если она происходитъ отъ скрытія кожныхъ сыпей: то употребляется *Spiritus sulphuratus*. Если болѣзнь происходитъ отъ геморроидальной болѣзни, то слѣдуетъ принимать *Nux vomica*; если она сдѣлалась послѣ оспы, то должно давать *Mercurius vivus*, послѣ красухи *Hepar Sulphuris*, а послѣ кори *Carbo vegetabilis* попеременно съ *Pulsatilla*. Если этихъ средствъ не достаточно, и при этомъ нельзя ожидать разрушенія органовъ слуха, то должно прибѣгнуть къ болѣе продолжительному леченію и принимать въ продолженіи 14 дней чрезъ каждые 2 дня по одному приему *Sulphur*, потомъ *Mercurius vivus* въ такихъ же приемахъ и точно также продолжать *Staphysagria*. Наконецъ чрезъ 7—8 недѣль должно употребить *Silicea* и *Calcareo carbonica*. Даже застарѣлую боль можно вылечить такимъ образомъ. Если же основная причина есть органическій недостатокъ: то помощь оказать не возможно.

Очень дѣйствительна и полезна при глухотѣ холодная вода, и есть много особъ, которыя получили отъ холодной воды уменьшеніе зла, наконецъ и совершенное избавленіе отъ него. Леченіе это не должно быть допущено иначе какъ по назначенію и подъ надзоромъ врача. Сперва должно приучить себя къ ежедневному обмыванію головы водою холодною,

какъ ледъ; далѣе нужно въ больное ухо пустить холодной воды и продержатъ тамъ нѣкоторое время и въ тоже время мыть все тѣло или купать его. При этомъ должно очень много и прилежно пить холодную воду; далѣе должно опустить всю голову въ холодную колодезную воду, только что взятую изъ колодца, особенно же вечеромъ предъ сномъ, и не осушая ее завернуть въ шерстяное одѣяло, такъ, чтобы ротъ, носъ и глаза были свободны и лечь въ постель, такъ чтобы хорошенько вспотѣть. Все мѣсто, окружающее ухо, должно быть нѣсколько разъ въ теченіи дня вытерто водою, или растираемо щеткою, а потомъ голова окунута въ воду. Въ то же время слѣдуетъ глядѣть за большою опрятностію головы, волосъ, и чесать волосы или гладить щеткою сухіе. Должно заботиться о теплотѣ въ ногахъ и въ спиртные напитки, также кофе и крѣпкій китайскій чай должны быть избѣгаемы. Если въ такой мѣрь употребить вмѣстѣ гидропатію и гомеопатію, то навѣрное можно ожидать помощи въ короткое время; а если ея не окажется, то значитъ есть органическія пороки, конхъ нельзя устранить.

### ЖЕЛТУХА.

Какъ только отдѣленіе желчи въ кишки, по какой бы то ни было причинѣ, будетъ воспрепятствовано, и она перейдетъ въ кровь, тѣло является отъ этого въ самыхъ нѣжныхъ и мягкихъ частяхъ окрашеннымъ въ желтоватый цвѣтъ, и когда это окрашеніе появляется: то называютъ это ненормальное явленіе или болѣзнь желтухой. По большей части сна-



чала бѣлокъ въ глазу является окрашеннымъ въ желтый цвѣтъ. Моча дѣлается желто-красною и испражненіе сѣрымъ и жесткимъ. Она не опасна, и скоро проходитъ при правильномъ леченіи. Главныя припадки, соединенныя съ нею, суть: давленіе въ желудкѣ, боль въ селезенкѣ, и очень затрудненное испражненіе. Chamomilla есть главнѣйшее средство противъ нея. Если болѣзнь произошла отъ чрезъ-чуръ обильнаго употребленія горячительныхъ напитковъ, если больной вспыльчиваго нрава: то слѣдуетъ давать вмѣсто Chamomilla, Pulsatilla попеременно съ Ignatia amara. Дѣтямъ должно давать Nux vomica, одну каплю, распушенную въ чайной чашкѣ воды и каждые 2 часа по 1-й чайной ложечкѣ этой воды.

Весьма ясно и очевидно становится, что ни что до такой степени не способно растворять и разжижать густую и вязкую желчь (каковою она является при желтухѣ), какъ холодная вода, если ее пить прилежно, какъ слѣдуетъ. По этому должно съ необходимостью прилежаніемъ пить эту благородную влагу, мыть все тѣло, особенно то мѣсто, гдѣ лежитъ печень, и хорошенько тереть его щеткою.

### ВКУСЪ ПРОТИВНЫЙ.

Это обыкновенно не есть самостоятельная болѣзнь, особенно при разстройствѣ желудка, и описаніе ея было бы повтореніе того же, что изложено объ этомъ при болѣзняхъ желудка. Противный вкусъ проходитъ самъ собою, какъ скоро желудокъ приведенъ будетъ въ порядокъ, т. е. болѣзнь, на-

ходящаяся тамъ, будетъ удалена и уничтожена. Потому и слѣдуетъ справиться объ этомъ тамъ же.

### ЯЗВЫ.

Язвы происходятъ частію отъ дурно содержимыхъ ранъ, отчасти отъ скопленія нечистотъ въ тѣлѣ, отъ не воздержной жизни и т. д. Они называются мокротными, если изъ нихъ постоянно вытекаетъ жидкій гной; — гнилыми язвами, если мясистыя части окололежащія принимаютъ бѣлый или черноватый цвѣтъ и зловоніе; и — разъѣдающими язвами, которыя расходятся и въ глубину и въ длину и въ ширину. Если они произошли отъ внѣшняго поврежденія или послѣ онаго и если съ этимъ соединено воспаленіе: то сначала принесетъ большую пользу Aconitum Napellus и Bryonia alba. Если язва сильно гноится: то должно принимать Arsenicum album и Silicea, послѣднее преимущественно тогда, когда гной густъ; если же онъ жидокъ и сильно пахнетъ: то должно принимать Mercurius vivus попеременно съ Aca foetida; если язва и послѣ этого не пройдетъ: то даютъ Nepar Sulphuris, 3 раза въ день по 3 капли. Lachesis употребительно, въ язвахъ разъѣдающихъ. Часто случаются зараженныя язвы отъ укушенія озлобленныхъ животныхъ; они вылечиваются нѣсколькими приемами Hydrophobinum. Если кто нибудь имѣетъ открытую рану и позволить войти туда, напр. при убиваніи или закалываніи больного животного, нѣсколько крови его или же гноя изъ раны, находящейся въ тѣлѣ другого: то этимъ онъ можетъ причинить себѣ очень зло-

качественную язву, даже самую смерть. Въ такомъ случаѣ лучше не убивать такихъ животныхъ, но передавать ихъ на живодерню. Если же сказанное и случится и перешла малѣйшая частица изъ гни-лостнаго гноя въ рану: то она должна быть тогчасъ промыта крѣпкимъ щелокомъ или также холодною водою; или же должна быть подвергнута нѣкоторое время камильному жару. Сифилитическіе больные, которые не хорошо и неосновательно были излечены средствами, къ которымъ обыкновенно прибѣгаютъ, часто въ послѣдствіи страдаютъ злокачественными язвами, они должны принимать нѣкоторое время *Hepar Sulphuris*, а потомъ *Staphysagria*, чрезъ два дни по 1-му приему.

Мало было бы людей страдающихъ этою болѣз-нью, еслибы всѣ пили достаточно холодной воды, и дѣлали холодныя обмыванія своего тѣла, потому что вода очищаетъ кровь и удаляетъ все нечистое изъ тѣла; по крайней мѣрѣ язвы не принимали бы такой злокачественный характеръ, если бы случи-лось имъ выступить наружу. Какъ вода дѣйствуетъ предотвращая, такъ точно вѣрно и скоро она высе-чиваетъ всѣ случившіяся и уже существующія язвы. Слѣдуетъ прилежно пить, хорошенько мыть и купать тѣло, промывать самыя язвы нѣсколько разъ въ день, избѣгать всякихъ жирныхъ и кислыхъ куша-ній и напитковъ; при этомъ, если употреблять наз-наченныя гомеопатическія средства, то въ самое ко-роткое время не только излечатся существующія язвы, но и будетъ уничтожена всякая матерія для образованія новыхъ.

## ЛОМОТА.

(Подagra, хирагра и пр.)

Эта болѣзнь, большею частію поражающая только сочлененія человѣческаго тѣла, рѣдко, чрезвычайно рѣдко поражаетъ все тѣло. Случается она чаще въ возрастѣ отъ 30—50 лѣтъ у людей вообще силь-ныхъ, полныхъ и часто передается отъ родителей, у иныхъ опять происходитъ отъ неправильной діе-ты, отъ употребленія тяжелыхъ и крѣпкихъ пивъ и вина, или отъ простуды, главнымъ образомъ отъ быстрой переменъ погоды изъ тепла въ холодъ. Сидячій образъ жизни, бездѣйствіе, невоздержность въ удовольствіи плотской любви, самооскверненіе, неверическая болѣзнь и многія другія, могутъ быть упомянуты какъ причины, производящія ее. Иногда же она бываетъ и наследственная. Предвѣстники этой чрезвычайно мучительной болѣзни суть: нева-реніе пищи, недостатокъ аппетита, волненіе крови, подергиваніе, потомъ жаръ и холодъ въ частяхъ, гдѣ хочетъ появиться ломъ. Если же она наступи-ла: то кровяные сосуды, лежащіе тутъ, сильно надуваются и боль наступаетъ вдругъ и такъ силь-но, что части, пораженныя ломотою, не могутъ переносить самага малѣйшаго давленія, даже однимъ отдѣломъ. Днемъ болѣзнь не такъ сильна и боль не такъ жестока, какъ вечеромъ и во время ночи; ли-хорадка, которая большею частію соединена съ нею и переходитъ отъ дрожи къ сухому жару, также днемъ пропадаетъ, какъ и боль. Моча, отдѣляемая

въ небольшомъ количествѣ, окрашена темнымъ цвѣтомъ. Послѣ того какъ такое состояніе продолжалось нѣсколько лѣтъ, появляются по большей части на рукахъ и ногахъ опухоли, которыя при прикосновеніи сильно болятъ. Часто ломота переходитъ съ одного мѣста на другое и тогда называется летучимъ ломотъ. Вообще продолжается ломота отъ 3—4 недѣль, однако же она можетъ продолжаться болѣе короткое и точно также болѣе долгое время, смотря по тому, слабѣе или сильнѣе причина ея и болѣзненная матерія и болѣе или менѣе ошибокъ въ діетѣ было сдѣлано во время леченія. Но часто она продолжается всю жизнь и члены становятся совсѣмъ не гибкими и сведенными. Излеченіе самой ломоты подвержено многимъ затрудненіямъ, а потому его должно предоставить свѣдущему врачу. Гомеопатическія средства, которыя должно употребить, суть: *Nux vomica*, если больной убѣжденъ, что онъ привлекаетъ болѣзнь къ себѣ излишнимъ употребленіемъ крѣпкихъ напитковъ. Если существуетъ сильная лихорадка: то должно принимать нѣсколько присмовъ *Aconitum Napellus* и повторять ихъ, если лихорадка возвратится. Если пациенту тяжело всякое, даже легчайшее прикрѣпленіе и усиливается чувство боли: то полезна *Agnica montana*; если мѣста ломоты очень красны и обширны и причиняютъ сильнѣйшія боли отъ прикосновенія: то настоящіе средства будутъ *Belladonna* и *China*. *Ferrum aceticum* употребительно тогда, когда боли особенно усиливаются ночью и дѣлается большое безпокойство. При летучей ломотѣ, гдѣ боли переходятъ съ одного члена на другой, съ руки на ногу и на оборотъ, главнѣйшее средство есть *Pulsatilla*. При усиленіи болей отъ движенія употребительна *Bryonia alba*. Негибкость

членовъ и опухлость устраняются посредствомъ *Causticum* попеременно съ *Ledum*. Если боль уже застарѣла: то должно употребить *Spiritus sulphuratus*. Если ломота перейдетъ въ хирагрю, подагрю, гонагрю (въ ломоту рукъ, ногъ, колѣна): тогда должно употребить продолжительное леченіе, особенно посредствомъ *Sulphur*, и все таки должно его предоставить опытному врачу. Что страждущій ломотою во время своей болѣзни долженъ держать строжайшую діету и оберегать и хранить себя отъ всякой простуды, и долженъ содержать ноги всегда въ теплѣ, что и послѣ удаленія его болѣзни долженъ дѣлать тоже самое, если не хочетъ возвращенія прежняго зла — всякому читателю становится весьма очевиднымъ. Весьма полезно рекомендовать такимъ больнымъ носки шерстяные или связанные изъ собачей, пуделевой шерсти.

Такъ какъ водѣ очень свойственно, или по крайней мѣрѣ болѣе другихъ средствъ свойственно выгонять дурные и испорченные соки и оживлять и укрѣплять кожу: то и слѣдуетъ ее употреблять противъ лома и ревматизма, даже противъ подагры, гонагры и хирагры и съ большимъ успѣхомъ она употребляется тамъ и сямъ. Люди, которые не любятъ холодной воды и не пьютъ ее и не хотятъ допустить къ тѣлу, которые лучше пьютъ водку, ликеры, мартовскія пива, крѣпкія вина, ужаснутся, услышавъ при припадкахъ ломоты о леченіи водою и возстанутъ противъ него всѣми силами. Но ихъ мнѣнію она причинитъ имъ смерть и лучше они позволяютъ себѣ каждый день пускать кровь, прикладывать пластыри, натирать спиртами и мучить себя цѣлыми недѣли и мѣсяцы, нежели выпьютъ стаканъ воды, или выкупаются. Впрочемъ какъ имъ угодно.



Ганъ (Hahn) говорить: что касается до ломоты, то вода содержитъ всѣ необходимыя свойства, которыя потребны для излеченія этой болѣзни, при которой преимущественно выдѣляется вязкая, острая и склеивающая мокрота въ сочлененіяхъ и ихъ связкахъ и сосудахъ, и которая производитъ опухоль и неподвижность страдающаго члена; холодная вода можетъ разложить всякаго рода вязкія матеріи, сдѣлать слабыми острые соки, проникать глубоко подъ кожу, уничтожать засоренія, опухоль и онѣмѣніе и исправить естественныя отдѣленія. Уже Гиппократъ говорить: холодная вода при частомъ обливаніи уменьшаетъ опухоли и боли даже при ломотѣ. Многие люди вѣрятъ и утверждаютъ въ этой вѣрѣ самыми врачами, что вода должна усиливать ломотную боль посредствомъ своего холода и своей влажности, но они не сообразятъ, что они именно необыкновенно согрѣваются и оживляются холодною водою по причинѣ ея дѣйствія. Сколько ломотныхъ больныхъ было основательно вылечено въ водолечебныхъ заведеніяхъ! Сколько подагриковъ, которые по цѣлымъ годамъ, при употребленіи дорогихъ медикаментовъ, не могли получить облегченія и уменьшенія чрезвычайно жестокой боли, освободились отъ нея посредствомъ холодныхъ ваннъ, мытья водою и питья холодной воды въ большемъ количествѣ! Итакъ спросите объ этомъ, непріатели и ненавистники воды, и множество примѣровъ, которые вамъ будутъ представлены, убѣдятъ васъ въ противномъ и научатъ полезному. Но какъ же должно употреблять воду при этой боли, если она должна уничтожить скоро болѣзнь? Слѣдующимъ образомъ. Если пациентъ еще не привыкъ къ холодной водѣ: то онъ долженъ пить при строгой діетѣ (ежедневно

только нѣсколько черствыхъ крупчатыхъ хлѣбцевъ и легкаго телячьяго супа) отъ 5—6 стакановъ воды и продолжать такъ до 10 стакановъ и болѣе. Это внутреннее употребленіе холодной воды изгонитъ нечистоты изъ тѣла чрезъ мочу. Лечение ломоты употребленіемъ холодной воды снаружи должно быть производимо лишь подъ непосредственнымъ наблюденіемъ врача. Если больной нѣсколько привыкъ переносить такимъ образомъ холодную воду: то онъ долженъ быть положенъ нагой на соломенную постель, послѣ того какъ питье холодной воды привело его нѣсколько въ испарину, и долженъ быть обливаемъ изъ лейки самою холодною колодезною водою съ головы до ногъ, потомъ поскорѣ завернуть въ шерстяное одѣяло и не осушившись положить въ постель. Чрезъ полчаса должно сдѣлать съ нимъ тоже самое и чрезъ столько же времени еще въ третій разъ, а вода никогда не должна быть осушиваема, и больной всякій разъ долженъ быть завертываемъ въ шерстяное одѣяло. За тѣмъ больной еще остается въ постели, выпиваетъ нѣсколько стакановъ воды, пока выступитъ совершенный потъ, который и не заставитъ себя долго ждать. Люди, которые отчасти уже привыкли къ холодной водѣ, могутъ тотчасъ приступитъ къ полному леченію — поливанію на соломенномъ ложѣ; этимъ они сократятъ себѣ дни страданія; при этомъ полиѣе леченіе и полезнѣе при самомъ началѣ. Если же на первой или второй день не произойдетъ полного уничтоженія зла: то на 3 и 4-й день должно поступать такъ же, пока вся ломотная матерія выйдетъ изъ тѣла. Если это сдѣлается, то выздоровѣвшій долженъ ежедневно дѣлать холодную ванну и пить много воды, дабы не наступилъ возвратъ болѣзни. Что больные

ломотою такимъ образомъ возвращаютъ здоровье и не отстанутъ опять отъ воды, это вѣрно. Если можно имѣть рѣчныя или даже морскія купанья, тѣмъ лучше. Если ты свободенъ отъ всякихъ безпокойныхъ гостей и всякой тѣлесной болѣзни, если хочешь на все время своей земной жизни, которую пошлетъ тебѣ Богъ, быть свободнымъ отъ всякой болѣзни и возвратиться къ жизни здоровой и крѣпкой и къ ея занятіямъ и радостямъ: вода, все вода, и тогда уже въ твоёмъ тѣлѣ ни гдѣ не будетъ и малѣйшаго уголка, гдѣ могла бы войти и задержаться вредная или болѣзненная матерія.

### ЗУДЪ ВЪ ЗАДНЕМЪ ПРОХОДѢ.

(См. Геморрой).

### ПАРША.

Она болѣе противна и гадка, нежели опасна, хотя при небреженіи можетъ сдѣлаться злокачественною и упорною. Она болѣе бываетъ у дѣтей, нежели у взрослыхъ, именно у такихъ дѣтей, которыя съ самаго нѣжнаго возраста были кормимы кушавьями, въ которыхъ были кислоты и остроты, которыя препятствуютъ пищеваренію; или если дѣти были содержимы своими родителями или воспитателями неопратно: также золотушныя дѣти легко подвергаются шелудивости. На волосахъ головы образуется множество маленькихъ нарывчиковъ, которые очень сильно зудятъ, все болѣе и болѣе распространяются, сливаются вмѣстѣ, выдѣляютъ густую

бѣловатую влагу, которая, отвердѣвая, образуетъ толстую корку. Изъ-подъ этой корки, при слабомъ давленіи, изъ маленькаго отверстія, вытекаетъ отвратительная зловонная мокрота и образуетъ новыя корки. Вши подъ ней и въ ней находятъ превосходное и соотвѣтственное жилище, и размножаются сотнями и тысячами. Волоса выпадаютъ, и такое бѣдное изуродованное дитя для всякаго другаго человѣка есть созданіе достойное жалости, но въ тоже время и зрѣлище противное и возбуждающее отвращеніе. Глаза и уши поражены, а шейныя, затылочные железы распухаютъ. Лучшее лекарство здѣсь есть опрятность. Прежде всего должно обрѣзать слѣпленные волосы, стараться по возможности истребить вредное насѣкомое посредствомъ снѣжанія и вытаскиванія его въ день отъ 3—4 раза, потомъ взять немного прѣснаго коровьяго масла или свѣжей сметаны и обмазать шелудивыя мѣста такъ, чтобы они размякли, а потомъ снять ихъ, но не вдругъ и не насильно, а постепенно съ помощію маленькихъ ножницъ, отрѣзая волосы, которые крѣпко держатъ шолуди. Въ тоже время слѣдуетъ собрать тряпочкою мокроту, вытекающую тамъ и сямъ, и удалить ее такимъ образомъ, чтобы она не давала способу къ образованію новыхъ струнцевъ. Дѣтей должно ежедневно выводить на свѣжій, чистый воздухъ съ непокрытою головою и давать только такую пищу, которая не содержитъ ни какихъ кислотъ, остроты или неудобоваримыхъ соковъ. При этомъ должно пить много воды. Гомеопатическія средства, которыя слѣдуетъ давать дитяти суть, прежде всего Sulphur въ нѣсколькихъ приемахъ, потомъ по прошествіи 3—4 дней послѣ послѣдняго приема Rhus toxicodendron. При сильныхъ и развѣдающихъ нарывахъ Arsenicum

album, а при противномъ запахѣ вытекающей изъ нихъ мокротѣ Staphysagria подастъ наибольшую помощь. Если поражены глаза, шейныя и заглоточныя железы: то должно дать нѣсколько приѣмовъ Нерар Sulphuris.

И при этой болѣзни холодная вода употребляется съ пользою, однако при надлежащей осторожности. Прежде всего не должно дитяти давать никакого другаго напитка кромѣ одной колодезной воды, мыть все его тѣло ею же, смачивать голову или по крайней мѣрѣ мѣста, гдѣ сидятъ корки, льняною тряпочкою, обмакнутою въ холодную воду, чѣмъ препятствуется заеканіе волосъ, размягчается шолудь; должно чесать волосы щеткою, обмакнутою также въ холодную воду, но щеткою не слишкомъ мягкою, чрезъ что начесывается все болѣе и болѣе коросты и въ тоже время вычесывается множество насѣкомыхъ. Вновь выстунающая гнилая матерія должна быть снимаема прикладываніемъ сухой тряпочки, съ чистою холодною водою; діета и чистый воздухъ сами собою разумѣются. При этомъ я хотѣлъ бы еще убѣдить родителей, что вообще дѣтямъ вредно носить слишкомъ теплыя шапки, и необходимо должно чаще подвергать голову дѣйствию свѣжаго воздуха, потому что это дѣйствуетъ на нихъ чрезвычайно выгодно, предотвращаются многія болѣзни и способствуетъ сильному росту волосъ. Но только не слѣдуетъ бояться, чтобы свѣжій воздухъ могъ причинять головѣ вредъ; даже дождь и снѣгъ не повредятъ, но напротивъ того, крѣпятъ здоровье, потому что она укрѣпляютъ головныя, лицевыя и слуховыя нервы.

### ГРИППЪ.

Эта болѣзнь, называемая также инфлюэнца, есть въ сущности не что иное, какъ сильная катарральная простудная лихорадка, которая однако тѣмъ болѣе отклоняется отъ оной, чѣмъ болѣе оставляютъ ее безъ вниманія и въ небреженіи, и чѣмъ болѣе она можетъ развиваться. Она начинается какъ и простудная лихорадка, холодомъ и дрожью. Въ дальнѣйшемъ теченіи болѣзни на больныхъ нападаетъ поразительная вялость и тягость въ членахъ, къ чему присоединяется сильная головная боль въ позвоночникѣ, въ груди и шеѣ, съ кашлемъ. Вместе съ тѣмъ дѣлаются и другіе припадки, какъ то: совершенный недостатокъ аппетита, головная боль, также поносъ и колюще въ бокахъ. Многіе люди для излеченія этой болѣзни не требуютъ ничего болѣе, кромѣ строгой діеты и хорошей испарины въ постели; послѣдняя въ большей части случаевъ удаляетъ всѣ боли и припадки въ членахъ, въ позвоночникѣ и груди; но другіе подвергаются ей въ сильнѣйшей степени и болѣе страдаютъ, даже очень мучаются отъ ея жестокости, особенно грудью. Здѣсь содѣйствіе гомеопатическаго врача необходимо, чтобы не воспослѣдовало припадковъ опасныхъ для жизни. Если произошло сильное пораженіе грудныхъ органовъ и ясно видно воспаленіе: то должно давать 2—3 приѣма Aconitum Napellus въ промежутки отъ 2—3 часовъ; если врачъ еще не былъ призванъ, послѣ этого средства Nux vomica. Если больной сталъ страдать постояннымъ и сухимъ кашлемъ,



то ему должно дать 2—3 приема *Mercurius solubilis*, а если это не поможет, то 1 прием *Phosphorus*. Если сбывается сильный озноб и дрожь: то подбывает *Rhus toxicodendron* и особенно *Bryonia alba*.

Скоро и навѣрно устраняють описанную болѣзнь посредствомъ холодной воды, главнаго врача всѣхъ болѣзней. Съ этою цѣлію должно пить столько свѣжей колодезной воды, сколько можно, мыть все тѣло, или мыть и тереть его мокрою щеткою, послѣ этого отдохнуть нѣсколько минутъ и потомъ гулять нѣсколько скорѣе обыкновеннаго на чистомъ воздухѣ при благоприятной погодѣ; при дурной погодѣ нужно прохаживаться въ большой комнатѣ, повторить вечеромъ купанье или холодное обмыванье, потомъ лечь въ постель, и вскорѣ послѣ того выступитъ желанный потъ, который, поддерживаемый постоянно въ теченіе ночи, принесетъ скорое выздоровленіе.

### ГЕМОРРОЙ, ЗУДЪ ВЪ ЗАДНЕМЪ ПРОХОДѢ.

Геморроидальная болѣзнь есть особенная болѣзнь, въ которой послѣ нѣкоторыхъ предшествовавшихъ припадковъ боли въ позвоночномъ столбѣ, въ груди и другихъ мѣстахъ, изъ прямой кишки вытекаетъ нѣсколько крови, послѣ отдѣленія которой исчезаютъ эти припадки и наступаетъ здоровое состояніе. Именно ради послѣдняго обстоятельства, то есть большаго или меньшаго\* отдѣленія крови и назы-

ваютъ болѣзнь геморроемъ, вытекающая кровь могла бы быть причиною другихъ опасныхъ болѣзней. Признаки, по которымъ можно узнать о наступленіи болѣзни, суть: боли въ крестцѣ, зудъ въ заднемъ проходѣ и образованіе шишекъ при отверстіи его, которыя причиняють часто невыносимый зудъ и боль. При отдѣленіи крови онѣ становятся менѣе и болятъ тише. Обыкновенно съ этимъ соединенъ запоръ и испражненіе совершается съ жгучею болью. Послѣ этихъ предвѣстниковъ открывается кровотеченіе изъ задняго прохода, болѣе или менѣе обильное. Открытый геморрой или текучій все-таки лучше, нежели закрытый, который причиняетъ тѣже боли, не доставляя облегченія чрезъ кровотеченіе, предполагая однако, что при первомъ кровотеченіи не слишкомъ сильно, иначе онъ легко бы могъ причинить вредъ больному. Пока геморрой остается въ назначенныхъ ему предѣлахъ, онъ не опасенъ. Хотя и обременителенъ и тягостенъ; если же онъ перейдетъ за предѣлы и перейдетъ на верхнія части тѣла, особенно въ грудь: то онъ можетъ быть очень опасенъ и причинить сильныя кровотеченія изъ носа или легкыхъ, кровохарканіе, кровавую рвоту, апоплексическій ударъ. Геморроемъ болѣе страдаютъ мужчины, нежели женщины, потому что послѣднія имѣютъ мѣсячное очищеніе; болѣе страдаютъ взрослые, нежели молодые. Хотя многіе находятъ эту болѣзнь спасительною и радуются своему открытому геморрою, но я не могу въ этомъ съ ними согласиться, потому что она есть болѣзнь и останется таковою; и всякій старается избавиться отъ болѣзни, какова бы она ни была и какъ бы не называлась; конечно, когда человекъ уже болѣнъ геморроемъ и геморрой сбывается открытымъ, то гораздо лучше, нежели если

онъ остается закрытымъ. Если кто нибудь очень сильно страдаетъ этою болью: тотъ долженъ препоручить себя заблаговременно искусному гомеопатическому врачу.

Если же онъ этого не хочетъ, или уже много разъ тщетно искалъ помощи въ аллопатическихъ средствахъ: то онъ сначала долженъ приняться за антипсорическое лечение и употреблять сначала и даже отъ 14 дней до 3 недѣль *Sulphur*, и именно чрезъ два дня по двѣ капли при определенной уже строгой діетѣ. Послѣ *Sulphur* онъ долженъ принимать *Carbo vegetabilis* и потомъ *Sepia* такимъ же порядкомъ. Если пациентъ прежде неумѣренно пилъ, и можетъ сказать, что излишнее употребленіе спиртныхъ напитковъ причинило ему страданіе это, то онъ долженъ принимать въ теченіи нѣкотораго времени чрезъ каждые 2 дня по 1 приему *Nux vomica* попеременно съ *Spiritus sulphuratus*. Если боль къ крестцѣ очень сильна и кровь течетъ не слабо, то *Belladonna*. При сильномъ жженіи и зудѣ въ заднемъ проходѣ, при частомъ побужденіи къ испражненію алой крови послѣ жесткаго испражненія *Sabina*. Если кровь идетъ и кромѣ времени испражненія; если испражненія очень затруднительны, и больной чувствуетъ ознобъ: то тогда настоящимъ средствомъ будетъ служить *Platina*. Если отдѣляющаяся кровь черновата, если отдѣляется болѣе желтая иѣва, задній проходъ кажется какъ будто раздвинутымъ и въ такомъ состояніи причиняетъ сильныя боли: то слѣдуетъ давать *Antimonium crudum*. Однако употребленіе того или другаго средства, смотря по являющимся симптомамъ, только тогда можетъ оказаться цѣлебнымъ, когда соблюдается діета, сообразная имъ. Всѣ острия, кислыя и запоръ дѣлающія ку-

шанья, всѣ горячительныя напитки, какъ бы они ни назывались, даже кофе и крѣпкій чай, должны быть оставлены; больной долженъ употреблять для удовлетворенія своей жажды только воду, для утоленія своего голода только легкія кушанья и доставлять себѣ сколь можно болѣе движенія на чистомъ воздухѣ. Онъ не долженъ спать на перинѣ, но на матрацѣ, и сидѣть на соломенныхъ стульяхъ. Въ половыхъ отправленияхъ онъ долженъ соблюдать большую умѣренность.

Дабы обезопасить себя отъ геморроя, а если онъ уже находится въ тѣлѣ, чтобы скорѣе его удалить изъ тѣла, и отвратить его появленіе навсегда, должно обратиться къ леченію водою. Кто ежедневно моетъ и третъ все тѣло и особенно, позвоночникъ беретъ ванны сидячія, пьетъ много воды, много ходитъ, умѣренно ѣстъ, по крайней мѣрѣ беретъ каждую недѣлю одну холодную ванну, и въ ней хорошенько третъ крестецъ и животъ губкою или щеткою хорошенько: тотъ можетъ быть увѣренъ, что его не тронетъ эта болѣзнь, или если онъ уже страдаетъ ею, то вскорѣ избавится. Если же онъ при этомъ будетъ добросовѣстно принимать предписанныя гомеопатическія средства, начнетъ съ *Sulphur*, употребитъ ее около 14 дней, возьметъ на такое же время *Carbo vegetabilis*, *Sepia*, потомъ *Acidum nitri*, а наконецъ *Antimonium crudum*, каждые по 14 дней и именно каждые 2 дня по 2, 3 капли, то онъ можетъ навѣрное считать, что его непріятель будетъ выбитъ съ поля сраженія. Послѣ этого онъ долженъ стараться продолжать діету и леченіе водою.

## ВОСПАЛЕНИЕ ПИЩЕПРИЕМНАГО ГОРЛА И ГЛОТКИ.

Это есть преимущественно и главнымъ образомъ воспаленное состояніе внутреннихъ частей глотки и прилежащихъ частей, или органовъ глотанія; это воспаленіе не сопровождается лихорадочными припадками, органы глотанія кажутся набухшими и сильно красными, глотаніе и дыханіе соединены съ большою или меньшею болью. Поражены бываютъ то глотка, то зѣвъ, то мягкое небо, то корень языка, то миндалинныя железы, иногда же всѣ упомянутыя части обнаруживаютъ воспаленное состояніе. Главное средство, которое и должно быть употреблено вначалѣ, есть *Aconitum Napellus* чрезъ каждые 2 часа по двѣ капли и около 3 приѣмовъ. Если воспаленіе очень сильно и остро: то приѣмы должны слѣдовать скорѣе другъ за другомъ. Потомъ должно давать каждый часъ по 1 приѣму *Belladonna*, и главнѣйшее тамъ, гдѣ лихорадка сильна и краснота шеи очень явственна, также когда присоединяются судорожныя припадки шеи и прилежащихъ частей. Если же краснота очень темна, и въ горлѣ собирается слизь: то должно давать чрезъ 4 часа по 1 приѣму *Mercur. solub.* — При лихорадочныхъ припадкахъ употребительно нѣсколько приѣмовъ *Arsenicum album*. Если языкъ очень сильно обложенъ желтымъ веществомъ, если больного мучаетъ боль во рту, если онъ при этомъ имѣетъ сильную жажду:

то *Chamomilla* будетъ прилична. При чувствѣ столбія куска въ горлѣ должно давать *Hepar Sulphuris*, также полезна *Ignatia amara*. Если къ этому присоединятся катарральныя припадки, если у больного грудная боль и сухой кашель, то *Nux vomica* принесетъ помощь и именно каждый разъ утромъ и вечеромъ по одному приѣму. Если лихорадка очень сильна вечеромъ; если кожа на ощупь горяча и суха; если кровь сильно приливаетъ къ головѣ, если глотаніе очень затруднено: то должно давать для устраненія ея нѣсколько приѣмовъ *Rhus toxicodendron*, давъ предварительно предъ этимъ нѣсколько приѣмовъ *Aconitum Napellus*. Если же различныя средства, смотря по различнымъ симптомамъ, не будутъ дѣйствительны, и по этому слѣдуетъ заключить, что въ числѣ причинъ, произволящихъ воспаленіе, господствуетъ хроническое; то должно употреблять нѣкоторое время *Sulphur* попеременно съ *Serpi*; кроме того можно указать на *Calcarea carbonica*, *Ferrum metallicum*, *Platina* и *Plumbum metallicum*, какъ на очень цѣлительныя при хроническихъ воспаленіяхъ горла.

Если страждущій такимъ воспаленіемъ горла будетъ еще брать на помощь холодную воду: то тѣмъ скорѣе онъ избавится отъ своей боли, когда 2 вооруженные непріятеля дѣйствуютъ противъ одного и оба необыкновенно помогаютъ себѣ взаимно и подкрѣпляютъ другъ друга. Съ этою цѣлію больной долженъ полоскать горло неоднократно въ теченіи дня свѣжею водою изъ колодца, пить много воды и мыть и тереть щеткою все тѣло съ тѣмъ, чтобы дурныя соки, расположившіеся около шеи и въ горлѣ, разошлись равномерно по всему тѣлу; послѣ совершенія этого дѣйствія должно мыть шею холод-



ною какъ ледъ водою, тереть ее щеткою съ водою и обернуть мокрую шею шерстянымъ одѣяломъ и остаться съ нимъ въ комнатѣ. Предъ сномъ должно тереть тѣло еще разъ холодною водою, тереть шею щеткою, положить потомъ холодный компрессъ изъ воды вокругъ нея, сверхъ того положить шерстяное одѣяло, принять 1 приемъ *Vergonia*, выпивъ предъ этимъ нѣсколько стакановъ чистой колодезной воды и потомъ лечь въ постель, и вскорѣ послѣ того послѣдуетъ сильный потъ, который, если поддержать какъ слѣдуетъ, скоро отстранитъ боль.

### БОЛИ ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ.

Боли при мочеиспусканіи не суть первичныя страданія, но вторичныя, т. е. не суть первоначальныя болѣзни, но обуславливаются другими болѣзнями, преимущественно почек и мочевого пузыря, а потому и являются только какъ симптомы болѣзненнаго состоянія, находящагося въ тѣхъ частяхъ тѣла. Болѣзни мочеиспусканія показываются или когда вообще не отдѣляется мочи, или слишкомъ мало, или же когда слишкомъ много моча отдѣляется, или она вытекаетъ не произвольно изъ мочевого канала. Такъ какъ я объяснилъ, что этимъ припадкамъ есть другая скрытая причина, то въ высшей степени необходимо леченіе ихъ поручить опытному врачу, такъ какъ глазъ врача всегда видитъ глубже, нежели глазъ простолюдина и особенно пристрастный глазъ самого пациента. Если же моча отдѣляется въ маломъ количествѣ, или вообще не отдѣляется: то должно давать сперва *Belladonna*, потомъ *Opium*,

*Cantharides*, *Hyoscyamus*, *Colchicum autumnale*, послѣднее средство только тогда, когда предыдущія остались безъ дѣйствія. Если при этомъ моча окрашена темно краснымъ цвѣтомъ: то должно давать *Aconitum Napellus* отъ 1—2 приемовъ и потомъ *Pulsatilla*. Если и при этомъ соединено жженіе и боль въ мочевомъ каналѣ: то слѣдуетъ рекомендовать *Acidum phosphoricum*, *Cannabis* и особенно *Staphysagria*. Если боль рѣжущая, какъ будто моча проходитъ чрезъ рану, то *Arnica montana* и *Cantharides*, а если она колющая, то *China* и *Suprum*. Если моча отдѣляется слишкомъ много и идетъ произвольно, тогда должно употребить *Belladonna*, попеременно съ *Pulsatilla*, также *Cocculus* и *Thuja* попеременно, когда по отдѣленіи мочи все еще каплетъ. Если съ мочею идетъ и кровь: то слѣдуетъ давать *Cantharides* и *Opium* или *Mercurius solubilis* попеременно съ *Mezereum*.

Должно при употребленіи назначенныхъ средствъ прибѣгнуть еще къ употребленію холодной воды, и удивительно скоро боль уничтожится. Больной долженъ мыть по нѣскольку разъ въ день, купать особенно тѣ части, изъ которыхъ вытекаетъ моча, также класть колодезные компрессы на нихъ, пить много холодной воды, дѣлать много движеній на воздухѣ, воздерживаться отъ всякихъ горячительныхъ напитковъ, и кислыхъ кушаній и особенно нѣкоторое время отъ совокупленія, и опять тѣло возвратится въ прежнее нормальное состояніе.

## ЧЕСЪ, ЗУДЪ ВЪ КОЖЬ.

Это не есть особенно тяжелая болѣзнь, но очень неприя́тная, почему и очень понятно нетерпѣливое желаніе больного, какъ можно скорѣе отъ нея избавиться. По болышой части это есть побочный симптомъ другой болѣзни въ тѣлѣ, знакъ остроты, находящейся въ тѣлѣ, противъ которой Sulphur есть самое приличное средство. Въ кожѣ образуются маленькіе, часто едва замѣтные, мягкіе и гладкіе прыщики, которые причиняютъ это тягостное и болѣзненное чувство. Sulphur, употребляемое въ теченіи долгаго времени, есть главное средство. Mercurius vivus и Pulsatilla, Ignatia amara и Rhus toxicodendron суть также средства противъ нея. Но и Sulphur одна будетъ уже достаточна, если въ тоже время при ней будетъ употреблена холодная вода. Вода, когда её пить много, растворяетъ всѣ остроты крови и легко удаляетъ ихъ. Должно въ тоже время мыть тѣло ежедневно. Острыхъ кушаньевъ и горячительныхъ напитковъ слѣдуетъ избѣгать.

## ОХРИПЛОСТЬ.

Охриплость, также катарръ (насморкъ, простудная лихорадка, кашель) состоитъ въ болѣе или менѣе сильномъ воспаленіи слизистыхъ перепонокъ носа, глотки и дыхательнаго горла. Она сама по себѣ не опасна, и проходитъ у многихъ людей безъ леченія.

Охриплость случается тогда, когда слизистыя оболочки дыхательнаго горла воспалены и части, которыя тамъ находятся, небо и такъ называемый язычекъ принимаютъ ярко красный цвѣтъ. Опасность бываетъ тогда только, когда она часто возвращается, или когда продолжается слишкомъ долго и загрождаетъ выговоръ словъ. Chamomilla и Nux vomica суть главнѣйшія средства противъ нея. Если воспаление сильно и соединено съ вечернею лихорадкою: то тогда должно употреблять нѣсколько примесей Aconitum Napellus.

Если больной при дыханіи чувствуетъ кашель или нѣкоторую боль, какъ бы отъ раны въ горлѣ, также нѣсколько грудную боль и ознобъ, если его правъ очень измѣнился, если изъ носа течетъ много желтой, вонючей жидкости: то онъ найдетъ вѣрное средство противъ этого въ Pulsatilla; хорошо было бы давать Mercurius vivus попеременно съ нимъ. Sambucus nigra тамъ употребительно, гдѣ съ охрипlostію соединенъ глубокий сухой кашель и слѣдovалась жажда. Если болѣзнь продолжается очень долго, или она уже застарѣла: то съ пользою употребляется Carbo vegetabilis. Необыкновенно скоро, даже въ болышей части случаевъ, и также тамъ, гдѣ болѣзнь отчасти застарѣла, помогаетъ это средство, при одновременномъ употребленіи холодной воды. Должно прилежно полоскать горло, мыть шею по 3 или 4 раза въ день, дѣлать на ночь холодную примочку вокругъ шеи и класть вокругъ нея шерстяное одеяло.

## ОБЖОРСТВО.

Совершенно особенное болѣзненное состояніе, видъ болѣзни, которое тотчасъ проходитъ, какъ

скоро кусокъ хлѣба или другой пищи будетъ данъ и съѣденъ. Обжорство обнаруживается нѣкоторымъ противнымъ чувствомъ, изжогою, слабостію, которая поражаетъ все тѣло, дрожаніемъ членовъ, часто холоднымъ потомъ на лбу и рукахъ, искрами предъ глазами, а въ иныхъ случаяхъ даже обморокомъ. Слабость желудка, испорченность его есть основаніе этой болѣзни. Нервы желудка болѣзненно поражены, желудочный сокъ слишкомъ остръ, ѣдокъ и испраженія густы; чтобы обезопасить себя на будущее время отъ этого и отвратить это, должно нѣкоторое время принимать *Nux vomica* попеременно съ *Pulsatilla* и вкушать легко-варимую пищу, пить достаточное количество воды холодной, тереть желудокъ хорошенько кругообразно шерстяною тканію, обмакнутою въ холодную воду, и дѣлать много движенія на свѣжемъ воздухѣ.

### БІЕНІЕ СЕРДЦА.

Трепетаніе сердца, также біеніе сердца при своемъ началѣ не столько опасная болѣзнь, сколько пугающая, отравляющая всю пріятную жизненную дѣятельность, и получила названіе, какъ видно изъ самаго слова, отъ сильнато біенія и трепетанія сердца о стѣнки грудной полости. Часто оно бываетъ такъ сильно, что его можно слышать за 2—4 шага, и видѣть сквозь самое платье. Оно можетъ имѣть различныя причины. Иногда оно случается послѣ слишкомъ сильнаго движенія, какъ послѣ танцевъ, отъ быстрого вхожденія и схожденія съ лѣстницъ, отъ слишкомъ изобильнаго обѣда, особен-

но трудно-варимыхъ кушаній и послѣ крѣпкихъ напитковъ. Смотря по причинамъ, производящимъ его должно избирать облегчающее средство. Біеніе сердца послѣ быстрого движенія обыкновенно проходитъ само собою, когда тѣлу данъ будетъ необходимый покой и отдохновеніе. Если виною тому сильныя душевныя волненія: то слѣдуетъ давать при досадѣ *Chamomilla*, при испугѣ *Opium*, при страхѣ *Veratrum album*, при большой радости *Coffea cruda*. При переполненія желудка трудно варимыми кушаніями должно давать *Veratrum* попеременно съ *Opium* или *Nux vomica*; а послѣ горячительныхъ и крѣпкихъ напитковъ *Nux vomica*. Если больной полнокровенъ: то помогаетъ *Aconitum Napellus* и потомъ *Belladonna* въ повторныхъ приемахъ. Также особы слабонервныя бываютъ мучимы этою болѣзнію, особенно женскій полъ, имъ полезна *Pulsatilla*. Послѣ большой слабости, часто причиненной болѣзнію, которая очень истощаетъ тѣлесныя силы, послѣ сильной потери соковъ и крови, при трепетаніи сердца съ большою пользою употребляется *China*. Если причиною была вогнатыя внутрь, чесотка, или подобная тому сыпь, то должно давать въ теченіи 14 дней каждыя 2 дня по вечерамъ часа чрезъ 3—4 послѣ обѣда по одному приему *Sulphur*. Особы, постоянно страждущія отъ этой болѣзни, должны скорѣе искать помощи врача, дабы не образовалась неизлечимая болѣзнь сердца. Однако во всякомъ случаѣ принимая, смотря по причинамъ боли, назначенное средство, должно пить много холодной воды, мыть все тѣло каждый день холодною водою и какъ только обстоятельства вамъ нѣсколько позволяютъ должны рано утромъ, предъ обѣдомъ и вечеромъ дѣлать моціонъ на воздухѣ, и



чѣмъ болѣе, тѣмъ полезнѣе будетъ и болѣе будетъ содѣйствовать къ удаленію болѣзни. При этомъ въ пищу употреблять только такія кушанья, которыя хотя и питательны, но способствуютъ легкому испражненію; пить одну только воду, оставивъ всѣ спиртные напитки и на нѣкоторое время кофе и крѣпкій чай.

### ГОРЯЧКА ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ.

Эта горячка поражаетъ только молодыхъ и полнотелыхъ особъ и именно большею частію послѣ обильнаго употребленія спиртныхъ напитковъ въ сильную стужу зимою, или при сухомъ вѣтрѣ, часто также послѣ простуды; она обнаруживается сначала лѣнью, слабостію, не расположеніемъ къ работѣ и нѣдѣ и сильнымъ ознобомъ и холодомъ, а по прошествіи почти одного часа жгучимъ жаромъ, который распространяется по всему тѣлу. При надлежащемъ леченіи она совершенно безопасна; часто сама природа открываетъ ей благополучный исходъ посредствомъ кровотеченія изъ носа и сильнаго отдѣленія пота. Въ сильнѣйшей степени болѣзни, когда глаза на выкатѣ и горятъ, а лице принимаетъ темно-красный цвѣтъ, очень желательно, чтобы натура сама приготовила этотъ выходъ. Если этого не будетъ: то должно давать по 2 приѣма *Aconitum Napellus* въ промежутки каждой четверти часа. Если сонъ безпокоенъ, если наступитъ лихорадочный бредъ: то противъ этого помогаетъ *Belladonna*. Больному для питья должно давать холодной воды столько, сколько онъ въ состояніи выпить и поло-

жить ему холодную примочку на голову; также слѣдуетъ ему поставить нѣсколько клистировъ изъ холодной воды. Должно призвать на совѣтъ врача; если не смотря на всѣ употребленныя средства болѣзнь будетъ возрастать: лучше всего и вѣрнѣе и дѣйствительнѣе для совершеннаго уничтоженія болѣзни было бы, если употреблять холодныя примочки. Конечно одна уже мысль объ этомъ обдала бы какъ льдомъ лежащаго въ лихорадочномъ жару, и озабоченныхъ окружающихъ его; а иной не могъ бы защитить себя отъ идеи, что это должно тотчасъ смертельно дѣйствовать на пациента. Совсѣмъ нѣтъ. Надо только знать какъ дѣлать. Принеси ведро холодной воды, заставь больного держать въ ней сначала пальцы, потомъ руки, потомъ всю руку и если онъ такимъ образомъ по большей части прохладенъ: то онъ можетъ смѣло предпринять обмываніе всего тѣла. Не должно его осушать, но обливши его холодною водою, положить въ шерстяное одѣяло, закутать въ него, и потомъ положить въ постель. Должно дать ему отъ 1—2 приѣмовъ *Вгуоніа*, а послѣ этого средства и холоднаго обмыванія, послѣ завернутія въ шерстяное одѣяло вскорѣ сдѣлается потъ, который приведетъ болѣзнь къ окончанію.

### МОЗОЛИ.

Вслѣдствіе слишкомъ узкой обуви, сапоговъ и башмаковъ при дальнемъ путешествіи, особенно въ жаркіе дни образуются то по сторонамъ маленькаго пальца, то на самомъ пальцѣ, или между самыми пальцами или даже подъ ними жесткія мозолистыя

бородавки или паросты, которыя причиняютъ тѣмъ, кто ими пораженъ, необыкновенно сильныя боли, и составляютъ важное препятствіе для дальнѣйшаго странствія. Чтобы въ скоромъ времени избавиться отъ нихъ, должно сдѣлать ножную ванну на  $\frac{1}{4}$  часа изъ воды, золы и нѣскольکو соли, чтобы ноги и преимущественно мозоли сдѣлались гибкими и мягкими и осторожно срѣзать острымъ ножомъ жесткую мозолистую кожу; которая образовалась, углубить конецъ ножа на столько, чтобы не сдѣлать разрѣза до крови и въ мясистыхъ частяхъ, извлечь ихъ по возможности съ корнемъ, капнуть нѣсколько капель *Arnica montana* и надѣть просторные сапоги или башмаки. Внутрь можно принять 1 приемъ *Arnica* или *Nux vomica*, также *Rhus toxicodendron* и послѣднее попеременно съ *Bryonia*. Впрочемъ если причина исчезнетъ, то есть мозоли удалены, приложено стараніе о болѣе просторной обуви, тогда эти средства будутъ не нужны.

### ВОДОБОЯЗНЬ ОТЪ УКУШЕНІЯ БѢШЕНОЮ СОБАКОЮ.

Эта болѣзнь по причинѣ большой опасности своей, какъ для больного, такъ и для окружающихъ его, есть одна изъ сильнѣйшихъ болѣзней, и требуетъ, по причинѣ своей быстротечности, неотлагаемую помощь искуснаго врача. Она дѣлается у людей преимущественно вслѣдствіе укушенія, причиненнаго имъ бѣшеною собакою, или отъ прикосновенія къ частямъ человѣческаго тѣла слюны бѣшеной собаки,

все равно, сообщалась ли она непосредственно отъ собаки въ рапу или чрезъ перенесеніе и заразу посредствомъ платя или соломы или чего другаго, что содержало такую слюну. Если при самомъ началѣ, когда случилось укушеніе или зараза, можно тотчасъ сдѣлать прижиганіе раны посредствомъ красно-калильнаго жара или же сдѣлать, если можно, тотчасъ паровыя ванны: то этимъ можно отвратить дурныя послѣдствія, которыя сдѣлаются послѣ укушкѣ по прошествіи большаго или меньшаго промежутка времени, какъ то: бѣшенство, волобоязнь, сумасшествіе и ярость. Если сумасшествіе уже наступило: то трудно будетъ его остановить, и излечить больного. По этому я не долженъ здѣсь говорить пространнѣе о самой болѣзни и леченіи ея тѣми или другими средствами, потому что въ началѣ уже сказано, что тотъ, кто замѣтитъ симптомы этой болѣзни на себѣ или на окружающихъ или родныхъ, призоветъ какъ можно скорѣе врача и передастъ больного на его попеченіе. Все таки было бы не бесполезно упомянуть о симптомахъ собачьяго бѣшенства или водобоязни, дабы всякій, узнавъ ихъ опасность призывалъ врача. Симптомы же суть слѣдующіе: сначала больной впадаетъ въ тоску и безпокойство, глаза очень красны и очень чувствительны для лучей свѣта, лице дѣлается очень блѣднымъ, съ больнымъ дѣлается головокруженіе, его по временамъ рветъ желчными веществами. Къ этому присоединяется шумъ въ ушахъ. Онъ легко пугается, жалуется на оглушеніе и большой холодъ въ оконечностяхъ; дѣлаются колики, судороги въ лицѣ, сердце стучитъ сильно, голосъ дѣлается суровѣе, нежели обыкновенно. Тутъ онъ уже не можетъ пить и имѣетъ отвращеніе къ

водѣ, особенно ко всему блестящему, до того, что при одномъ видѣ ихъ онъ впадаетъ въ конвульсіи, ярость и бѣшенство. При этомъ укушенное мѣсто или рана болѣе и болѣе краснѣетъ, сначала будеть совсѣмъ красная, потомъ темнокрасная, потомъ синяя и горячая, распухаетъ, дѣлается парывъ и выдѣляется наконецъ черноватая вонючая жидкость. Боли отъ этой раны становятся сильнѣе и распространяются по всѣмъ направленіямъ тѣла. Гомеопатія полагаетъ имѣть въ *Belladonna* вѣрное отчасти предохранительное, отчасти цѣлительное средство противъ этой болѣзни; но я сомнѣваюсь, чтобы оно одно могло поборотъ водобоязнь; также *Hyoscyamus*, а при совершенно развившейся водобоязни, *Lachesis* считаются вѣрными средствами. Это очень возможно и очень желательно; но я никому не присовѣтовалъ бы полагаться на дѣйствительность только этихъ средствъ, но еще разъ присовѣтовалъ бы поискать во время врача. Такъ какъ я неоднократно повторялъ о необходимости врачебнаго пособія при этой болѣзни: то я удерживаюсь отъ похвалъ холодной водѣ, хотя это могло бы быть и было бы отличнымъ средствомъ въ этомъ случаѣ. Въ Россіи преимущественно употреблялось и теперь употребляется погруженіе больного въ холодную, какъ ледъ, воду, въ пруды и даже въ колодцы съ самымъ блестящимъ успѣхомъ въ припадкахъ бѣшенства.

### КАШЕЛЬ.

Кашель есть явленіе, слишкомъ часто встрѣчаемое, и при правильномъ надзорѣ проходящее такъ скоро

и безопасно, что мы не имѣли бы надобности упоминать что нибудь о его леченіи, если бы при самомъ началѣ на него не было по большей части слишкомъ мало обращено вниманія и имъ не слишкомъ пренебрегали и давали такимъ образомъ поводъ къ продолжительнымъ и опаснымъ болѣзнямъ. Онъ дѣлается болѣею частію въ слѣдствіе простуды послѣ предшествовавшаго разгоряченія и бываетъ, то сухой, то съ мокротой, смотря по тому, соединенъ ли онъ съ отхаркиваніемъ, или безъ онаго, грудной, или желудочный. Грудной кашель во всякомъ случаѣ хуже и опаснѣе желудочнаго и особенно тогда, когда слишкомъ долго продолжается, затрудняетъ разговоръ, или соединенъ съ колющемъ и сопровождается тупою болью въ груди. Здѣсь участіе врача въ высшей степени необходимо. Между тѣмъ какъ при грудномъ кашлѣ ощущается щекотаніе въ горлѣ, при желудочномъ кашлѣ щекотаніе, позывъ къ кашлю подъ ложечкою, съ нѣкоторою болью. При послѣднемъ обыкновенно пропадаетъ аппетитъ, желудокъ кажется наполненнымъ. Дѣти, которыя ходятъ въ холодную погоду въ слишкомъ легкомъ одѣяніи, или которыхъ питаютъ трудно варимою пищею, особенно страдаютъ кашлемъ. При кашлѣ, который соединенъ съ отхаркиваніемъ большаго или меньшаго количества слизи, опять слѣдуетъ различить: одна ли слизь откашливается или вязкая, сѣрая, зернистая или даже кровавый гной. Особенно опаснымъ оказывается тотъ кашель, который наступилъ въ слѣдствіе скрывшихся сыпей или чесотки.

Лучшее, что можетъ сдѣлать больной, есть: соблюдать строгую діету, избѣгать всѣхъ спиртныхъ напитковъ, слишкомъ сильныхъ движеній, — тан-



цевъ, оставить куреніе табаку, содержать ноги и животъ въ теплѣ. Если онъ это будетъ исполнять нѣкоторое время и добросовѣстно принимать предписанныя средства, смотря по различнымъ родамъ являющагося кашля: то онъ можетъ быть увѣренъ, что его боль пройдетъ въ короткое время совершенно. Гомеопатическія средства, которыя слѣдуетъ въ тоже время употреблять, суть слѣдующія: а) при сухомъ кашлѣ *Nux vomica*, а при большомъ жарѣ съ сухостию во рту *Chamomilla*; б) при кашлѣ съ мокротой: если откашливается мало и не окрашенной слизи, *Staphysagria* и *Pulsatilla*, а если выхаркивается вязкій, сѣрый, зернистый и кровавый гной, то *Arsenicum album*, *Arnica montana*, *Euphrasia officinalis*, *Silicea*, *Calcarea carbonica* и *Lachesis*; в) при грудномъ кашлѣ большая часть предыдущихъ средствъ, какъ то: *Arnica*, *Euphrasia*, *Silicea* и д) при желудочномъ кашлѣ *Nux vomica* попеременно съ *Ipecacuanha*. При судорожномъ кашлѣ полезно окажется *Belladonna* и особенно тамъ, гдѣ съ нимъ соединены стѣсненіе груди и приливъ крови. *Коклюшъ*, этотъ опасный кашель для дѣтей, излечивается преимущественно *Drosera*, какъ сказано будетъ объ этомъ въ особенномъ параграфѣ.

Однако всѣ эти средства не помогутъ, если при этомъ не будетъ соблюдаться соотвѣтственный образъ жизни или надлежащая діета.

### ИПОХОНДРІЯ.

Эта болѣзнь, свойственная мужескому роду, обнаруживается безпокойствомъ, мрачнымъ вообра-

женіемъ, иногда ненавистію къ жизни, иногда также боязливою заботливостію о сохраненіи жизни, болѣшю раздражительностію и имѣетъ источникомъ неправильныя отправленія органовъ нижней части живота. Это есть душевная болѣзнь, рѣже настоящая тѣлесная болѣзнь. Хотя она и не опасна, но всетаки вообще трудно излѣчима, и часто совершенное и дѣйствительное излеченіе этой болѣзни удавалось только посредствомъ совершеннаго измѣненія образа жизни больного, перемѣною мѣста жительства, ѣздомъ въ экипажахъ и верхомъ, когда этому предшествовало постоянное сидѣніе, путешествіемъ, посѣщеніемъ обществъ, которыхъ прежде избѣгалъ, чтеніемъ развеселяющихъ книгъ и многими другими. До какой степени можетъ усиливаться ипохондрія, видно изъ многихъ примѣровъ, гдѣ такіе страдальцы сами прекращали свое существованіе, чтобы избѣжать этой жизни со множествомъ воображаемыхъ страданій; а другіе отказывали себѣ въ самыхъ необходимыхъ жизненныхъ потребностяхъ, въ малѣйшихъ удовольствіяхъ, даже оставляли желаемую прогулку, боясь принять въ первомъ случаѣ ядъ внутрь тѣла, а во второмъ услышать что нибудь не пріятное и въ третьемъ—подвергать свою жизнь какой либо возможной опасности. Болѣзнь принимаетъ тысячи разнообразныхъ формъ въ различныхъ особахъ, но въ большей части всегда замѣтна въ высшей степени угрюмость и тревожное воображеніе, тоска, біеніе сердца, слабый пульсъ, частый переходъ изъ холода въ жаръ, безпокойный сонъ, головокруженіе и склонность къ обморокамъ, которые наступаютъ внезапно послѣ всякаго небольшого усилія, послѣ всякой болѣе обильной пищи, чѣмъ та, къ которой привыкли. Къ этой болѣзни особенно распо-

жены такіе мужчины, которые слишкомъ много предавались любви и сильно расточали свои соки, или же принуждены были совершенно подавлять природныя побужденія; или были къ этому вынуждены; тѣ которые употребляли много напитковъ теплыхъ, спиртныхъ и расслабляющихъ желудокъ, обречены были на жизнь сидячую, дѣлали мало движенія на свѣжемъ и чистомъ воздухѣ; тѣ, которые живутъ въ нездоровыхъ и сырыхъ жилищахъ и съ малаго возраста были питаемы тяжелыми и неудобоваримыми кушаньями и многими другими. Также страданіе отъ глистовъ легко вызываетъ эту болѣзнь. Я повторяю еще разъ уже сказанное здѣсь, что лучшее лекарство противъ нея есть и должно быть совершенная перемѣна образа жизни.

Смотря по тому, причинена ли эта болѣзнь тѣмъ или другимъ обстоятельствомъ, слѣдуетъ противъ нея употребить и гомеопатическое средство. Въ этой болѣзни вообще очень полезна *Valeriana*. Если болѣзнь произошла отъ слишкомъ обильной и питательной пищи и спиртныхъ напитковъ: то *Nux vomica*, *Carbo vegetabilis*, *Silicea* и *Zincum* будутъ самыми лучшими лекарствами. Послѣ большой потери соковъ, особенно въ слѣдствіе чрезмѣрной плотской любви, также онаніи въ особенности совѣтуется *China*, а за тѣмъ *Coffea cruda*, предполагая, что больной прежде не употреблялъ слишкомъ много кофе; также *Ignatia amara* и *Staphysagria*. Если болѣзнь находится глубже и не будетъ уступать даваемымъ средствамъ: то потребно болѣе продолжительное и даже антипсорическое леченіе, и съ этою цѣлію больной долженъ въ теченіи 14 дней принимать чрезъ каждые 2 дни по двѣ капли *Sulphur*, потомъ столько же *Acidum nitri*, а потомъ *Serpia*

Пнохондрикамъ было бы особенно полезно, если бы они при употребленіи сказанныхъ средствъ и при соблюденіи строгой діеты довѣрились водѣ и ея цѣлительнымъ силамъ. Сначала должно пить каждое утро, въ полдень и вечеромъ только по 1 стакану воды и прибавлять ежедневно по одному; мыть сначала все тѣло 1 разъ въ недѣлю, а потомъ каждый день самую холодную водою, купаться въ ней и тереть мѣстность желудка и нижней части живота хорошенько губкою или щеткою кругообразно, тереть сильно позвоночный столбъ и потомъ ходить въ полѣ часовъ около двухъ до утомленія и скоро пройдутъ мрачныя мысли, которыя тѣснились въ его головѣ, съ одной стороны его покинетъ ненависть къ жизни; съ другой же робкая заботливость о своей жизни, головокруженіе и обмороки болѣе его не будутъ посѣщать, испраженія облегчатся, и спокойный и глубокий сонъ укрѣпитъ его. Какъ много такихъ больныхъ, которые не могли быть вымечены самымъ дорогимъ лекарствомъ, нашли въ водѣ помощь и полюбили жизнь столько же, сколько прежде смотрѣли на нее враждебно и угрюмо. Слѣдуетъ только усердно пить воду, мыться и купаться, дѣлать сильное движеніе и злой врагъ обратится въ бѣгство. Всѣ старые холостяки обыкновенно страдаютъ этою болѣзнію. Одинъ изъ моихъ друзей, старый чудакъ и холостякъ, долго сопротивлявшійся моему совѣту обратиться къ леченію водою, наконецъ далъ себя уговорить, потому что болѣзнь его дѣлалась съ каждымъ днемъ все сильнѣе, взялся за бутылку съ водою, погрузилъ свои члены въ водяныя струи, и болѣзнь въ короткое время уменьшилась. По моему совѣту, онъ вступилъ въ бракъ, хотя и послѣ долгаго мѣшканія; и

еще не прошло 4-хъ недѣль, какъ онъ сталъ по-сѣщать общество и сдѣлался совершенно другимъ человекомъ, полнымъ наслажденія и любви къ жизни.

### ИСТЕРИКА.

По справедливости можно бы сказать, что истерика у женщинъ есть тоже, что ипохондрія у мужчинъ; но она бываетъ между ними только у молодыхъ женщинъ, зрѣлыхъ дѣвицъ, молодыхъ вдовъ и т. д. Также и здѣсь нельзя назначить положительныхъ и опредѣленныхъ формъ болѣзни; здѣсь также симптомами этой болѣзни являются: большая чувствительность и раздражительность, боль въ головѣ, головокруженіе, склонность къ обморокамъ, при недостаткѣ аппетита, давленіи въ желудкѣ, вѣтры, запоръ, нервныя болѣзни, которыя обнаруживаются, то тамъ, то сямъ. Тѣже средства могли бы и здѣсь быть употреблены, которыя были приведены въ предыдущей статьѣ (Ипохондрія). Перемена образа жизни и строгая діета, много движенія, путешествія въ дальнія страны, посѣщеніе веселыхъ обществъ, питье холодной воды и купанье будутъ самыми цѣлительными средствами. Съ вступленіемъ въ бракъ обыкновенно проходитъ эта болѣзнь и молодыя женщины, которыя подвергались ей уже въ замужествѣ, избавлялись отъ нея во время родовъ. *Valeriana*, *Nux. vomica* и *Carbo vegetabilis* лучшія гомеопатическія средства, которыя могутъ быть употребляемы противъ нея.

### КОКЛЮШЪ.

Этотъ въ высочайшей степени замѣчательный, прилипчивый, опасный кашель происходитъ отъ спазмъ въ дыхательныхъ органахъ, произходящихъ отъ грудныхъ нервовъ. Слѣдовательно этотъ кашель есть чисто спазмодическій и развивается болѣею частію изъ катаррального или простуднаго состоянія дыхательныхъ вѣтвей; бываетъ исключительно въ дѣтскомъ возрастѣ и однажды въ жизни. Коклюшъ обнаруживается продолжительнымъ, звучнымъ, часто повторяемымъ вдыханіемъ, перемежающимся краткимъ выдыханіемъ и кончается обыкновенно рвотою. При этомъ спазмодически сжаты: гортанное отверстіе и дыхательное горло и поднятая вверхъ глотка производятъ то, что голосъ похожъ на свистящій, дребезжащій крикъ осла. Ему предшествуютъ тоска, безпокойство, боязнь, сильное хрипѣніе мокроты въ дыхательномъ горлѣ, чиханіе, щекотаніе въ глоткѣ, боль въ затылкѣ, зѣвота и т. п. Начинается кашель: тогда все тѣло сильно напрягается, дитя закидываетъ голову назадъ, нѣсколько наклоняетъ ее впередъ, ищетъ кругомъ себя руками, за что бы ему ухватиться покрѣче. Долго продолжающійся кашель при медленномъ вдыханіи воздуха, такъ поражаетъ ребенка, что лице и губы распухаютъ, и сначала покрываются ярко краснымъ цвѣтомъ, потомъ темно краснымъ, потомъ темнымъ, такъ что глаза закатываются и сильно наполняются слезами; артеріи сильно бьются и изъ носу, глазъ, ушей и рта показывается кровь. При этомъ конечности холодѣютъ. Коклюшъ, т. е. каждый его припадокъ, продол-



жается нѣсколько минутъ, но повторяется нѣсколько разъ въ день. Чиханіемъ, или отхаркиваніемъ клейкой мокроты, или рвотою оканчивается обыкновенно припадокъ. Нѣкоторые дѣти лежатъ при этомъ, какъ при послѣднемъ издыханіи, съ открытымъ ртомъ и высунутымъ языкомъ. Однакожъ рѣдко слѣдуетъ смерть за этимъ припадкомъ. Большею частію и самыя сильныя припадки случаются утромъ. Постепенное ослабѣваніе этого мучительнаго кашля узнается по большому отдѣленію и отхаркиванію желтоватой и часто гноеватой мокроты. Самая болѣзнь продолжается отъ 14 дней до 16 недѣль и часто ведетъ за собою столь же опасныя для жизни болѣзни. Мое дитя получило коклюшъ на 7-мъ году; страдало 14 недѣль, потомъ подверглось воспаленію въ мозгу; по окончаніи же онаго нервической лихорадкѣ и наконецъ желудочной лихорадкѣ. Оно исхудало, какъ скелетъ. Одинъ искусный аллопатическій врачъ, который его пользовалъ, не смотря на свое искусство и любовь къ ребенку, не могъ предохранить его отъ этихъ отдѣльныхъ, одна за другою слѣдовавшихъ болѣзней. Три четверти года лежалъ ребенокъ въ постели и потомъ снова долженъ былъ учиться ходить. Гораздо скорѣе освободился бы онъ отъ своей болѣзни, если бы стали его пользоваться гомеопатически. Кто не хочетъ употреблять гомеопатическихъ средствъ, лучше слѣдуетъ, прелоставивъ болѣзнь самой себѣ и природѣ, заботясь только о томъ, чтобы ребенокъ не простудился, не подвергался бы слишкомъ быстрой перемѣнѣ температуры и сохранялъ строгую діету. Тотъ же, кто, сильно любя свое дитя, желаетъ скорѣе облегчить его страданіе, долженъ скорѣе браться за гомеопатическія средства. Drosera, специфическое средство. Докторъ Герингъ

говоритъ, если я не ошибаюсь: безъ лекаря болѣзнь эта продолжается 3 раза 6 недѣль, при помощи врача аллопата тоже 18 недѣль, а при употребленіи гомеопатическихъ средствъ только 14 дней. Въ этомъ я самъ имѣлъ случай убѣдиться. Сынъ мой прибылъ изъ пансіона ко мнѣ до начала вакацій больнымъ и страждущимъ. По его кашлю я въ скоромъ времени убѣдился, что у него коклюшъ. Онъ страдалъ имъ почти въ продолженіи шести недѣль и былъ пользуетъ врачомъ того заведенія. Я далъ ему тотчасъ же вечеромъ предъ сномъ пріемъ Drosera, состоящій изъ 1 капли и продолжалъ это каждые два дня. По прошествіи 12-ти дней онъ былъ совершенно здоровъ и болѣзнь кончилась безъ дальнѣйшихъ послѣдствій. Другіе гомеопаты рекомендуютъ Veratrum album и Hepar Sulphuris, послѣднее особенно при удушѣ и слезливости дитяти. По опыту я могу рекомендовать, какъ самое лучшее средство Drosera. Докторъ Герингъ въ сѣверной Америкѣ считалъ это средство лучшимъ въ этой болѣзни, когда онъ съ такою увѣренностію отзывался о немъ. Единоновременное употребленіе холодной воды чрезвычайно способствуетъ вѣрному дѣйствію этого средства. Даютъ ребенку пить ее столько, сколько онъ можетъ, моютъ его ежедневно въ холодной водѣ, особенно шею и грудь, и кладутъ потомъ въ шерстяномъ одѣялѣ въ постель, чтобы онъ хорошенько вспотѣлъ.

#### ГОРЯЧКА ПОСЛѢРодовая, РОДИЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА.

Иногда случается послѣ родовъ, въ слѣдствіе легкой простуды, или отъ горя и досады, или отъ употреб-

лєвія пици и напитковъ несоотвѣтствовавшихъ еще состоянію роженицы, или въ слѣдствіе тяжелыхъ родовъ, лихорадка, такъ называемая ролильная лихорадка, которая бываетъ не безъ опасности, потому что въ этомъ состояніи всякая малѣйшая другая болѣзнь можетъ сдѣлаться опасною. Лихорадка съ сильнымъ, сухимъ жаромъ, сильною жаждою желаніемъ прохладительныхъ напитковъ, горячимъ, краснымъ лицомъ, короткимъ дыханіемъ, надутымъ животомъ, въ которомъ при самомъ легкомъ давленіи, чувствуется сильная боль, и рѣзью впизу живота. Не остановившееся еще такъ называемое послѣродовое очищеніе, выходитъ весьма въ маломъ количествѣ и сильно пахнетъ. Здѣсь главное средство есть *Asconitum*; потомъ даютъ при продолжающейся, лихорадкѣ *Belladonna* и накопецъ *Вгуоніа*. Если боли во внутренности усилятся, дѣлаются спазмодическими, всѣ внутренности какъ бы выдавливаются, выпираются къ дѣтороднымъ частямъ, если показывается сильный холодъ, за нимъ сильный жаръ, особенно въ головѣ, при жестокой, нестерпимой головной боли; если глотаніе при питьѣ затрудняется и обнаруживаются спазмы въ горлѣ, сонъ въ высшей степени не покоенъ и показываются признаки бреда; если послѣродовое очищеніе водянисто и слизисто и притомъ оно сильно вонюче: то даютъ по одному приему *Belladonna* чрезъ каждые полчаса, а въ случаѣ если это средство не поможетъ: *Нугсуапис*. Если будетъ замѣченъ переносъ молока на тазовыя органы, причемъ груди пустѣютъ и худѣютъ, и если вслѣдъ за тѣмъ слѣдуютъ бѣловатые испражнения: то для выздоровленія достаточно *Снотомилла* въ нѣсколько разъ повторенныхъ приемахъ. Это средство также употребляется и въ томъ слу-

чаѣ, когда болѣзнь произошла въ слѣдствіе досады или гнѣва; а если отъ простуды, то *Dulcamara* и *Вгуоніа*. Если очень болитъ голова, если въ ней стучить и сверлить, сдѣлается головокруженіе, потемнѣніе въ глазахъ, въ ушахъ звонъ и обмороки: то даютъ *Nux vomica*.

Впрочемъ, такъ какъ здѣсь предстоитъ большая опасность, увеличивающаяся при промедленіи, то должно какъ можно скорѣе пригласить на помощь искуснаго врача, который можетъ слѣдить и управлять ходомъ болѣзни. Я не стану хвалить въ этой болѣзни холодной воды, потому что еще не имѣю опытности въ этомъ случаѣ.

#### КОЛИКА, РѢЗЪ ВЪ ЖИВОТѢ.

Колика, сильная и чрезвычайно болѣзненная рѣзъ въ животѣ, соединенная или съ сильнымъ поносомъ, или съ сильнымъ запоромъ, случается обыкновенно въ слѣдствіе погрѣшностей въ діетѣ при разстроенномъ и ослабленномъ безъ того желудкѣ, или отъ простуды послѣ разгоряченія; часто колики сопровождаютъ сильные геморройдалыя недуги у мужчинъ и не правильныя регулы у женщинъ. Глисты также могутъ возбудить эти страданія, ядовитыя вещества, попавшія въ желудокъ, также производятъ сильнѣйшія и болѣзненныя колики, которыя, при недостаткѣ скорѣйшей помощи, кончаются смертію. По этому коликѣ даются и различныя названія смотря по возбуждавшей ее причинѣ. Колики бываютъ: отъ геморроя, отъ вѣтровъ, простуды, глистовъ, желчи, свинцевыхъ и многія другія. Большею частію колика есть сопро-

возжающій симптомъ другой болѣзни; иногда же она бываетъ самостоятельною болѣзнію. Лечение этой болѣзни зависитъ отъ самыхъ причинъ ее произведшихъ. Если причиною были испорченный желудокъ, *отягощеніе желудка*, грубая погрѣшность въ діетѣ, если животъ при томъ болѣзненно вздувается, бываетъ тошнота, рвота, поносъ, зелено-вато-желтыя испражненія, съ сильною болью въ животѣ, головная боль, чрезмѣрная блѣдность лица и т. п.: то дается 3—4 приема *Arsenicum*, чрезъ каждые полчаса, и потомъ рѣже нѣсколько приемовъ *Pulsatilla*. Если же напротивъ, отъ той же причины, бываетъ сильный запоръ, если боль тянущая, щиплющая, сдавливающая, если животъ сильно надутъ, дыханіе стѣсняется, конечности холодѣютъ, головная боль: то дается попеременно *Arsenicum album* и *Nux vomica*, а если не послѣдуетъ испражненія: то *Opium*, а въ самыхъ упорныхъ случаяхъ *Plumbum metallicum*. Если же колика произошла *въ слѣдствіе простуды*, остановившейся испарины, простуды ногъ, или, можетъ быть, отъ непосредственной простуды желудка и нижней части живота, если чувствуется боль около пупка, если больной жалуются на нестерпимую боль въ поясницѣ, если обнаруживается позывъ на рвоту, если испражненія зелено-водянисты: тогда даютъ приемъ *Aconitum*, потомъ *Chamomilla*, также полезна и *Bryonia*. *Геморроидальная колика*, обнаруживающаяся преимущественно чувствомъ полноты въ животѣ, скопленіемъ вѣтровъ, вздутіемъ живота, безпокойствомъ, тоскливостію, надутыми жилами, біеніемъ сердца и бессонницею:—устраивается нѣсколькими приемами *Pulsatilla*. Если боль находится преимущественно въ мочевомъ пузырьѣ, если при сильномъ безпокойствѣ сдѣлается,

затрудненіе при моченспусканіи, тогда даютъ *Nux vomica*. Это же самое средство употребляется въ томъ случаѣ, когда женщины, во время регулъ, чувствуетъ колики и при томъ, ощущаютъ сверлящую боль въ нижней части живота, лобковая кость будто разбита, а въ мѣстности мочевого пузыря нестерпимая боль. *Coffea cruda* было бы преимущественно самымъ цѣлительнымъ средствомъ, если бы кофе не былъ самымъ любимымъ, ежедневнымъ напиткомъ женщинъ, и если бы онъ употребляли его не столь крѣпкій, какъ обыкновенно. Здѣсь также съ особенною пользою употребляется *Pulsatilla*. *Глистныя колики*, характеризующіяся преимущественно сильною сверлящею болью живота, зудомъ въ горлѣ, отрыжкою, икотю, иногда чувствомъ, сильного голода и скопленіемъ слюны во рту уничтожаются посредствомъ *China*. Такъ называемыя *свинцевыя колики* преимущественно встрѣчаются у горныхъ работниковъ и у людей, которые занимаются обработкою ядовитыхъ красокъ и минераловъ, и у людей, употребляющихъ кислые и острые кушанія и напитки, сохранявшіеся въ оловянныхъ и дурно вымуженныхъ сосудахъ. Главные признаки суть слѣдующіе: стягивающая боль въ нижней части живота, втягиваніе внутрь пупка и прямой кишки, рвота зеленою желчью, частая отрыжка, стѣсненіе въ груди, испражненія сѣраго цвѣта, твердыя, сильный и полный пульсъ, противно-сладкій вкусъ во рту, съ сильною жаждою и затрудненнымъ моченспусканіемъ. Лучшее средство противъ нея это часто повторяемыя приемы *Opium*; если это средство не поможетъ: то употребляютъ *Belladonna*, *Plumbum metallicum*, въ самыхъ же упорныхъ случаяхъ *Platina*. — Лучшую услугу оказываетъ и здѣсь вода, ко-



торая отчасти уничтожаетъ воспаленіе, и разводитъ и извергаетъ остроту, производящую колики. Каждый день утромъ, въ полдень и вечеромъ надобно пить свѣжую, холодную воду, мыть ею все тѣло, прикладывать на весь животъ компрессы, намоченные холодною водою; сильно растирать поясницу сверху внизъ, дѣлать при томъ много движенія на чистомъ воздухѣ и наблюдать діету, и болѣзнь не только уничтожается, но даже не возвращается.

### ГОЛОВНАЯ БОЛЬ.

Вообще головная боль есть совмѣстное страданіе, т. е. она является, какъ признакъ другой какой нибудь, находящейся въ организмѣ болѣзни. А потому главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобъ найти первоначальную причину болѣзни, потому что съ удаленіемъ оной тотчасъ же уничтожается и головная боль. Причины головной боли могутъ быть весьма различны: разстроенный желудокъ, запоръ, прекратившійся потъ, въ слѣдствіе ночныхъ занятій, или ночныхъ пирушекъ, отъ чрезмѣрнаго употребленія спиртныхъ напитковъ, насморкъ, сильныя душевныя движенія. Съ ними сообразуется и леченіе. Такъ какъ обыкновенно дѣлается приливъ крови къ головѣ, щеки багровѣютъ, лобъ горитъ, жилы на головѣ напрягаются, то полезно будетъ давать одинъ или два приема *Aconitum Napellus*. Часто уже этого одного средства бываетъ достаточно, чтобы прекратить боль. *Nux vomica* необходимо въ томъ случаѣ, когда головная боль есть слѣдствіе употребленія спиртныхъ напитковъ, или ночныхъ пи-

рушекъ. *Arsenicum album* употребляется при головной боли, соединенной, съ насморкомъ, при сухомъ жарѣ въ носу, слезотеченіи изъ глазъ, чиханіи и кашлѣ. Если причиною былъ остановившійся потъ, при этомъ лице опухло, глаза мутны, лобъ горячій, чувствуется покалываніе и дерганіе въ вискахъ: то главное средство есть *Chamomilla*. Головная боль отъ запора пользуется посредствомъ *Nux vomica*. Если при этомъ бываетъ головокруженіе, то даютъ *Bryonia alba*. *Pulsatilla* уничтожаетъ головную боль женщинъ и дѣвицъ, во время мѣсячныхъ очищеній.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что головная боль, какія бы ни были причины оной скоро и вѣрно можетъ быть удалена леченіемъ холодною водою наружно и внутренно. Она быстро охлаждаетъ жаръ въ крови, разрѣшаетъ все остроты, удаляетъ изъ желудка все обременяющія вещества и чудеснымъ образомъ укрѣпляетъ ослабѣвшія силы и нервы. Должно пить много воды, обмывать ею все тѣло, или купаться, погружая потомъ голову въ холодную воду и боль скоро пройдетъ. Къ этому присоединяютъ выше упомянутыя средства. При особенно же сильныхъ боляхъ, которыя не могутъ быть облегчены посредствомъ *Aconitum Napellus*, сдѣлать два-три приема *Belladonna*. Слабонервные и очень раздражительныя особы, особенно женщины, чаще всего страдаютъ головою болью. Имъ мы ничего не можемъ посоветовать, кромѣ воды для ежедневнаго употребленія, въ питьѣ, купаньѣ. Въ самое короткое время онѣ освободятся отъ этого недуга, а продолжая подобное леченіе могутъ положительно надѣяться, на совершенное выздоровленіе.

## СПАЗМЫ.

Когда мышцы, или мышечныя части болѣзненно сокращаются и дѣлается опухоль и затвердѣніе сжавшихся частей съ значительной болью, то это называется спазмами. Иногда они поражаютъ одну какую либо часть тѣла, иногда же и все тѣло. По этому бываютъ: спазмы желудочныя, грудныя, челюстныя, въ икрахъ, столбнякъ и т. п. Спазмы въ груди и въ желудкѣ соединены съ ужасными страданіями; спазмы челюстей, особенно у малыхъ дѣтей, кромѣ болѣзненнаго состоянія, въ высшей степени для нихъ опасны, а столбнякъ легко можетъ окончиться смертію. При леченіи этой болѣзни прежде всего надобно обращать вниманіе на причины, ея произведшія, и какъ скоро онѣ могутъ быть найдены, то излеченіе этого недуга не соединено съ большимъ затрудненіемъ. Если человекъ внезапно и сильно взволнованъ и если сильная досада была причиною этой болѣзни: то употребляется *Chamomilla*; если сильный страхъ то *Orium*; если то и другое дѣйствовало вмѣстѣ на человека: то употребляется *Aconitum Napellus*. Особенное вниманіе должно обращать на то, чтобы ни одно изъ этихъ средствъ не употреблялось въ продолженіи самыхъ спазмъ, но тотчасъ по окончаніи перваго припадка. Если только отдѣльныя мышцы поражены спазмами и если одержимый ими въ испугѣ вскакиваетъ и по всему тѣлу распространяется жаръ, который вдругъ показывается и тотчасъ же исчезаетъ, то съ большею пользою употребляется *Ignatia amara*.

Иногда съ ними бываютъ соединены рвота и поносъ, или тошнота, въ такомъ случаѣ употребляется *Ipecacuanha*.

Спазмами поражаются женщины, до правильнаго наступанія у нихъ мѣсячнаго очищенія, которыя обнаруживаются сильными судорожными сжатіями въ нижней части живота и часто доходятъ до такой степени, что по всему тѣлу выступаетъ холодный потъ и онѣ громко вскрикиваютъ. Если такія женщины не слишкомъ привыкли къ употребленію кофе: то 2—3 приѣма *Coffea cruda* достаточно, чтобы уничтожить спазмы. Но если онѣ привыкли употреблять его ежедневно, то *Coffea* уже не можетъ служить лѣкарствомъ, но *Pulsatilla*. Здѣсь также прилична *Ignatia amara*, когда наступитъ чрезмѣрная блѣдность лица, потемнѣніе въ глазахъ, или свѣтлобоязнь. Слабые и раздражительные также легко подвергаются спазмамъ при ознобѣ и дрожи, при чрезмѣрной усталости, зѣвотѣ и затрудненномъ дыханіи. Они могутъ нюхать часто камфору, отъ чего спазмы ослабѣютъ. Если чрезмѣрная потеря соковъ при сонитіи, онанизмѣ, или сильное кровотеченіе причиною спазмъ; въ такомъ случаѣ *China* составляетъ самое лучшее и укрѣпляющее средство. Однакожъ такіе люди на будущее время должны всячески избѣгать всякихъ излишествъ, если не хотятъ, чтобы спазмы повторялись съ большею силою и напряженіемъ. Спазмы для малыхъ дѣтей еще опаснѣе, нежели для взрослыхъ, и въ этомъ случаѣ, въ особенности, должно стараться о скорѣйшемъ призваніи на помощь врача гомеопата. У дѣтей бываютъ различныя спазмы. *Внутренній спазмъ*, при чемъ жизнь ребенка кажется угасла, и онъ лежитъ тогда безъ чувствъ и движенія; губы, глаза

и лице синѣютъ, глаза полуоткрыты и бѣлки закатываются вверхъ, временемъ по всему тѣлу, особенно по лицу и губамъ, пробѣгаетъ дрожь, ротъ искривляется, часто кажется, будто дитя улыбается. Носъ заостренъ, животъ, то сильно вздутъ, то снова опалъ. Послѣ этихъ внутреннихъ спазмъ, продолжавшихся нѣкоторое время, наступаютъ внезапныя движенія, дитя вертится, корчится, жалобно кричитъ, поднимаетъ ножки къ животу и въ высшей степени безпокоится. Вслѣдъ за тѣмъ слѣдуетъ поносъ или рвота. Здѣсь употребляется *Chamomilla*, *Ignatia amara*, *Belladonna*, *China* и *Stramonium*.

*Спазмы челюстей* несравненно опаснѣе; и большая часть дѣтей, подвергшихся этой болѣзни, дѣлаются жертвой этого пораженія. Вообще они только бываютъ у дѣтей до 14 дней, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываютъ и позднѣе. Спазмы челюстей представляютъ ужасное зрѣлище для окружающихъ. Первоначальные признаки этой болѣзни суть слѣдующіе: трудное сосаніе, синій кругъ около рта, внезапное отнятіе головы отъ груди, перемѣна цвѣта лица, сведеніе глазъ, или закатываніе ихъ вверхъ, тоскливое дыханіе, ускоренный пульсъ, уменьшеніе мочи, безпокойный сонъ, внезапное пробужденіе. Это суть предвѣстники; собственно же болѣзнь въ полномъ ея развитіи начинается въ нижней челюсти: или она плотно прижата къ верхней челюсти, или нѣсколько отстоитъ отъ нея, только такъ, что ротъ не можетъ раскрываться. Лице багрово-синее, глаза блестятъ и дѣлаются не подвижными, но зрачки расширены. Изъ глазъ часто течетъ гноевидная жидкость. Въ началѣ слабый, охриплый голосъ, подъ конецъ совершенно уничтожается.

Дыханіе тоскливое, часто прерывистое, животъ тугой и судорожно втянутый внутрь, оконечности конечностей, синѣютъ, холодѣютъ и даже распухаютъ, холодный потъ выступаетъ на всемъ тѣлѣ. Страданія обыкновенно кончаются задушеніемъ или параличемъ. Однако бываютъ случаи, что дитя переносило эти спазмы челюстей послѣ продолжительныхъ и жестокихъ страданій и выздоравливало. *Stramonium*, *Belladonna*, *Chamomilla*, *Hyoscyamus niger*, *Opium*, *Ignatia amara*, *Cicuta virosa* и особенно *Angustura* составляютъ самыя лучшія лекарства. Но присутствіе врача здѣсь необходимо.

*Столбнякъ* есть спазмъ, обыкновенно поражающій все тѣло, такъ что оно остается безъ движенія и какъ будто окоченѣваетъ и теряетъ всякую чувствительность. Когда наступаетъ припадокъ то: сознаніе совершенно теряется и такъ скоро, что больной не успѣваетъ докончить начатаго слова. Лице дѣлается синеватымъ, обезображивается, глаза перекосятся или закатились къверху; сначала дыханіе дѣлается тоскливо, удушливо, потомъ едва замѣтно, пульсъ едва ощущаемъ. Въ жаркихъ и сырыхъ странахъ столбнякъ случается чаще, нежели у насъ и бываетъ или въ слѣдствіе раны или простуды. Онъ не долго продолжается, но излеченіе чрезвычайно трудно, потому что большею частію параличъ прекращаетъ жизнь больного. Дѣти рѣдко страдаютъ этою болѣзнію, также и мужчины, однѣ только женщины въ среднихъ лѣтахъ бываютъ ему подвержены. *Angustura*, *Belladonna*, *Camphora*, *Moschus*, *Platina*, *Secale cornutum* и *Stramonium* здѣсь употребительны.

Изъ многообразныхъ опытовъ надъ разнаго рода спазмами доказано, что холодная вода устраняла



спазмы; что даже въ самыхъ упорнѣйшихъ случаяхъ, гдѣ самыя сильныя лекарства не дѣйствовали, ванны изъ холодной воды при треніи членовъ одержимыхъ спазмами или тѣла, пораженнаго столбнякомъ и потомъ обвертываніе обмытаго тѣла въ шерстяное одѣяло, чтобы произвести испарину, изцѣляла спазмы. Такъ какъ уже случалось, что острый предметъ, вонзившійся въ ногу или въ пальцы, причинялъ спазмы, то естественно, что предметъ, бывшій причиною болѣзни: игла, стекло, черепокъ и т. п. долженъ быть прежде всего удаленъ и потомъ рану промыть холодною водою.

### ЧЕСОТКА.

Эта въ высшей степени тягостная, противная, отвратительная болѣзнь, состоитъ въ сыпи между пальцами, на сгибахъ и на кистяхъ рукъ; отсюда однакожь распространяется по всему тѣлу, особенно по мягкимъ его частямъ. Въ означенныхъ мѣстахъ показываются маленькіе пузырьки, которые, съ заключающеюся въ нихъ жидкостію, производятъ сильный зудъ и побуждаютъ къ чесанію и тренію этихъ частей, что и производитъ боль. Этотъ зудъ въ теплѣ и въ постели становится сильнѣе. Болѣзнь эта не опасна и при правильномъ леченіи и хорошей діетѣ проходитъ въ скоромъ времени; при запущеніи же, или, что еще хуже, при употребленіи мазей, для скорѣйшаго уничтоженія чесотки, можетъ броситься на внутренніе благородные органы груди и сдѣлаться чрезвычайно вредною по послѣдствіямъ; такъ что у различныхъ лицъ могутъ отъ

того произойти разныя болѣзни. Она принадлежитъ къ хроническимъ болѣзнямъ, и въ высочайшей степени заразительна. Должно, какъ можно чище содержать тѣло, перемѣнять бѣлье нѣсколько разъ въ день, пить болѣе холодной воды, мыть тѣло, или каждый день купаться, не ѣсть ничего жирнаго, кислаго, избѣгать спиртныхъ напитковъ, и ежедневно вечеромъ принимать одинъ приемъ Sulphur, и болѣзнь въ скоромъ времени прекратится и больной можетъ быть увѣренъ, что эта болѣзнь не поведетъ за собою ни какихъ другихъ болѣзней. Докторъ Гюнтеръ совѣтуетъ наружное употребленіе Kreamsol. слѣдующимъ образомъ: одну каплю онаго (0) размѣшать въ полубутылкѣ воды и этою водою сырыскивать кожу два раза въ день. Такъ какъ наружная чистота есть самое лучшее средство къ скорѣйшему уничтоженію этой тягостной и непріятной болѣзни; то очевидно, что мытье и купанье стоитъ на первомъ мѣстѣ леченія. Только это мытье и купанье должно производиться въ нѣсколько нагрѣтой комнатѣ, а послѣ этого предписывается сильное движеніе, чтобы снова согрѣться. А еще лучше послѣ ваннъ окутывать тѣло шерстянымъ одѣяломъ, если больной будетъ въ состояніи вынести зудъ, который усилится подъ одѣяломъ.

### РАКЪ, РАКОВОЕ ХУДОСОЧІЕ.

Ракъ есть болѣзнь, которая помѣщается въ железахъ тѣла, и бываетъ открытый или скрытый смотря потому, железистыя части сдѣлались ли изъязвленными, или только послѣ затвердѣнія размягчились. Ракъ есть въ высшей степени вредный и опасный

гость, если только можно его такъ назвать, и при томъ мало того, что онъ ослабляетъ всѣ силы и уничтожаетъ жизненные соки, но, и отнявши все это, разрушаетъ потомъ совершенно организмъ. Страданія производимыя ракомъ, довольно значительны; легко истекающая кровь изъ варывовъ, испускаетъ жидкій зловонный гной. Но этихъ нарывахъ образуются губчатые наросты съ твердыми возвышенными краями. Болѣзнь эта слишкомъ трудно излечивается, и потому тотчасъ же при ея открытіи, должно прибѣгать къ врачу. Между гомеопатическими средствами главныя суть: *Arsenicum album*, *Lachesis* и *Sulphur*. Между различными видами рака, на носу, губахъ, грудяхъ, послѣдній есть самый дурной и опаснѣйшій. Что касается до дѣйствія воды при леченіи рака, то докторъ Ганъ говоритъ: раковидныя образования, которыя лучше всего ни чѣмъ не лечить, не обыкновенно легко переносятъ холодную воду, которая ихъ освѣжаетъ, умѣряетъ ихъ разѣдающую остроту и все очищаетъ. Мнѣ извѣстно, что у нѣкоторыхъ и самыя легкія, невинныя и въ подобныхъ случаяхъ превосходныя средства оказывались острыми и причиняли боль, а холодная вода приносила болшее облегченіе и даже совершенное изцѣленіе.

### БОЛЬ ВЪ ПОЯСНИЦѢ.

Эта болѣзнь слишкомъ извѣстна. Очень мало людей, которые бы ею не были мучимы. Самое здоровое сословіе, сословіе поселянъ, страдаетъ ею въ слѣдствіе поднятія тяжестей. Тѣже, которые принуждены

вести спячую жизнь или тѣ, которые живутъ распутно, или употребляютъ много спиртныхъ напитковъ, страдаютъ ею болѣе всѣхъ. Также ей очень подвержены геморроидалисты. Смотра по причинѣ, отъ которой она происходитъ, должно прискивать для ея излеченія и гомеопатическія средства. Если болѣзнь происходитъ отъ поднятія или отъ ношенія тяжестей, или отъ ушиба, толчка или паденія на спину, лучше всего помогаетъ здѣсь 2—3 приема *Arnica montana*, и наружное омываніе примочкою тоже изъ *Arnica* или *Rhus toxicodendron*. Послѣднее средство очень помогаетъ въ случаѣ вывиха. Боль въ поясницѣ въ слѣдствіе сладострастныхъ наслажденій, онанизма, устраняется при воздержаніи и хорошей діетѣ посредствомъ *China*. Если боль произошла отъ чрезмернаго употребленія спиртныхъ напитковъ, то *Nux vomica*. Геморроидальная поясничная боль тогда только уничтожится, когда самый геморрой будетъ излеченъ. О томъ см. статью Геморрой, стр. 154. Если же причину нельзя узнать и самому больному, то должно обратиться къ искусному врачу, который разспрося обо всемъ основательно, можетъ съ точностію опредѣлить мѣсто и причину болѣзни. При употребленіи выше сказанныхъ средствъ должно пить много холодной воды, воздерживаться отъ всякаго разврата, чаще и долѣе прогуливаться, мыть поленицу, растирать ее щеткою, омоченною въ холодной водѣ, брать поясныя ванны, и болѣзнь скоро исчезаетъ, даже и въ такомъ случаѣ, если причины ея происхожденія не извѣстны; потому что выпитая въ большемъ количествѣ вода проникаетъ до самаго очага болѣзни и затушитъ тамъ огонь, котораго жгучее пламя чувствуется въ поясницѣ.

## ЗОБЪ.

Зобъ есть опухоль на шеѣ въ сторонѣ щитовидной железы, или въ ближайшей къ ней клѣтчаткѣ. Онъ бываетъ преимущественно у такихъ людей, которые принуждены бываютъ поднимать тяжести, или носить ихъ, особенно въ гору; у дѣтей онъ легко дѣлается отъ крика. Но есть такія страны, гдѣ подъ вліяніемъ ихъ климата, образуется зобъ, какъ то у кретиновъ, живущихъ въ сырыхъ и узкихъ долинахъ. Также не чистая, смѣшенная съ известью вода легко производитъ эту болѣзнь. Мужчины меньше подвержены оной, чѣмъ женщины. Послѣднія при трудныхъ родахъ и сильныхъ при томъ натугахъ, въ особенности закидывая назадъ голову, что, какъ кажется, имъ придаетъ болѣе силы и приносить облегченіе, легко получаютъ зобъ. При самомъ началѣ его легко уничтожить, но чрезвычайно трудно, когда онъ устарѣетъ и сдѣлается такъ великъ и объемистъ, что затрудняетъ дыханіе. *Agnica montana* и *Vryonia* оказались иногда полезными. Въ послѣднее время докторъ Гюнтеръ излечилъ безчисленное множество зобовъ слѣдующими средствами: берется 3 части жженой грецкой губки, 2 части мелко истолченного леденцу и 1 часть не много поджаренной и обращенной въ порошокъ яичной скорлупы. Все это стирается въ мѣлкій порошокъ и при ущербѣ луны утромъ натошакъ и вечеромъ предъ сномъ принимать на кончикѣ ножа. Обыкновенно самый сильный зобъ уничтожается въ недѣлю; въ противномъ случаѣ повторить это опять спустя 4 недѣли.

Этого исполнѣ уже достаточно, чтобы излечить зобъ. И такъ можно испытать это средство; оно впрочемъ безвредно. Натираніе шеи теплымъ оливковымъ или миндальнымъ масломъ, также крѣпкое натираніе и мытье оной холодною водою, излечило многіе зобы: вода, содержащая въ себѣ известь, не должна быть употребляема людьми, чувствующими себя предрасположенными къ зобу, потому что известь расслабляетъ щитовидную железу, способствуетъ образованію зоба. У молодыхъ дѣвушекъ слабого тѣлосложенія, у коихъ во время регулъ легко образуется опухоль на щитовидной железнѣ, и которая во время разгоряченія, танцевъ, смѣха, пѣнія поддерживается и увеличивается, хорошо сдѣлаютъ, когда укрѣпленіемъ щитообразной железы посредствомъ холодныхъ компрессовъ предупредить образующійся или готовый образоваться зобъ и будутъ избѣгать вышеупомянутыхъ упражненій нѣкоторое время, или по крайней мѣрѣ во время регулъ.

## ПАРАЛИЧЬ.

Параличъ есть недѣятельность мускуловъ и нервовъ въ какомъ нибудь одномъ органѣ, или одномъ членѣ тѣла, или въ нѣсколькихъ органахъ, или членахъ вмѣстѣ, жизненность коихъ подавляется, или совершенно уничтожается. Эта болѣзнь подраздѣляется на параличъ одной половины тѣла, т. е, когда одна сторона тѣла бываетъ въ состояніи недѣятельности *Hemiplegia* и *Paraplegia*, когда все тѣло поражено бываетъ параличемъ, и наконецъ *Paresis* полупараличъ, когда одинъ органъ, хотя дѣлается



подѣлительнымъ, но все таки имѣетъ чувство. Обыкновенно верхнія и нижнія конечности тѣла подвергаются параличу. Когда параличъ поражаетъ непосредственно сердце, тогда слѣдуетъ мгновенно смерть. Если онъ поражаетъ нервы чувствъ, то всегда слѣдуетъ потеря ихъ. Большею частію параличъ поражаетъ вдругъ; но иногда бываютъ предшествующіе признаки, какъ то: тяжесть, холодъ, дрожь, онѣмѣніе тѣхъ членовъ, которые поражаются параличемъ. Причинами этой болѣзни служатъ: полнокровіе, чрезмѣрная потеря необходимыхъ для тѣла соковъ, развратъ, онанизмъ, потрясеніе мозга и стеноваго хребта, употребленіе въ пищу ядовитыхъ веществъ, паросты на костяхъ, пельство, сильный страхъ и досада, сильные поносы, недостатокъ въ пищѣ, слишкомъ внезапный переходъ отъ жара къ холоду и т. п. Излеченіе этой болѣзни подлежитъ чрезвычайнымъ трудностямъ, и если параличъ продолжался уже довольно долго, то исцѣленіе становится труднѣе, или потребуетъ много времени. Можно надѣяться на излеченіе, если въ пораженныхъ частяхъ ощущается зудъ, колотье. Врачебныя средства въ особенности суть: *Opium* и *Plumbum*, когда члены худѣютъ, въ нижней части живота есть боль въ родѣ колики, и склонность ко рвотѣ. При параличѣ только однихъ конечностей тѣла, безъ другихъ какихъ либо болѣзненныхъ измѣненій употребляется *Silicea*, *Cocculus* и *Zincum* попеременно при полупараличѣ. Если испражненіе и моча выходятъ непроизвольно, пульсъ слабѣетъ, сердце бьется сильнѣе, то употребляется *Natrum muriaticum*. Если чувство холода преобладаетъ и больной не можетъ уснуть отъ безпокойства, то употребляется *Bryonia*. Однакожъ необходимо при первыхъ признакахъ па-

ралича призвать къ постели больного искуснаго врача. Впрочемъ я думаю, что если можетъ быть подана скорая помощь больному, то единственно употребленіемъ холодной воды. Оживить такъ сказать мертвый и помертвѣвшій членъ можетъ только одна холодная вода. Должно раздѣть больного, класть его въ холодную ванну, сильно растираютъ щеткой пораженные члены, спускаютъ на него съ нѣкоторой высоты воду струею или по каплямъ, потомъ мокраго завернувъ въ шерстяное одѣло, укладываютъ въ постель, чтобы онъ вспотѣлъ и это леченіе повторяютъ 3 или 4 раза въ день и продолжаютъ ежедневно. Отъ этого средства, при обильномъ употребленіи воды внутрь, можно ожидать болѣе помощи, нежели отъ другаго какаго нибудь лекарства. Докторъ Ганъ, разсуждая объ этой болѣзни, говоритъ о водѣ: такъ какъ свѣжая, простая вода имѣетъ прохладяющую, восстанавливающую и выстѣ съ тѣмъ укрѣпляющую силу: такъ какъ она имѣетъ силу глубоко проникать въ тѣло чрезъ каналы въ самую кровь, имѣетъ силу приводить снова въ движеніе застоявшіеся соки, то можетъ быть мы съ помощію оной здѣсь скорѣй чего вибудъ достигнемъ, ежели только помощь можетъ быть еще подана. Средство это не есть ли въ тоже время гомеопатическое? пораженные параличемъ части холодны; пусть холодъ воды возвратитъ имъ теплоту!...

### ВОСПАЛЕНІЕ ПЕЧЕНИ.

Воспаленіе печени есть одна изъ опасныхъ болѣзней и требуетъ заблаговременно пособія врача,

Она узнается по сильной колючей, гнетущей боли въ правомъ боку, пониже малыхъ или ложныхъ реберъ, которая усиливается при малѣйшемъ прикосновеніи. Эта боль печени сообщается обыкновенно всему правому боку, такъ что онъ кажется совершенно онѣмѣвшимъ. Бѣлокъ глаза дѣлается желтымъ, такъ же языкъ и моча; испражненія затрудняются и въ нихъ показывается желчная матерія; сильная головная боль и жажда, тошнота и рвота при сильномъ чувствѣ тяжести въ желудкѣ. Болѣзнь эта по своей упорности, требуетъ довольно долгаго леченія. Главныя средства: *Chamomilla* въ часто повторяемыхъ пріемахъ; но такъ какъ при этомъ бываетъ воспаленіе, то хорошо прежде дать нѣсколько пріемовъ *Aconitum*. Если испражненія очень затрудняются и боль въ сторонѣ печени очень сильна, то употребляется *Nux vomica*. При наступающемъ ознобѣ, горькомъ вкусѣ, безпокойствѣ и желтомъ цвѣтѣ кожи употребляется: *Mercurius solubilis* и *Bryonia alba*. Если воспаленіе продолжается, кровь бросается въ голову и причиняетъ бредъ, то даютъ *Belladonna*. Эти средства очень полезны: но больной сдѣлается гораздо лучше, если съ самаго начала посоветуется съ врачомъ, потому что болѣзнь эта часто бываетъ довольно сложная.

И при воспаленіи печени холодная вода оказываетъ большую пользу: ея охлаждающія свойства умѣряютъ жаръ, уничтожаютъ воспаленіе; разрывающая сила очищаетъ кровь отъ постороннихъ ей желчныхъ веществъ, размягчаетъ запоръ и затвердѣвшую массу питательныхъ веществъ въ желудкѣ и кишечномъ каналѣ, изводитъ ихъ естественнымъ путемъ и укрѣпляетъ онѣмѣлый организмъ всего праваго бока. Однакожъ въ одинъ или въ два дня, даже

самое усердное употребленіе воды не можетъ уничтожить болѣзни; надобно употребить для этого гораздо болѣе времени. Надобно пить много и мыть правую сторону печени холодной водой; а при сильномъ воспаленіи, класть холодные компрессы, а равно и на близъ лежащія части праваго бока; когда воспаленіе прекратится, должно взять двѣ холодныя ванны; потомъ мокрому завернуться въ суконное одѣяло и лечь въ постель, чтобы вспотѣть. Это совершенно уничтожитъ остатки болѣзни; впрочемъ здѣсь необходимъ совѣтъ врача.

### ЗАТВЕРДѢНІЕ ПЕЧЕНИ.

Если воспаленіе печени было или пренебрежено или излечено не окончательно, то, какъ сдѣдствіе его, оказывается затвердѣніе. Его легко узнать по желтому цвѣту лица больного, въ особенности же по твердости стороны печени, по боли отъ давленія этого мѣста, по отягощенію желудка, при употребленіи, хотя незначительно тяжелыхъ кушаній, по постоянно затруднительному испражненію, и по упадку силъ и худобѣ всего тѣла. Часто печень увеличивается до значительной величины и притомъ также затвердѣваетъ, такъ что при ужасныхъ страданіяхъ и безконечной тоскѣ смерть неизбежна; здѣсь необходима помощь опытнаго врача. Строгая діета, пища удобоваримая, для питья чистая, свѣжая, ключевая вода и особенно прогулка на чистомъ воздухѣ; а еще лучше катанье въ экипажѣ или верхомъ, необходимы для уничтоженія этой болѣзни. Также сами больные должны всячески избѣгать досады

и огорченія, или окружающіе ихъ люди должны стараться удалить отъ нихъ все, что можетъ доставить имъ безпокойства или огорченія.

### ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХЪ.

Если ткань лёгкихъ, — состоящая изъ воздухоносныхъ сосудовъ, изъ развѣтвленія трубокъ дыхательныхъ вѣтвей, изъ мокротной оболочки и клѣтчатки отъ простуды, отъ холодного питья послѣ предшествовавшаго разгораченія, отъ сильнаго волненія, вдыханія нечистаго воздуха, поврежденій; сильнаго напряженія лёгкихъ въ танцахъ, бѣганьи, разговорахъ, или отъ ношенія тяжестей, особенно въ холодную сухую погоду, болѣзненно измѣнится и притомъ такимъ образомъ, что больной чувствуетъ боль въ груди, колотье въ груди послѣ сильнаго зноба, дыханіе стѣсняется, тоска и безпокойство, бѣненіе сердца, кашель, даже съ отхаркиваніемъ кровавой слизи, пульсъ твердый и скорый, запоръ, мочи чрезвычайно мало и притомъ она красновата, то это болѣзненное разстройство лёгкихъ называется *воспаленіемъ въ нихъ*. Аллопатическая школа приступаетъ сейчасъ же къ кровопусканію, банкамъ и пиявкамъ, и повторяетъ это до тѣхъ поръ, пока еще есть малѣйшее воспаленіе въ лёгкихъ. Сколько больныхъ легло чрезъ это въ могилу, или организмъ ихъ надолго былъ разстроенъ! Что же нужно дѣлать здѣсь въ особенности? Здѣсь дается отъ 2—3 приѣмовъ *Aconitum Napellus*. Если же нужно хоть сколько нибудь выпустить крови, то ставятъ нѣсколько пиявокъ къ тому мѣсту, гдѣ чувствуется

сильнѣйшая боль при глубокомъ вдыханіи, но общаго кровопусканія не должно быть. Если уже давали нѣсколько приѣмовъ *Aconitum Napellus* чрезъ часъ, то потомъ лучшее средство есть *Bryonia alba* въ промежуткахъ отъ 5—6 часовъ дать 3—4 приѣма. Обыкновенно, при подобномъ леченіи боль устраняется, не требуя другихъ средствъ. Воспаленіе лёгкихъ бываетъ различно; но не будемъ здѣсь приводить ихъ характеристическихъ признаковъ, потому что это такая болѣзнь, которой исцѣленіе нельзя предоставить самому больному или окружающимъ его, но непременно надобно призвать искушеннаго врача. Смотри по тому, будетъ ли это настоящее воспаленіе лёгкихъ, или только простой, но сильный катарръ лёгкихъ, первичское (собственно нервная лихорадка съ признаками воспаленія лёгкихъ) или хроническое, и леченіе различно; это можетъ узнать только практическій медикъ и найти къ тому спасительныя средства. На упомянутыя же выше средства и приведенный образъ леченія, указано только для того, чтобы тѣ, кои живутъ далеко отъ врача, могли бы ихъ употребить до прибытія его. Если же помогутъ, то тѣмъ и лучше.

### ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛУДКА.

Воспаленіе желудка въ высшей степени опасная и, по своему теченію, слишкомъ острая болѣзнь, и потому требуетъ скорѣйшей помощи врача. Больной чувствуетъ боль, ужасное колотье, которыя даже и послѣ болѣзненной рвоты не прекращаются, испражненія затруднены, конечности коченьютъ, очень сильный внутренній жаръ при лихорадкѣ и жгучей



жаждѣ. Пульсъ малъ и неровенъ; сильная тоска, увеличивающаяся еще болѣе отъ спазмъ въ глоткѣ. Внезапная простуда желудка прежде разгоряченнаго можетъ быть мороженымъ или очень прохладительнымъ напиткомъ; употребленіе лдовитыхъ веществъ, или проглатываніе острыхъ и колючихъ тѣлъ, которыя прободая стѣнки желудка, причиняютъ воспаленіе и многія другія не замѣчаемыя причины подаютъ поводъ этой опасной болѣзни.

Прежде всего даютъ 3—4 приѣма *Aconitum Napellus*, каждые полчаса, потомъ *Arsenicum album*, пока явится медикъ. Здѣсь-то вода производитъ лучшее и скорѣйшее дѣйствіе. Больной въ высшей степени жаждетъ прохладительнаго питья, дыханіе его горяче, и жаръ восходящій изъ желудка, какъ бы пламя, можно не иначе уничтожить какъ холодною водою. Давать больному какъ можно больше холодной воды и на горячія мѣста желудка класть сперва не такъ холодные компрессы, потомъ все холоднѣе и наконецъ съ толченнымъ льдомъ и снѣгомъ, если онъ есть и перемѣнять эти компрессы, какъ только они станутъ нагрѣваться. Это скоро уничтожитъ воспаленіе; остальное предоставить врачу.

### СПАЗМЫ ЖЕЛУДКА.

Не мало людей, которые въ наше время страдаютъ этой болѣзнію. Она все болѣе и болѣе будетъ распространяться, чѣмъ болѣе люди будутъ потворствовать жаждѣ наслажденій и оставлять естественной путь для удовлетворенія своихъ потребностей. Погрѣшности въ діетѣ, неумѣренность въ употребленіи

кофе, крѣпкаго чая, грога, пунша, грѣтаго вина, также излишнее употребленіе раздражающихъ и возбуждающихъ аппетитъ яствъ, простуда желудка, развратъ, онанизмъ, сифилитическія болѣзни и т. п. вызываютъ постепенно это чрезвычайно тягостное разстройство. Спазмы желудка сами по себѣ состоятъ въ болѣзненномъ сжатіи желудка, въ затрудненномъ дыханіи, частой и сильной отрыжкѣ, тошнотѣ и наконецъ рвотѣ острой, но совершенно прозрачной жидкости. Обыкновенно страдающіе этими спазмами, должны во время припадка нагибаться впередъ, чтобы свободнѣе дышать и получить нѣкоторое облегченіе. Спазмы продолжаются иногда четверть часа, полчаса, а иногда даже цѣлый часъ; прекращаются, но вдругъ снова возвращаются. Обыкновенно предшествуютъ имъ зѣвота и дрожь. Чрезвычайно много средствъ противъ этой болѣзни предлагаетъ старая школа, множество эликсировъ съ ихъ чудесными дѣйствіями прославляются въ Вѣдомостяхъ: конечно эти эликсиры суть сильно дѣйствующія лекарства, но не для того, чтобы помочь противъ желудочныхъ спазмовъ, или чтобы укрѣпить желудокъ, а на оборотъ, чтобы еще болѣе возбудить его и тѣмъ самымъ ослабить, навсегда водворить боль въ желудкѣ. Также и другія хваленныя средства не приносятъ настоящей пользы.

Единственно только въ гомеопатіи въ соединеніи съ водолеченіемъ и строжайшей діетѣ должно искать и находить эту помощь. Кто отдается подъ покровительство этихъ трехъ средствъ, можетъ твердо надѣяться на основательное излеченіе своей болѣзни. Итакъ между гомеопатическими средствами противъ спазмъ желудка, если они произошли въ слѣдствіе излишняго употребленія спиртныхъ напитковъ, или

кофе — *Nux vomica*. Если же не поможет, то *Cocculus*. Если припадок послѣ употребленія этого средства пройдетъ, но чрезъ нѣсколько времени, иногда и чрезъ долгое время снова возвратится, то даютъ одинъ приемъ *Nux vomica* и отъ 2—3 приемовъ *Carbo vegetabilis*. Если болѣзнь произошла въ слѣдствіе досады и въ желудкѣ чувствуется тяжесть, какъ будто тамъ лежитъ камень, образуются вѣтры, дыханіе коротко, то даютъ *Chamomilla* попеременно съ *Belladonna*. Последнее особенно тогда, когда присоединяется сильная головная боль. *Ipecacuanha* употребляется при сильныхъ боляхъ въ желудкѣ и при тупомъ колотѣ подъ ложечкой, тошнотѣ и рвотѣ. Если же нѣтъ рвоты и притомъ запоръ и сильные вѣтры, и въ роту образуется много слюны, то даютъ *Cocculus*. Если же нѣтъ запора и испражненія жидки, если боли усиливаются послѣ каждого принятія пищи, даже самой легкой, если чувствуется бѣненіе подъ ложечкой, то даютъ *Pulsatilla*; *China* помогаетъ, когда боль происходитъ отъ чрезвычайной потери соковъ и крови. Оказались полезными: *Arnica montana*, когда спазмы желудка происходятъ отъ ношенія тяжести, искривленія, вывиха, отъ паденія и толчка; *Bryonia alba*, когда чувствуется, что желудокъ будто опухъ и *Staphysagria*, *Senega* и *Stannum*. Съ этими средствами соединяется также леченіе водой. Пить рано утромъ отъ 2—3 стакановъ чистой ключевой воды, столько же послѣ обѣда и вечеромъ передъ сномъ; а кто въ состояніи выпить болѣе, то и еще болѣе. Всякій день мыть тѣло холодной водой, растирать особенно животъ рукой кругообразно; въ сильныхъ припадкахъ класть компрессы изъ холодной воды, по нѣскольку часовъ гулять на чистомъ воздухѣ, или лучше

еще ѣздить въ экипажѣ или верхомъ и чѣмъ быстрее, тѣмъ лучше, держать правильную діету, т. е. ѣсть неслишкомъ много; вообще меньше употреблять особенно кислыхъ купаній, вовсе не пить или пить какъ можно менѣе вина и мартовскаго пива; кофе и крѣпкій чай совершенно оставить. Ноги и низъ живота держать какъ можно теплѣе, раньше ложиться спать и употреблять на сонъ не болѣе 7—8 часовъ, не сидѣть слишкомъ много, не предаваться страстно плотскимъ удовольствіямъ, и болѣзнь не только уменьшится скоро, но при правильной діетѣ и леченіи водой совершенно прекратится.

### СЛАБОСТЬ ЖЕЛУДКА.

Слабостью желудка страдаютъ обыкновенно тѣ, кои въ молодости ослабили свой организмъ разнаго рода наслажденіями, онанизмомъ, соитіемъ, сифилитическими болѣзнями, горячими и спиртными напитками, и по случаю частыхъ запоровъ приучили себя къ слабительнымъ. Также тѣ, которые съ раннихъ лѣтъ приучили себя къ лѣкарствамъ, жалуются въ послѣдствіи на большую слабость желудка. Болѣзнь эта состоитъ въ не способности варенія даже самой легкой пищи, такъ что она слишкомъ долго остается въ желудкѣ, или, не переварившись, выходитъ изъ него. Слабость желудка, если только она происходитъ не отъ разрушенія желудка, гдѣ уже ни какое лѣченіе не поможетъ; — можетъ легко и скоро уничтожиться правильною діетою, а особенно если она не слишкомъ застарѣла. Больной долженъ выпивать утромъ отъ 2—3 стакановъ воды;

если почувствуетъ ознобъ, то чашку крѣпкаго кофе; ѣсть во время завтрака хорошо испеченный бѣлый хлѣбъ съ масломъ, или не много не вареной ветчины, сосисекъ; въ обѣдъ зелень и не много жареного, избѣгать разгорячающихъ и возбуждающихъ напитковъ, эликсировъ и т. п. Вечеромъ одинъ хлѣбъ съ масломъ или кусочекъ жаркаго и 2—3 стакана воды. При томъ должно дѣлать много движенія на воздухѣ, избѣгать всѣхъ заботъ, горя и досады, и употреблять показанныя средства, и желудокъ скоро такъ укрѣпится что онъ тогда будетъ переваривать легкую пищу и разложенную извергать. Главное же, больной употребляя воду внутрь, долженъ, употреблять ее и наружно; особенно нагнать животъ водою; ежедневно брать двѣ холодныя ванны и потомъ дѣлать больше движенія. Только записные пьяницы, которые не могутъ удержаться отъ употребленія спиртныхъ напитковъ, не могутъ излѣчиться отъ этой болѣзни до тѣхъ поръ, пока скорая смерть не освободитъ ихъ отъ нея. Изъ гомеопатическихъ средствъ, смотря по причинѣ болѣзни, служатъ слѣдующія: *Nux vomica*, если причиною болѣзни было излишнее употребленіе спиртныхъ напитковъ, кофе, крѣпкаго чая или ночныя пирушки и т. д. и при запорѣ, головокруженіи, шумѣ въ ушахъ изжогѣ, обложенномъ языкѣ. *Bryonia* при сильномъ запорѣ, съ ознобомъ и сильной жаждой; *Pulsatilla* при гнилостномъ, горькомъ и соленомъ вкусѣ во рту, послѣ жирныхъ возбуждающихъ вѣтры кушаній; *Ipecacuanha* при рвотѣ и тошнотѣ послѣ всякой пищи; *Antimonium crudum*, при подобномъ позывѣ на рвоту, и отрыжкѣ, при чувствѣ полноты въ желудкѣ и сильной жаждѣ ночью; *Rheum* при поносѣ; — *Arsenicum* при поносѣ, послѣ сильныхъ болей во внутренностяхъ;

*China*, при сильномъ разслабленіи организма отъ потери различныхъ соковъ. Сверхъ того, больной не долженъ долго спать, потому что при этомъ желудокъ бываетъ славленъ, что мѣшаетъ пищеваренію. Тѣ изъ больныхъ, которые слишкомъ привыкли къ вину и пиву, и не могутъ безъ него обойтись, могутъ за завтракомъ выпивать стаканъ простаго чистаго не слишкомъ хмѣльнаго пива и стаканъ чистаго стараго вина, но ни какъ не болѣе.

### ИСПОРЧЕННЫЙ ЖЕЛУДОКЪ.

Испорченный желудокъ служитъ основаніемъ всѣмъ другимъ желудочнымъ болѣзнямъ. Испорченность эта происходитъ отъ тѣхъ же причинъ, о которыхъ было упомянуто выше; слѣдовательно здѣсь излишнимъ будетъ упоминать о припадкахъ; а равно и о средствахъ, потому что объ нихъ было говорено въ предыдущей статьѣ: онѣ суть: *Nux vomica*, *Pulsatilla*, *Antimonium crudum*, *China*, *Ipecacuanha*, *Bryonia* и *Chamomilla*. Ихъ употребленіе прилично въ выше упомянутыхъ случаяхъ. Также здѣсь, главное средство есть употребленіе, какъ можно болѣе воды внутрь и снаружи.

### ОСЛИЗЕНІЕ, КАТАРРЪ ЖЕЛУДКА.

Ослизеніе или катарръ желудка есть особенная болѣзнь желудка, которую не легко и не скоро можно устранить, какъ нѣкоторые думаютъ. Дѣти;



которые слишком много принимали лекарств, особенно излишествомъ всякаго рода испортившіе желудокъ, много употреблявшіе вина, повреждены бываютъ этой болѣзни. Если ужъ болѣзнь устарѣла, то нужно много времени, чтобы ее вылѣчить. У дѣтей леченіе ея идетъ скорѣе и лучше, потому что у нихъ еще не можетъ быть застарѣлой болѣзни и мягкіе, чувствительные фибры желудка не представляютъ столько сопротивленій дѣйствію гомеопатическихъ средствъ. Самая болѣзнь характеризуется слѣдующими признаками: при совершенной потерѣ аппетита, постоянно прѣсный, приторно-сладкій вкусъ во рту, при сильной мокротѣ и слюнѣ во рту; языкъ и полость рта, покрываются бѣлымъ, толстымъ шершавымъ слоемъ; испраженія очень затруднены и соединены со слизью и пѣною, моча даетъ большой осадокъ и сильная слабость ощущается во всѣхъ членахъ. Сколь ни малъ позывъ на пищу, но слабость силъ и пустота въ желудкѣ могутъ быть уничтожены, поддерживаны только пищею, хотя бы въ самомъ маломъ количествѣ, но не смотря на то, послѣ принятія пищи, чувствуется большое отягощеніе и сытость, какъ будто желудокъ переполненъ пищею. Гомеопатическія средства противъ этой болѣзни *Iresacantha*, при безвкусіи, горько кислой отрыжкѣ и шершавомъ слоѣ, покрывающемъ языкъ и всю полость рта. Если нижняя часть живота очень вздута и есть поносъ съ бурными испраженіями смѣшанными со слизью, то должно давать *Rheum*; при сильной рвотѣ слизью и желчью даютъ *Veratrum album*. Также и *Antimonium crudum* есть очень хорошее средство.

Здѣсь въ особенности полезна холодная вода. Употребляютъ ее слѣдующимъ образомъ: тотчасъ послѣ

сна, больной долженъ смочить ротъ водою и потомъ очистить свой языкъ пластинкою, сдѣланною изъ китоваго уса, длиною около четверти аршина, тщательно выполоскать ротъ водою. Послѣ сего выпить 3—4 стакана воды, и если онъ страдаетъ запоромъ, то поставить клистиръ изъ холодной воды. Если почувствуется голодъ, то можно ему дать накапунѣ испеченную булку или кусочекъ черстваго бѣлаго хлѣба, и потомъ растирать кругообразно животъ шерстяною матеріею, или мягкою щеточкою обмоченною въ холодную воду. За тѣмъ онъ выпиваетъ опять нѣсколько стакановъ воды; послѣ чего онъ долженъ идти гулять часа два нѣшкомъ, или въ экипажѣ. Во время прогулки держать себя прямо, не сгибая спины потому, что при этомъ нижняя часть живота выходитъ болѣе впередъ и чрезъ это обращеніе соковъ происходитъ правильнѣе. За обѣдомъ ему можно употреблять мало пищи и именно легкую зелень съ кускомъ жаркаго, а потомъ снова дѣлать движеніе. Чрезъ часъ онъ опять долженъ выпить 2—3 стакана воды; вычистить языкъ, какъ сказано выше и если почувствуетъ знобъ, то выпить не болѣе одной чашки чернаго кофе, снова вымыть животъ или лучше выкупаться, и идти гулять до тѣхъ поръ, пока не покажется потъ. Если онъ почувствуетъ сильную усталость, то можетъ съ часъ отдохнуть, но ложиться такъ, чтобы желудокъ и нижняя часть живота не были сдавлены. Вечеромъ пусть съѣстъ онъ булку, или кусокъ бѣлаго черстваго хлѣба, можетъ также съѣсть кусокъ не вареной ветчины и при томъ пить больше воды, выкупаться и лечь, не обтираясь, въ постель, чтобы вспотѣть. Уже чрезъ три дни онъ непременно почувствуетъ облегченіе своей болѣзни; а нѣсколькихъ недѣль достаточно

для совершеннаго ея уничтоженія. Но въ продолженіи этого времени леченіе такого рода не должно быть прерываемо, и всякое другое кушанье, громѣ выше означеннаго, не должно быть допускаемо. При томъ онъ долженъ каждый вечеръ, смотря по оказавшимся симптомамъ принимать означенныя гомеопатическія средства. Такъ какъ и послѣ прекращенія этой болѣзни, желудокъ всегда остается расположеннымъ къ ея возобновленію, то необходимо нужно всякому больному этого рода, наблюдать строго діету, или по крайней мѣрѣ удерживаться отъ всего того, что въ состояніи снова возбудить эту болѣзнь. И такъ если больной сдѣлается гидропатомъ, то ему нечего опасаться возвращенія прежней своей болѣзни.

### КОРЬ.

Корь появляется чаще всего весною и почти всегда эпидемически, и есть ничто иное, какъ лихорадка, соединенная съ сыпью; большею частию бываетъ у дѣтей, очень рѣдко у взрослыхъ: вообще одинъ только разъ въ жизни. Она начинается катарральными припадками, какъ то: кашлемъ, насморкомъ, краснотой глазъ, а на 3-й 4 й день начинается лихорадка. Сначала сыпь показывается въ видѣ маленькихъ шишекъ, пятенъ, или красныхъ, похожихъ на льняное сѣмя, большихъ точекъ на лицѣ; потомъ показывается на груди, на животѣ и на прочихъ частяхъ тѣла пятна свѣтло-красныя похожія на укушеніе блохъ, которыя не много возвышаются надъ кожею. Обыкновенно они подсыхаютъ въ шесть дней, и тогда сходятъ съ тѣла чешуею

похожею на отруби. Хотя корь есть болѣзнь воспалительная, но безопасна, при правильномъ леченіи; иногда она соединяется съ гастрическими страданіями, также можетъ быть и нервная. Въ самомъ сильномъ періодѣ болѣзни, на 3 или 4 день бываетъ очень сильная лихорадка, дыханіе затруднено, сухой кашель и тоскливое расположеніе духа больного. Чтобы не смѣшать корь съ скарлатиною, то должно замѣтить, что въ корѣ затрудняется не глотаніе, но дыханіе, что въ кори при давленіи пальцемъ, на тѣлѣ остается красное пятно, тогда какъ въ скарлатинѣ краснота исчезаетъ и образуется бѣлое пятно, которое снова переходитъ въ красное только при отнятій пальца. Лучшее средство противъ этой болѣзни, особенно въ началѣ, есть *Pulsatilla*. Оно также и предохранительное, если болѣзнь бываетъ эпидемическая. На два дни одинъ приемъ *Pulsatilla* есть предохранительное, и лечащее средство; если же болѣзнь уже усилилась, и началась лихорадка то даютъ отъ 1—2 приемовъ *Aconitum Napellus*, затѣмъ долженъ слѣдовать одинъ приемъ *Belladonna*, въ такомъ случаѣ, если лихорадка очень сильна и чувствуется безпокойство и тоска. Если сыпь вдругъ скроется почему нибудь, отъ простуды или въ слѣдствіе погрѣшностей въ діетѣ, отъ чего легко можетъ случиться злокачественная воспалительная боль въ груди, то нѣсколькими приемами  *Bryonia alba*, должно стараться возстановить эту сыпь. Если это не поможетъ, то дать *Phosphor.* или *Belladonna*, *Causticum* или *Helleborus niger*. Если вмѣсто сыпи начинается рвота и поносъ, то даютъ *Pulsatilla*. При одной только рвотѣ *Ipecacuanha*. Если скроется потъ, то, чтобы возстановить его, даютъ *Nux vomica*, *Cocculus* и *Chamomilla*. Если обнаружится страданіе въ мозгу, то

даютъ *Belladonna* и *Helleborus niger*. Одышка и стѣсненіе въ груди часто случающіяся послѣ этой болѣзни, устраняются нѣсколькими приемами *Pulsatilla*, *Ipecacuanha*, *Calcarea carbonica* и *Sulphur*. Осложненную корь т. е. корь съ припадками гастрическими и нервными лучше всего должно предоставить лечение гомеопатическому врачу. Что касается до употребленія холодной воды въ этой болѣзни, то я ссылаюсь на то, что сказано въ статьѣ о просовидной сыпи и позволяю себѣ сообщить опытъ, который профессоръ Эртель сдѣлалъ въ своемъ семействѣ. Въ концѣ Ноября 1830 года 7-и лѣтняя дочка его, заболѣла просовидною сыпью. Жена его скрыла его, боясь, что ребенка станутъ купать и мыть холодною водою. Вскорѣ потомъ тою же болѣзнію заболѣлъ одинъ изъ его сыновей, который пожелалъ купаться. Объ этомъ узналъ самъ Эртель. Онъ вымылъ сына готчасъ же съ головы до ногъ грецкою губкою, уложилъ его въ постель; гдѣ онъ для утоленія сильной жажды, выпилъ нѣсколько стакановъ холодной воды. На другой день все лице его и тѣло стали красны, сыпь была такъ сильна, какой еще никогда не видывали. Тоже самое было и съ дѣвочкою, и оба не лежали въ постели. Сыпь была чрезвычайно сильна у обоихъ, но оба оставались веселы и здоровы, имѣли отличный аппетитъ и въ короткое время были совершенно вылѣчены и могли наслаждаться чистымъ воздухомъ, не боясь послѣдствій этой болѣзни. Мыть холодною водою надобно предъ сномъ и притомъ, какъ можно больше пить холодной воды. Лечение кори холодною водою не должно быть впрочемъ производимо иначе какъ подъ руководствомъ опытнаго врача.

## МѢСЯЧНОЕ ОЧИЩЕНІЕ, РЕГУЛЫ, НЕПРАВИЛЬНОСТИ И ОСТАНОВКА ИХЪ.

Регулы или мѣсячное очищеніе не есть собственно болѣзнь по крайне необходимому отпращиванію для женскаго организма, для предупрежденія болѣзней. Они бываютъ, какъ извѣстно, черезъ четыре недѣли, болѣею частію при полнолуніи; появляются со вступленіемъ въ возрастъ возмужалости, останавливаются во время беременности и совершенно исчезаютъ въ тѣ годы, когда прекращается способность къ зачатію. Не появленіе ихъ или слишкомъ раннее, или позднее, недостаточное или обильное и слишкомъ продолжительное мѣсячное очищеніе можно только назвать болѣзнію и объ этомъ мы и хотимъ здѣсь говорить. Это слишкомъ продолжительное неоявленіе мѣсячнаго очищенія, или вовсе прекращенное можетъ повести къ самымъ труднымъ и опаснымъ болѣзнямъ, и потому нужно принять заблаговременно мѣры къ возстановленію, или правильному ихъ наступленію. Нервные болѣзни, спазмы, слабость всего тѣла, приливы крови къ головѣ и къ груди, параличъ или ударъ, водяная болѣзнь, вотъ слѣдствія остановившихся регулъ. Должно посоветоваться съ врачомъ, для предупрежденія этихъ ужасныхъ послѣдствій. Причиною неправильности, или совершеннаго прекращенія регулъ, бываетъ: простуда ногъ, кислая, вязущая пища и лѣкарства, сильный испугъ, досада, гнѣвъ; острые воспалительныя болѣзни, значительная потеря соковъ, употребленіе горячихъ напитковъ. Къ этой болѣзни предрасположены осо-



бенно женщины слабого тѣлосложенія, флегматическаго темперамента, или слишкомъ раздражительныя. Во многихъ случаяхъ неоявленіе регулъ не влечетъ за собою никакихъ послѣдствій; это можно оставить безъ всякаго вниманія. Но при малѣйшемъ признакѣ растройства должно немедленно прибѣгнуть къ приличнымъ средствамъ. Только не должно употреблять сильныхъ возбуждающихъ домашнихъ средствъ, потому что онѣ часто влекутъ за собою другія не менѣе тяжелыя болѣзни. Если регулы не показались въ тѣ годы, когда наступило уже совершеннолѣтіе, или и показались, но потомъ снова остановились, отъ чего произошли разнаго рода болѣзненныя явленія, какъ то; головныя боли, головокруженіе, біеніе сердца, блѣдность лица и конечностей, то даютъ каждые 2 дня вечеромъ, пріемъ *Pulsatilla*, и если послѣдуютъ спазмы и конечности сдѣлаются холодны, то *Cocculus*, попеременно съ *Veratrum album*. Если часто идетъ кровь носомъ, то даютъ *Bryonia*. Если чувствуется давленіе и боль въ поясницѣ, а отсюда боль простирается до живота, то употребляется *Chamomilla*. Если дѣлается приливъ крови къ груди, и животъ очень вздувается, все тѣло холодѣетъ, то помогаетъ *Coffea cruda*, и кто привыкъ уже къ кофе, тому *Pulsatilla*. Тѣже средства помогаютъ, если во время регулъ оказываются эти болѣзненные припадки. Женщины предавшіяся грусти тихой, скрытой, при тошнотѣ, обморокахъ, чрезмѣрной холодности тѣла, блѣдности лица, которыхъ солнечный свѣтъ и шумъ беспокоятъ, принимаютъ *Ignatia amara*. Но лучше всего если такого рода больныя женщины заблаговременно прибѣгнуть къ помощи врача.

Также въ этой болѣзни вода имѣетъ самое спаси-

тельное, скорое дѣйствіе. Больная должна приучить себя сначала къ холодной водѣ, питьемъ, умываньемъ рукъ, лица шеи и груди. Потомъ чрезъ нѣсколько времени мыть все тѣло, и особенно животъ и половыя органы; больше прогуливаться и избѣгать всячески отягощенія желудка пищею и питьемъ. Въ послѣдствіи она должна купаться въ холодной водѣ, а вечеромъ передъ сномъ брать холодныя ножныя ванны и съ мокрыми ногами, завернутыми въ теплое одѣяло, ложиться въ постель. Отъ этого сдѣлается благотворная теплота, которая привлечетъ кровь къ ногамъ. Однакожъ не однимъ днемъ, не одной ванною исцѣляется болѣзнь; купанье и ванны въ холодной водѣ должно продолжать долгое время, чтобы вылечиться основательно. Когда это послѣдуетъ, то безъ сомнѣнія такія женщины не оставить водолеченія: испытавъ его благотворность; онѣ будутъ продолжать пить, купаться и мыться холодною водою постоянно, онѣ освободятся не только отъ многихъ другихъ болѣзней, но и послѣ, вышедши за мужъ, будутъ имѣть легкія, не столь болѣзненные роды; и самыя дѣти будутъ здоровѣе и предохраняться отъ множества дѣтскому возрасту свойственныхъ болѣзней, и такимъ образомъ избавятъ и себя, и мужа, и дѣтей отъ безпокойствъ, приготовивъ жизнь самую счастливую. Взявъ въ разсчетъ издержки на леченіе, мы видимъ, что леченіе водою ничего не стоитъ, развѣ только побѣды отвращенія отъ воды.

#### РВОТА МОЛОКОМЪ.

Всякое здоровое дитя, имѣющее здоровую мать или кормилицу, время отъ времени выплевываетъ свер-

нувшееся молоко; но это не есть признак болѣзни, скорѣе же избытка молока въ грудяхъ матери. Пока грудной младенецъ при этой рвотѣ здоровъ и полнѣетъ, можно предоставить ему извергать излишнее принятую пищу. Но если дитя при этой рвотѣ худѣетъ, дѣлается безпокойнымъ, плачетъ и кричитъ, то это признакъ того, что у него есть какая нибудь неизвѣстная болѣзнь, или дурно молоко, или старо, или слишкомъ жирно, или что сама мать, или кормилица имѣютъ что либо болѣзненное, что онѣ передаютъ посредствомъ молока и дитяти. Тогда должно отнять младенца отъ груди матери; а ежели его кормила кормилица то взять для него кормилицу моложе и здоровѣе. Если это не поможетъ, то призвать врача для вѣрнѣйшаго изслѣдованія причинъ болѣзни. Большею частію зло уничтожается съ перемѣною кормилицы. Если бы матери, во время періода кормленія, обращали болѣе вниманія на свою жизнь и были бы во всемъ умѣренны, какъ то: въ пищѣ, питьѣ, удовольствіяхъ и впечатлѣніяхъ, или при выборѣ кормилицъ обращали бы болѣе вниманія на ея здоровье и силы, чтобъ молоко ея было свѣжо и неслишкомъ жирно, и вообще если бы обращали вниманіе на здоровое содержаніе и пищу, и удерживались бы отъ излишествъ всякаго рода, то не было бы у дѣтей этой болѣзненной рвоты, скиснувшимся въ желудкѣ молокомъ. Дѣтей, страдающихъ этою болѣзнію, не должно качать; однимъ словомъ не должно ихъ подвергать никакому скорому движенію. Гомеопатическія средства противъ этого суть: *Sulphur* въ продолженіи 3-хъ дней по приему каждый день, потомъ *Calcareæ carbonica*. Если дитя страдаетъ при томъ спазмами, притягиваетъ ножки къ животу, то давать ему *Bryonia alba*, а если съ этимъ соеди-

няется сильный поносъ, то *Ipecacuanha* попеременно съ *Rheum*.

### МОЛОЧНАЯ ЛИХОРАДКА.

Вообще молочная лихорадка наступаетъ на 3-й и 4 или 5 день послѣ родовъ, и только у такихъ матерей, у которыхъ всегда бываетъ слишкомъ много молока, или у тѣхъ, у коихъ отдѣляется въ груди слишкомъ много молока, которое дитя еще не въ силахъ отсосать. Не рѣдко самыя сильныя и здоровыя матери страдаютъ этою болѣзнію. Грудь затвердѣваютъ, такъ что затвердѣвшая опухоль не рѣдко доходитъ до плечъ, больныя не могутъ ихъ поднять; больная прежде всего чувствуетъ большій, или меньшій поносъ, потомъ сильный жаръ, при жестокой головной боли, не рѣдко безпокойство становится слишкомъ велико, головная боль невыносима, тоска увеличивается, мучительная жажда. Большею частію болѣзнь проходитъ сама собою; и всѣ домашнія средства должно оставить. Для утоленія жажды пить много воды и дать 2—3 приема *Aconitum Napellus*. *Coffea cruda* очень хорошее средство для тѣхъ роженицъ, которыя не привыкли пить кофе. Если же послѣ этихъ средствъ болѣзнь не прекращается, но увеличивается болѣе и болѣе, головная боль невыносима, то дать 2—3 приема *Belladonna*. Вмѣстѣ съ тѣмъ приставить къ соскамъ грудныя стекла чтобы оттянуть изъ груди излишнее молоко. Если болѣзнь произошла отъ слишкомъ тяжелыхъ родовъ, или отъ происшедшаго при этомъ какого нибудь поврежденія, то даютъ специфическое средство *Arnica montana*, чрезъ каждые два часа

по 2 капли. Впрочемъ и здѣсь при усиливающейся болѣзни помощь врача необходима.

### НЕДОСТАТОКЪ МОЛОКА.

Бываютъ случаи, когда мать имѣетъ очень мало молока, чтобы достаточно кормить дитя. Это происходитъ не отъ того, чтобы груди дѣйствительно отдѣляли мало молока, но отъ невнимательнаго попеченія и недостатка заботливости о еще слишкомъ слабой роженицѣ; желая успокоить роженицу, даютъ дитяти грудь очень поздно и дожидаются прилива молока къ грудямъ до опухоли. Это не правильно. Должно давать грудь дитяти, по крайней мѣрѣ, не позднѣе 8 часовъ послѣ родовъ, хотя бы сосочки были очень малы, и молока отдѣлялось мало потому что, если только дитя здорово и крѣпко, оно притянетъ молоко сосаніемъ и соски тоже увеличатся. Если же дитя не въ силахъ этого сдѣлать, то приставляютъ грудное стекло или даютъ грудь ребенку постарше; для этого не должно кормить ребенка, потому что сытое дитя уже не возьметъ другой груди. Мать, много любящая свое дитя (а какая мать не любить свое дитя!) всегда постарается имѣть болѣе молока; для того она сама будетъ употреблять самую питательную и здоровую пищу и остерегаться всего, что можетъ повредить отдѣленію молока. — Мать, которая сама кормитъ свое дитя, танцовать не должна. Кто заботится о томъ, чтобы имѣть болѣе молока и притомъ самаго лучшаго достоинства, та должна пить болѣе холодной воды и мыть ею всю грудь; этимъ всякая внѣшняя кислота, происходя-

щая отъ потеченія молока, будетъ устранена. Ни одна мать не должна думать, чтобы это мытье холодною водою могло ей повредить, напротивъ это въ высочайшей степени ей полезно и здорово. Послѣ каждаго мытья должно покрывать грудь шерстянымъ платкомъ. Главное гомеопатическое средство для большаго отдѣленія молока есть Chamomilla.

### ПЕРЕНОСЫ МОЛОКА. РАЗЛИТІЕ МОЛОКА.

Если молоко, вмѣсто того, чтобы скопиться въ грудяхъ, бросается въ другое какое нибудь мѣсто, въ которомъ вѣроятно произошло воспаленіе и потому есть сильное раздраженіе, то это называется разлитіемъ молока, потому что молоко, вмѣсто грудей, перелилось, перемѣстилось въ другое мѣсто. Эта болѣзнь по большей части опасна и потому требуетъ скорѣйшаго пособія со стороны врача Гомеопата. Если бы чрезъ 4—5 дней въ грудяхъ не показалось молока, и груди остаются повисшими и боль ощущается въ какой нибудь другой части тѣла, къ чему присоединяется еще лихорадка и бредъ, то нужна немедленная помощь врача. Между тѣмъ должно дать при появленіи молока на 2-й или 3-й день Chamomilla, а если это не поможетъ, то нѣсколько приѣмовъ Pulsatilla, потомъ стараться привлечь молоко къ грудямъ посредствомъ грудныхъ стеколъ или сухихъ банокъ, или просто присасываніемъ молока взрослыми особами и такимъ образомъ возстановить естественное его отдѣленіе. Если сдѣлается сильная лихорадка и бредъ, то должно дать нѣсколько приѣмовъ Aconitum, а потомъ Belladonna.



Всего лучше предоставить леченіе этой вообще опасной и тяжелой болѣзни врачу и притомъ немедленно.

### КОЛОТЫЕ ВЪ СЕЛЕЗЕНКѢ.

Тѣ, которые часто страдаютъ запорами послѣ пищи, вѣтры производящей, чувствуютъ, особенно послѣ скорого движенія, бѣгання, ношенія или поднятія тяжести, послѣ скорой ходьбы въ гору, колотье въ лѣвомъ боку, гдѣ лежитъ селезенка. Эту боль причиняетъ сильный приливъ крови къ этому органу. Вообще она проходитъ сама собою, вмѣстѣ съ прекращеніемъ необыкновеннаго движенія. Аconitum, Chamomilla и Belladonna суть лучшія средства, если она не утихаетъ и при успокоенномъ состояніи тѣла. Если же боль возвращается часто и продолжается довольно долго, то необходимо совѣтоваться съ врачомъ. Должно употреблять меньше пищи, производящей вѣтры, пить болѣе холодной воды, мыть все тѣло водою, особенно мыть ею сторону желудка; избѣгать скорыхъ движеній и колотье это скоро пройдетъ и не возвратится.

### ГНИЛОСТЬ ВО РТУ. ЦЫНГА.

Это болѣзненное, измѣненное состояніе полости рта бываетъ соединенно съ слѣдующими явленіями: шатаніе зубовъ, дурной изо рта запахъ, покраснѣнія, воспаленныя, раздраженныя десны и другія неприятныя явленія. При малѣйшемъ прискосновеніи

изъ д сень идетъ кровь; не рѣдко самыя шейныя желѣзы бываютъ болѣзненно поражены и распухаютъ. Главное средство здѣсь *Mercurius vivus*. Если же отъ этого болѣзни не проходитъ, то употребляютъ нѣсколько времени *Sulphur*, каждые два дни, по 2 капли вечеромъ. Особы, которые долго страдали сифилитическими болѣзнями, и находясь въ рукахъ врача аллопата, много принимали ртути, страдаютъ сильно этою болѣзнію, или лучше сказать, она по преимуществу бываетъ у подобныхъ людей. Чтобы вылечиться отъ нея, они должны принимать *Mercurius vivus* попеременно съ *Carbo vegetabilis*. Дурной запахъ изо рта, похожій часто на запахъ мертвечины, надобно стараться уничтожить: частымъ полосканьемъ рта холодною водою, и долговременнымъ употребленіемъ ее въ питьѣ. Должно полоскать ротъ рано утромъ, вставая съ постели. Всякій разъ послѣ принятія пищи, удалить изо рта, также и съ языка всякую мокроту помощію пластинки изъ черепахи или китоваго уса и долгое время не пить ничего, кромѣ холодной воды; купать съ тѣмъ все тѣло, употреблять вышеприведенныя средства и болѣзни прекратится въ короткое время.

### ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА.

Она представляетъ трещину, чрезъ которую изъ пупка выходятъ внутренности, лежація въ брюшной полости. Сильный крикъ ребенка въ первые дни и недѣли его существованія, также и неосторожное обхожденіе съ пупочнымъ канатикомъ во время родовъ со стороны повивальной бабки, иногда и орга-

вическій недостатокъ бываютъ причиною ея прохожденія. Природная грыжа очень трудно излѣнима и должна быть непременно предоставлена попеченію искуснаго медика; случайно же сдѣлавшаяся грыжа легко можетъ быть устранена: мало по малу вдавливаютъ легкимъ треніемъ выдавшіеся внутренности чрезъ пупокъ въ брюшную полость, потомъ кладутъ компрессъ изъ холста и прикрѣпляютъ его на томъ мѣстѣ по средствомъ длиннаго и широкаго севальвика. Надобно наблюдать, чтобы этотъ компрессъ съ своего мѣста не сдвинулся и если это окажется, снова наложить его такимъ же образомъ.

### ПОСЛѢ-РОДОВЫЯ БОЛИ.

Женщины, много разъ рожавшія, отушаютъ послѣ родовъ и большею частію послѣ удаленія послѣда болѣзненное, рѣжущее сжатіе въ частяхъ, соприкосновенныхъ съ дѣтородными органами; эта боль особенно усиливается во время кормленія ребенка грудью. Не только эти боли очень сильны, но сверхъ того, они еще отнимаютъ у роженицы столь нужный для ея укрѣпленія сонъ, лишаютъ ее совершенно силъ, отчуждаютъ отъ ребенка, потому что при сосаніи боль всякій разъ возобновляется и усиливается. Такъ какъ этимъ страдаютъ большею частію тѣ изъ матерей, которыя часто рожали, то это знакъ того, что отъ слишкомъ частыхъ родовъ сильно разслаблены и раздражены дѣтородные органы и соприкосновенные съ ними члены. Онѣ рѣдко продолжаютъ болѣе трехъ дней. Простуда и поврежденіе внутреннихъ частей послѣ родовъ также причиняютъ

эти боли. Не должно бы слишкомъ торопиться удаленіемъ послѣда. Если онъ не приростъ, то надобно ему дать время для выходенія; если же приростъ, то предоставить удаленіе его искусному акушеру. Если же причиною болей было поврежденіе, то даютъ 2—3 приема *Arnica montana*, если отъ простуды, то *Coffea cruda*, а также и *Dulcamara Chamomilla* дается при сильномъ безпокойствѣ, а *Pulsatilla* при постоянной боли.

### КРОВОТЕЧЕНІЕ ИЗЪ НОСУ.

Вообще это кровотеченіе совершенно безопасно; оно особенно часто замѣчается въ молодости, уравновѣшиваетъ слишкомъ быстрое обращеніе крови, или излишнее скопленіе оной. Слизистая оболочка носа имѣетъ много кровеносныхъ сосудовъ, и изъ сихъ послѣднихъ кровь и изливается. Это кровотеченіе не только не опасно, но иногда очень полезно. Только при слишкомъ обильныхъ и часто повторяющихся кровотеченіяхъ должно его останавливать. Наружныя поврежденія носа и головы, ударъ, паденіе, сильныя потрясенія носа производятъ также кровотеченіе. Обыкновенно течетъ кровь только изъ одной ноздри; если же она выходитъ изъ заднихъ частей носа, то она частію попадаетъ въ ротъ и многіе пугаются того, воображая, что кровь идетъ изъ легкихъ. Въ воспалительныхъ болѣзняхъ желаютъ этого кровотеченія и считаютъ его за кризисъ, или переворотъ болѣзни. Поэтому никогда не употребляютъ средствъ, останавливающихъ это кровотеченіе. Если же оно повторяется слишкомъ часто

и въ слишкомъ сильной степени, когда на пр. кровь течетъ струею и если больной при этомъ видимо худѣетъ, то конечно надо приступить къ леченію.

При сильномъ кровотеченіи носомъ, возникшемъ вслѣдствіе пораненія, или сильного потрясенія головы помогаетъ *Arnica montana*. Дѣвцы, достигшія совершеннолѣтія, у которыхъ или вовсе нѣтъ мѣсячнаго очищенія или оно очень слабо, и которыя страдаютъ сильнымъ кровотеченіемъ изъ носа, слабѣютъ и блѣднѣютъ, должны употребить нѣсколько приѣмовъ *Pulsatilla*, а именно въ продолженіе 14 дней, разъ въ день по 2 капли. Если передъ кровотеченіемъ носомъ сильно болитъ голова, рябитъ въ глазахъ, появляются: головокруженіе, и шумъ въ ушахъ, то дать *Aconitum*, и потомъ *Bryonia*. Если произошла уже большая потеря крови, или такое кровотеченіе носомъ случилось у людей, которые и безъ того были уже ослаблены потерей соковъ, то помогаетъ 3—4 приѣма *China*, по 2 капли черезъ два дни. Если кровь темна, почти черна, — дать *Stocus*. Это средство преимущественно помогаетъ особамъ, склоннымъ къ апохондріи и истерикѣ, если они страдаютъ очень сильнымъ кровотеченіемъ изъ носа. Но нѣтъ лучше средства, какъ холодная вода, употребленная какъ внутренно такъ и наружно. Она разжижаетъ кровь, препятствуетъ ея сгущенію, укрѣпляетъ кровеносные сосуды и уничтожаетъ всякое воспаление. Кто пьетъ много воды, часто купается, втягиваетъ себѣ въ носъ холодную воду, моетъ себѣ ею половые органы, то, хотя бы онъ и страдалъ прежде сильнымъ кровотеченіемъ изъ носа, оно совершенно прекратится и болѣе не повторится.

### НЕРВНАЯ ГОРЯЧКА (Тифъ).

Нервная горячка имѣющая иногда въ высшей степени острый характеръ, есть одна изъ самыхъ опасныхъ болѣзней, какія когда либо поражали человечество и велико число страдавшихъ ею и погибшихъ отъ нея. Эта болѣзнь падаетъ на самые цѣнные и чувствительнѣйшіе органы нашего тѣла. Страдавшіе нервною горячкою и потомъ выздоровѣвшіе, въ теченіе многихъ лѣтъ послѣ того бываютъ подвержены дурнымъ слѣдствіямъ тифа. Ихъ жизненная дѣятельность бываетъ слишкомъ разстроена, они становятся очень раздражительными и воспримчивыми. Такъ какъ здѣсь само собою разумѣется, что подобные больные не могутъ лѣчиться и не должны быть лѣчимы не-врачами, то здѣсь не нужно бы и говорить о первоначальныхъ признакахъ этой болѣзни, ея симптомахъ и средствахъ противъ нея; но для тѣхъ, кто пожелаетъ имѣть объ этой болѣзни болѣе ясное понятіе, скажемъ о ней нѣсколько словъ. Это — болѣзнь нервовъ (что уже видно изъ ея названія), т. е. тѣхъ сѣробѣловатыхъ волоконъ, облеченныхъ своею собственною оболочкою, которые выходятъ изъ мозга, или становой жилы, распространяются по всему тѣлу и составляютъ основаніе взаимнаго вліянія между тѣломъ и душою; она чрезвычайно разстраиваетъ жизненную дѣятельность, овладѣваетъ и физическою и духовною сторонами челоѣка и потому бываетъ соединена съ страшною опасностію. Этой болѣзни подвергаются преимущественно слабыя особы и особенно тѣ, которыя



живутъ въ нездоровыхъ мѣстностяхъ, въ душныхъ, сырыхъ комнатахъ, въ нижнихъ этажахъ домовъ и употребляютъ непитательную и испорченную пищу; первная горячка всего чаще появляется въ голодные годы, когда люди, для поддержанія жизни, вынуждены употреблять испорченную и нечистую пищу. Къ нервной горячкѣ располагаютъ также: слишкомъ сильные движенія души, досада, горе, страхъ, печаль, излишнее напряженіе тѣлесныхъ силъ. Иногда эта болѣзнь получаетъ эпидемическій характеръ и поражаетъ одинаково легко какъ крѣпкихъ, такъ и слабыхъ людей; первые даже погибаютъ отъ нея еще скорѣе потому, что болѣзнь находилъ въ нихъ для себя болѣе основанія и пищи. Я зналъ одного студента, который обладалъ такою необыкновенною тѣлесною силою, что легко сгибалъ о коѣнку толстую желѣзную палку; получивъ горячку послѣ внезапной простуды отъ купанья, онъ приходилъ въ такое бѣшенство, что 4 здоровыхъ человека не могли его удержать въ постели; на третій день болѣзни онъ умеръ. Болѣзнь эта имѣетъ слѣдующіе признаки: за долго до того, какъ она обнаружится, пропадаетъ аппетитъ, языкъ бѣлѣетъ, ротъ наполняется мокротою, въ головѣ ощущается пустота и тяжесть, человекъ чувствуетъ, какъ будто у него разбито все тѣло, больше лежитъ, нежели сидитъ или ходитъ; сонъ дѣлается очень безпокоенъ и прерывистъ: ознобъ смѣняется жаромъ и на оборотъ. Послѣ этихъ предшествующихъ явленій болѣзнь является во всей силѣ и особенно въ острой нервной горячкѣ, которая иногда бываетъ и безъ всякихъ предшествующихъ признаковъ. Голова начинается горѣть, глаза выходятъ изъ орбитъ, блестятъ, становятся неподвижны и не могутъ пере-

носить никакого свѣта, пульсъ бываетъ сильный, полный, судорожный. Случаются такіе припадки бѣшенства, при которыхъ слабые мускулы больного до того раздражаются и напрягаются, что его сила могутъ удержать на постели два, или три сильныхъ человека. При томъ жажда бываетъ необыкновенно сильна, чувство обонянія совершенно слабѣетъ. Если болѣзнь клонится къ выздоровленію, то сильный жаръ начинаетъ мало по малу исчезать, потъ, хотя и слабый выступаетъ на всемъ тѣлѣ, глаза дѣлаются свободнѣе и къ большому облегченію больного слѣдуетъ поносить; пульсъ становится нѣсколько ровнѣе, сонъ покойнѣе и живительнѣе. Если же болѣзнь идетъ къ смерти, то подъ конецъ большой впадаетъ въ совершенное безпамятство, дыханіе становится все тяжелѣе и онъ наконецъ не можетъ глотать; глаза у него дѣлаются совершенно неподвижны, испраженія и моча выходятъ безсознательно, и мѣстами показываются снѣжныя пятна, предвѣстники близкой смерти. Это слабое описаніе острой нервной горячки вообще. *Медленная же нервная горячка* обнаруживается иначе. Больной лежитъ очень тихо, спокойно и кажется совершенно лишеннымъ чувствъ, кожа у него суха, рѣчь вялая, растянута, нѣвуча; языкъ, зубы и губы покрыты темною слизью, органы чувства совершенно разстроены; глаза полуоткрыты, уши или ничего не слышатъ, или имъ слышится постоянный звонъ и шумъ. Этотъ видъ горячки не такъ опасенъ, какъ острая нервная горячка, и ей подвергаются большею частію слабыя особы, обезсиленные сильною потерей соковъ, или люди долгое время находившіеся подъ вліяніемъ горя, печали или досады. Впрочемъ и медленная нервная горячка также похищаетъ немало жертвъ. При

выборъ средствъ противъ этой болѣзни надо соображаться съ причинами произведшими болѣзнь. 1) Въ медленной нервной горячкѣ давать: *Chamomilla* попеременно съ *Cocculus*, если причиною болѣзни была досада; *Acidum phosphoricum* и *Ignatia amara*, если болѣзнь произошла отъ горя или сильной скорби; *China* и *Camphora*, если болѣзнь возникла вслѣдствіе сильной потери соковъ и совершеннаго расстройства жизненной дѣятельности. Также *Helleborus niger* служитъ хорошимъ средствомъ, особенно если появляется наружный ознобъ, внутренній жаръ и головокруженіе, въ то время, когда больной не находится въ постели; а когда онъ ляжетъ, тотчасъ начинается сильный наружный жаръ и выступаетъ обильный потъ; 2) при острой нервной горячкѣ полезны: при началѣ болѣзни нѣсколько приѣмовъ *Aconitum Napellus*, во время припадковъ бѣшенства *Belladonna*, при бредѣ, судорожныхъ подергиваніяхъ *Stramonium*; и *Helleborus niger* при бредѣ, подергиваніи и сильномъ напряженіи жилъ. Другой, опаснѣйшій видъ этой болѣзни, есть *тифъ*, прилипчивая, нервная горячка, иначе называемая *лазаретною горячкою*. Сущность этой болѣзни состоитъ въ зараженіи нервной и сосудистой системъ. Ее называютъ также астеническою, т. е. происходящею отъ слабости горячкою. Расположены къ этой болѣзни бываютъ люди слабаго сложенія, съ нѣжною, мягкою кожею и всѣ тѣ, которые были разстроены прежде какими нибудь болѣзнями, потерей крови и соковъ, сильнымъ напряженіемъ, ночнымъ бдѣніемъ, голодомъ или жаждою, она развивается преимущественно въ теплой, сырой атмосферѣ и особенно тамъ, гдѣ бываетъ многолюдно; вотъ почему она такъ легко распространяется въ лазаретахъ, откуда происходитъ

и сказанное названіе лазаретной горячки. Она очень заразительна, и передаетъ свою заразу здоровымъ людямъ или непосредственно, чрезъ прикосновеніе къ больнымъ, чрезъ ихъ дыханіе или посредствомъ проводниковъ, какъ то: шерсти, волосъ, мѣховъ, перьевъ, льна и т. подоб., при чемъ эти вещества принимаютъ въ себя заразу и переносятъ её на людей, которые къ нимъ прикасаются. Поэтому тифъ, развившись въ одномъ индивидуумѣ легко распространяется, дѣлается эпидемическимъ т. е. поражаетъ цѣлый народъ и даже цѣлое государство. Впрочемъ тифъ ограничивается иногда спорадическимъ характеромъ т. е. поражаетъ только отдѣльные лица, не распространяясь далѣе. Во всякомъ случаѣ при появленіи этой болѣзни, правительство должно принять предохранительныя мѣры. Періодъ предвѣстниковъ, за которымъ слѣдуетъ періодъ пораженія въ другихъ начинается чувствомъ тошноты, отягощенія желудка, совершеннымъ разстройствомъ духа, головокруженіемъ, судорожными подергиваніями, дрожью, расположеніемъ къ обморокамъ. Это продолжается отъ 3—4 дней. Періодъ болѣзни начинается 6—12 часовымъ постояннымъ ознобомъ и дрожью всего тѣла, которые прерываются иногда кратковременною теплотою, и переходятъ потомъ въ сильный продолжительный жаръ. Кожа горитъ и при томъ покрывается липкимъ, пахучимъ потомъ, глаза дѣлаются томны и мутны, лице становится грязно-сѣроватаго цвѣта; голосъ глухъ, хриплъ, пульсъ малъ и слабъ, часто прерывистъ; испраженія и моча выходятъ безсознательно; весь организмъ слабѣетъ, настаетъ сонное состояніе и органы чувствъ совершенно отказываются служить. Смерть уже недалеко. Главное средство есть здѣсь *Opium* и потомъ

Stramonium и Hyoscyamus. Приведеніе другихъ дальнѣйшихъ средствъ совершенно не нужно потому, что при этой въ высшей степени опасной болѣзни должно немедленно призвать врача.

Но при тифѣ, а также и при медленной нервной горячкѣ превосходнымъ средствомъ оказывается употребленіе холодной воды; и я увѣренъ, что исцѣленіе отъ этихъ болѣзней совершалось бы успѣшнѣе, дурныя слѣдствія предотвращались-бы и число жертвъ много бы уменьшилось, если бы при самомъ началѣ болѣзни или при появленіи предшествующихъ ей признаковъ употребляли холодную воду. Когда первая горячка или тифъ дѣлается эпидемическою болѣзнію, полезно здоровымъ людямъ пить какъ можно больше холодной воды, ежедневно мыться ею и что еще лучше купаться, чрезъ что всего вѣрнѣе они избѣгутъ заразы. А кто приучилъ себя къ ежедневному употребленію холодной воды наружно и внутренно, тотъ не легко подвергается этой болѣзни. Если человекъ замѣчаетъ по сказаннымъ признакамъ наступленіе нервной горячки, онъ долженъ тотчасъ начать пить больше холодной воды, тщательно мыть всю голову, а потомъ тереть ею и тѣло, чаще купаться; слабѣющія и падающія силы чрезъ это снова оживятся и укрѣнятся. Онъ долженъ терпѣливо продолжать это пользованіе: пить больше воды рано утромъ, послѣ полудня, послѣ обѣда, вечеромъ; раза по три въ день окатываться холодною водою или брать холодныя ванны, чаще мѣнять бѣлье и платье; употреблять удобоваримую пищу и сколько позволяютъ силы, дѣлать моціонъ на чистомъ воздухѣ, или по крайней мѣрѣ, дома; не предаваться страху и безпокойству, заниматься легкимъ освѣжающимъ душу чтеніемъ. Ротъ надо чаще полоскать

холодною водою, и еще чаще мыть ею голову. Для очищенія въ домѣ воздуха не курить, ни чѣмъ кроме уксуса, который наливаетъ на раскаленный кирпичъ. Кто старательно и точно будетъ выполнять эти предписанія, употребляя притомъ и гомеопатическія лекарства, тотъ можетъ надѣяться, что онъ не подвергается этой опасной болѣзни. Докторъ Эртель приводитъ много случаевъ, гдѣ заболѣвшіе нервной горячкою легко и скоро отъ нея изцѣлялись холодною водою, особенно въ первомъ періодѣ болѣзни.

### КРАПИВНАЯ ЛИХОРАДКА.

Крапивная лихорадка или крапивная сыпь есть болѣею частію безопасная кожная сыпь, похожая по пузырькамъ и зуду на ожогъ крапивою. Она показывается и исчезаетъ скоро: отъ нея кожа не мокнетъ и не лупится. Замѣчено что особы, которые прежде страдали чесоткою и несовѣтъ были отъ нея вылѣчены, или у которыхъ сыпь употребленіемъ наружныхъ средствъ была быстро вогнана внутрь, расположены къ крапивной лихорадкѣ. Она показывается въ неопредѣленное время года, то осенью, то весною (впрочемъ весною встрѣчается чаще) то лѣтомъ, то зимою, то нѣсколько разъ въ годъ покажется, то не показывается по нѣскольку лѣтъ. Я зналъ одну особу, которая ежегодно подвергалась этой болѣзни и сыпь была почти на всемъ тѣлѣ; это случалось, то зимою, то весною, то въ другія времена года и обыкновенно послѣ сильнаго катарра. Она не обращала на это никакого вниманія, не употребляла ничего противъ болѣзни, мыла



только все тѣло и зимой и лѣтомъ водою, и сыпь каждый разъ исчезала въ скоромъ времени сама собою. Всего непріятнѣе въ этой болѣзни была для нея зудъ, жжение, колотье, которые особенно увеличивались при сильномъ движеніи. Такъ какъ большею частію сыпь показывается послѣ простуды, слѣдовательно во 1-хъ это обстоятельство, потомъ невоздержаніе въ пищѣ (употребленіе соленого кушанья, земляники, раковъ и т. п.) суть главные причины этой болѣзни.

Главные противъ нея средства суть: Sulphur принимаемое въ продолженіи 14 дней по приему черезъ день, которое можетъ радикально излѣчить эту болѣзнь. Если простуда была причиною болѣзни, то полезна Dulcamara; если притомъ сильный насморкъ. Нераг Sulphuris. При сильной головной боли и краснотѣ лица помогаетъ Belladonna. Полезны также Nux vomica и Rhus toxicodendron; разумѣется и здѣсь, особенно при сыпи безъ лихорадки, холодная вода есть лучшее средство. (См. что объ этомъ сказано при *Просовидной сыпи*).

### ТРУДНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ РОДЫ.

Не всегда роды совершаются легко и правильно; часто бываютъ они очень тяжелы, а иногда сопровождаются обстоятельствами, которыя дѣлаютъ ихъ чрезвычайно трудными. Дурнымъ предзнаменователемъ трудныхъ родовъ бываетъ кровотеченіе во время беременности, и въ этомъ случаѣ необходимо совѣтоваться съ врачомъ. China служитъ очень хорошимъ средствомъ для остановленія дальнѣйшаго кровотеченія. Для этой цѣли надо принимать черезъ день по 2

капли этого лекарства въ водѣ и избѣгать всякаго быстраго и сильнаго движенія. Можно посовѣтовать также покойное положеніе. Но никакъ не должно останавливать кровотеченія закладываніемъ губкою, какъ это обыкновенно дѣлаютъ. Конечно такое закладываніе можетъ остановить кровь, но скопившаяся остановленная кровь производитъ другіе болѣе опасныя припадки. Можно также взять 2 капли коричневой тинктуры размѣшать ихъ хорошенько въ чашкѣ воды и принимать по чайной ложкѣ какъ скоро кровотеченіе возобновится. Хорошо также взять просто въ ротъ кусочекъ корицы, и жевать его. Если родовыя боли очень сильны и не выносимы, между тѣмъ, какъ роды не подвигаются впередъ, то дать Coffea cruda; если же это только увеличиваетъ боль, не содѣйствуя родамъ — дать Aconitum Napellus. Если и это не поможетъ, дать Belladonna. При сильномъ позывѣ на низъ поможетъ Nux vomica. Когда же потуги очень слабы, или совершенно прекращаются, такъ что задерживаютъ самый ходъ родовъ, то дать 2—3 приема Pulsatilla, а при неэффективности этого средства — Secale cornutum; при совершенномъ упадкѣ силъ и трясеніи членовъ, — Opium. Я знаю случай, гдѣ потуги роженицы слѣлались такъ слабы, что ни Pulsatilla, ни даже Opium не могли возстановить упавшихъ силъ ея и произвести новыя потуги, я велѣлъ тогда сварить въ крутую яича и пить воду, въ которой они варились, когда она нѣсколько поостынетъ: это часто производило желаемое дѣйствіе; но въ настоящемъ случаѣ и это не помогло; тогда я предписалъ больной принять четверть бутылки хорошаго стараго вина, выпивая по столовой ложкѣ чрезъ каждыя пять минутъ. Черезъ полчаса, послѣ послѣдняго приема

снова наступили потуги, и до того сильныя, что послѣ вѣсколькихъ тяжелыхъ напряженій, она скоро и благополучно разрѣшилась отъ бремени.

### ВОСПАЛЕНІЕ ПОЧЕКЪ.

Воспаленіе почекъ, то есть красныхъ мясистыхъ, бобообразныхъ органовъ, состоящихъ изъ кровеносныхъ и мочевыхъ сосудовъ, и находящихся ниже послѣдняго ложнаго ребра, бываетъ слѣдствіемъ или внезапно прерваннаго геморроя, ломоты, накожной сыпи, или раздраженія почекъ почечными камнями. Оно обнаруживается то жгучею болью въ сторонѣ почекъ, то недостаточною, жгучею, часто кровавою или водянистою мочею, то совершеннымъ задержаніемъ ея. Въ такомъ случаѣ можетъ легко случиться смертельное воспаленіе почекъ. Обыкновенно воспалена бываетъ только одна почка, причемъ опасность не такъ велика; но если обѣ почки воспаляются, то отдѣленіе мочи совершенно останавливается, нижняя часть живота высоко вздувается, испражнений не бываетъ, наступаетъ удушье и рвота. Эта болѣзнь въ высшей степени острая, и требуетъ скорой помощи свѣдущаго врача; но, до его прибытія можно дать тѣсколько пріемовъ *Aconitum Napellus*, чтобъ уменьшить воспаленіе и 3—4 пріема *Cantharides*. Если болѣзнь произошла отъ прерваннаго геморроя то дать *Nux vomica*; при остановкѣ у женщинъ регуловъ — *Pulsatilla*. Врачъ довершитъ остальное. — Большую пользу приносятъ здѣсь холодная вода. Больной долженъ пить ее, но не очень много, чтобы не слишкомъ увеличить

накопленіе воды въ мочевомъ пузырьѣ и вообще больше употребляютъ еѣ наружно. Если выходитъ хоть сколько нибудь мочи, хотя и съ болью, тогда можно болѣе пить холодной воды и держать половые органы въ сосудѣ, наполненномъ холодною водою, отъ чего очень усиливается отдѣленіе мочи. Стоитъ только испытать это при совершенномъ здоровьи и легко можно убѣдиться, что виѣшній холодъ отъ воды производитъ скорое и сильное отдѣленіе мочи.

### ОБМОРОКЪ.

Обморокъ есть внезапное лишеніе чувствъ и движенія, мгновенная остановка дѣятельности нервной системы, и самъ по себѣ не опасенъ, но можетъ слѣзаться таковымъ, если онъ есть слѣдствіе другой, глубоко лежащей въ организмѣ, болѣзни. Приближеніе обморока обозначается внезапною общею слабостью, лишеніемъ чувствъ, слабостію дыханія и пульса, и страшною блѣдностью лица. Слабые, въ высшей степени раздражительные, склонные къ ипохондріи мушины, истерическія женщины, дѣвицы, страдающія дѣвичьею немочью (*Chlorosis*), особы, потерявшіе много крови, или растратившіе свои силы, страдавшіе сильными поносами, особы съ сильно воспримчивой душой всего чаще страдаютъ обмороками. Имъ подвержены также тѣ особы которыя въ узкихъ платьяхъ, корсетахъ, туго перетянутыя поясами, предаются быстрымъ движеніямъ напримѣръ прогулкѣ по жару, танцамъ — и тѣмъ волнуютъ кровь. Голодъ можетъ также вести за собою

обморокъ. Никогда не должно пугаться при видѣ обморока. Надобно тотчасъ уложить больного въ покойное положеніе, растегнуть или расшнуровать его платье, спрыснуть ему лицо и виски холодною водою, растирать щеткою подошвы и потомъ перышкомъ пощекотать въ носу. Если есть подъ рукою камфорный спиртъ, то поднести его къ носу больного и немного потереть имъ ему лобъ и виски. Также хорошо вынести его на свѣжій воздухъ, или поднести къ раскрытому окну, чтобы свѣжій воздухъ пахнулъ на него. Гомеопатическія средства въ этомъ случаѣ суть: *Opium*, если внезапный испугъ былъ причиною обморока; тогда должно это лѣкарство поднести къ носу больного, дыханіе котораго хотя и слабо, но все таки продолжается. Если же причиною обморока была значительная слабость тѣла, произшедшая или вслѣдствіе продолжительнаго кормленія младенца грудью у родильницъ, или вслѣдствіе частыхъ кровопусканій, сильныхъ кровотеченій изъ матки, кровохарканія и кровоизліяній, послѣ продолжительнаго поноса (*Diarrhoea*), послѣ большой потери сѣмани и т. п.; въ такомъ случаѣ лучшимъ средствомъ противъ обмороковъ служить *China* въ нѣсколькихъ приѣмахъ. Если же причиною припадка была инсепхондрія, или истерика, то даютъ *Moschus*. При обморокахъ послѣ сильныхъ душевныхъ волненій и потрясеній, помогаютъ *Chamomilla* и *Ignatia amara*. Иногда обморокъ случается въ слѣдствіе сильной боли отъ ранъ, тогда употребляютъ *Arnica montana*, попеременно съ *Hepar Sulphuris*, а если эти средства не помогутъ, то *Veratrum album*. Обморокъ отъ сильного удара, паденія, устраняется посредствомъ *Arnica montana* и обливаньемъ холодною водою. Послѣ обморока должно дать боль-

ному покой. Что при обморокахъ съ большимъ успѣхомъ употребляется также холодная вода, въ этомъ никто не сомнѣвается, и объ этомъ было уже здѣсь упомянуто; но я считаю не лишнимъ прибавить, что при обморокахъ хорошо и полезно класть холодные компрессы на животъ.

### ШУМЪ ВЪ УШАХЪ.

Это весьма тягостное и непріятное ощущеніе, иногда даже соединенное съ болью, особенно когда при этомъ бываетъ еще стрѣльба въ ушахъ. Оно происходитъ отъ сильнаго прилива крови къ головѣ, и состоитъ въ непрерывномъ шумѣ, звонѣ, трескѣ въ ушахъ. Обыкновенно эта болѣзнь зависитъ отъ какой нибудь другой болѣзни, и очень рѣдко бываетъ отдѣльно. Въ послѣднемъ случаѣ почти всегда причиною ея бываетъ простуда. Здѣсь помогаютъ *Dulcamara* и *Nux vomica*. Если шумъ въ ушахъ соединенъ съ сильной глухотой то давать *Mercurius solubilis* попеременно съ *Acidum phosphoricum*. Если онъ очень болѣзненъ, дать *Antimonium crudum*. Если въ ушахъ слышится какъ бы буря или сильный вѣтеръ, — *Veratrum album*. Если же причиною шума скопленіе затвердѣлой сѣры, то долгое время надо употреблять *Calcarea carbonica*. Если онъ зависитъ отъ сѣры, хотя и не затвердѣлой, то проходитъ отъ теплыхъ паровъ, вводимыхъ чрезъ трубочку въ уши; полезно также чистить уши костяною ухверткой: этимъ уничтожается не только непріятный шумъ въ ушахъ, но и тягостная глухота. Я зналъ одного человѣка, который первоначально пользовал-



ся прекраснымъ слухомъ, и не имѣлъ никакого понятія о шумѣ и звонѣ въ ушахъ; онъ получалъ его внезапно и сталъ слышать очень дурно. Онъ испытывалъ много лѣкарствъ, въ томъ числѣ и гомеопатическихъ, но все было напрасно; посоветовали ему пускать въ уши горячіе пары отвара ромашки. Онъ попробовалъ это, и все таки по пустому. Тогда я ощущалъ больное ухо ухверткою. Въ немъ оказалась цѣлая куча грязи и нечистоты. Я по возможности вынулъ изъ уха сѣру; слухъ не возвращался и шумъ оставался по прежнему. Тогда я проникъ ухверткою по возможности глубже въ ухо, нажималъ ею, перевертывая ее и вдругъ пациентъ мой вскрикнулъ отъ радости; шумъ его исчезъ и онъ сталъ слышать по прежнему хорошо. Потомъ онъ самъ, по моему наставленію, чистилъ себѣ ухо этою ухверткою и вновь вытащилъ оттуда множество сѣры. Слуховой проходъ былъ совершенно заложенъ сѣрою. У сколькихъ больныхъ, болѣзнь зависитъ отъ той же самой причины! Вычистивши сѣру, должно всякій день мыть уши, впускать воду внутрь уха, и тщательно вытирать его снаружи, чтобы болѣе укрѣпить.

### ВОСПАЛЕНИЕ УХА.

Это воспаление, особенно внутреннихъ частей уха, въ высшей степени болѣзненное доводитъ иногда больного до бреда и можетъ даже причинить воспаление мозга. Боль эта похожая на сверленіе сопровождаемое жжениемъ, стукомъ, причиняетъ лихорадку, беспокойство, тоску, судороги. Должно принять

два, три приема *Belladonna*, мыть и мочить ухо въ самой холодной водѣ какъ можно долѣе; класть холодныя компрессы на ухо и впускать въ него воду. Вышнее воспаление уха, которое легко узнается по сильной краснотѣ, опухоли, по жару и боли при малѣйшемъ прикосновеніи къ уху, — устраняется нѣсколькими приемами *Pulsatilla* и сей часъ описаннымъ лѣченіемъ холодною водою.

### СТРѢЛБА ВЪ УШАХЪ.

Стрѣлба въ ушахъ есть, въ высшей степени, нестерпимая боль, рѣшительно не дающая больному покоя. Боль эта очень сильна, сопровождается колющемъ, сверленіемъ и стукомъ, и распространяется до самой мочки уха. Иногда эта боль походитъ на рѣзаніе ножомъ. Эта болѣзнь или бываетъ самостоятельно или сопровождается какую нибудь другую болѣзнь. Къ послѣднему случаю принадлежитъ стрѣлба въ ушахъ, происходящая отъ сильной зубной боли, и вмѣстѣ съ нею исчезающая; собственно же стрѣлба въ ушахъ происходитъ большею частію отъ сильной простуды, и излѣчивается посредствомъ *Chamomilla*, когда боль распространяется до самыхъ мочекъ и производитъ въ больномъ раздражительность и чувствительность духа. *Agnica montana* полезна при частомъ возобновленіи этой болѣзни, когда вмѣстѣ съ тѣмъ колебъ, рветъ, жметъ и жжетъ въ ухѣ. Если ухо мокнетъ и потѣетъ, боль распространяется отъ уха къ щекѣ, то употребляется *Mergisius vivus*. Если причиною боли ревматизмъ и боль сопровождается подергиваніемъ и рѣвомъ, и распро-

страняется на всю щеку, то помогает *Pulsatilla*, въ особенности женщинамъ и людямъ слезливымъ. *Belladonna* помогаетъ въ томъ случаѣ, когда сказанная боль сопровождается шумомъ въ ушахъ и отдается даже въ голову и глаза.

Иные получаютъ облегченіе, когда больное ухо обматываютъ на болье или менѣе долгое время сѣрыми нитками. Холодная вода и тутъ приноситъ большую пользу, если чаще мыть ею ухо, выпрыскивать въ него холодную воду, и класть на него намоченныя ею салфетки и пить ее какъ можно болѣе.

#### ПОДАГРА СМОТРИ ЛОМОТА.

#### СКАРЛАТИННАЯ ПРОСОВИДНАЯ СЫПЬ.

Красная или скарлатинная просовидная сыпь есть болѣзнь, которой подвергаются люди всѣхъ возрастовъ, и состоитъ изъ огненно-красныхъ пятенъ, плотно усыпанныхъ мелкою, вишневаго цвѣта сыпью. Эта сыпь показывается не только на кожѣ, но иногда глубоко входитъ въ нее и болѣе замѣчается осязаніемъ нежели глазами. Красныя пятна остаются красными и при давленіи пальцемъ, и этимъ то именно отличается просовидная скарлатинная сыпь отъ собственно такъ называемой скарлатины, при которой красный цвѣтъ кожи отъ давленія пальцемъ пропадаетъ и она дѣлается бѣлою, но тотчасъ же по отнятіи пальца снова краснѣетъ. Просовидная скарлатина поражаетъ большею частію закрытыя части тѣла и особенно сгибы и мягкія части сочле-

неній; она бываетъ безъ опухоли, иногда мокнетъ, и чаще всего поражаетъ шею.

Такъ какъ въ этомъ случаѣ помощь гомеопатическаго врача весьма необходима, то я позволяю себѣ наименовать здѣсь одни только специфическія средства: *Aconitum Napellus* ежедневно по приему въ продолженіи 5—6 дней, *Sulphur*, *Rhus toxicodendron*, *Coffea cruda*, *Belladonna*; послѣднее средство въ особенности полезно, если самая шея и желѣзы, на ней лежащія, сильно воспалены, когда ощущается сильная боль и судорожное сжатіе, притомъ сильная жажда, воспаление глазъ, отвращеніе отъ свѣта, красный и сухой языкъ, бессонница, или частое пробужденіе отъ сна. Но обыкновенно достаточно бываетъ *Aconitum* и *Rhus toxicodendron*. Вода и при этой воспалительной болѣзни играетъ важную роль, но употребляется по совѣту врача и только тогда, когда сыпь дурно высыпаетъ. Въ такихъ случаяхъ больного должно заставить пить больше воды, потомъ посадить его въ ванну, и поливать на него; а дѣтей класть на животъ и выливать такимъ образомъ на нихъ около двухъ ведеръ воды съ головы; потомъ завернуть въ теплое шерстяное одѣяло и положить въ постель; сыпь высыпаетъ гораздо скорѣе и послѣдуетъ скорѣе облегчительный потъ, боль въ шеѣ и въ головѣ, и вообще во всемъ тѣлѣ умѣрится и больной сдѣлается бодрѣе. Поливаніе это должно ежедневно повторяться до самаго періода шелушенія кожи; наоборотъ, если сыпь выступила очень сильно, то обливаніе должно повторять 3—4 раза въ день. Многие назовутъ леченіе этой болѣзни холодною водою безумствомъ, предполагая, что сыпь скроется отъ того снаружи внутрь и падетъ на самыя благородныя органы тѣла, но они, не испы-

тавъ этого на опытѣ, будутъ произносить свой судъ, который человѣку, увѣрившемуся въ противномъ продолжительнымъ опытомъ, покажется невѣжествомъ, недоброжелательствомъ.

### УШИБЫ, ПОМЯТІЯ, ССАДИНЫ.

Всякое внѣшнее поврежденіе какой нибудь части тѣла, происшедшее отъ сильнаго нажатія, удара паденія, и не образовавшее раны, называется помятіемъ; слѣдствіемъ помятія бываетъ воспаленіе, которое, по прошествіи нѣкотораго времени переходитъ въ нагноеніе. Главныя средства противъ этого: внутрь и снаружи *Arnica montana*. Принимаютъ 2—3 приема этого лѣкарства въ продолженіи 5—6 часовъ; кладутъ компрессы, смоченные въ холодной водѣ, къ которой примѣшиваютъ *Arnica* ( $\frac{1}{2}$  бутылки воды и 50 капель тинктуры изъ *Arnica montana*) и чаще повторяютъ это. Если помятіе бываетъ велико и значительно, если послѣ него оказывается сильная лихорадка, то даютъ *Aconitum Napellus*. Если повреждены и ушибены кости, то кладутъ компрессы съ холодной водой, смѣшанной въ показанномъ выше при *Arnica montana* количествѣ съ *Symphitum officinale* и повторяютъ это до тѣхъ поръ, пока боль не уймется, и поврежденіе не уничтожится. Если ушибъ силенъ и при немъ особенно пострадала грудь, то помогаетъ *Aconitum* попеременно съ *Arnica*, продолжительное обмываніе груди самою холодною водою и холодные компрессы. Если при томъ появляется кровохарканіе, то принимаютъ *China* попеременно съ *Pulsatilla*. Если совѣстливо будутъ испол-

нять такого рода лѣченіе при ушибахъ, пораженіи груди и кровохарканіи, то вода воспрепятствуетъ образованію опухоли и воспаленію и ускоритъ выздоровленіе.

### РЕВМАТИЗМЪ.

Эта боль, похожая на ломоту, можетъ поражать почти всякій членъ тѣла и переходить изъ одной части тѣла въ другую; случается во всякое время, во всякомъ возрастѣ и происходитъ большею частію отъ сильной простуды. Мѣсто, пораженное ревматизмомъ отъ простуды, бываетъ сильно раздражено и это воспалительное раздраженіе причиняетъ ревматическую боль. И такъ въ такомъ случаѣ эта боль называется ревматическимъ воспаленіемъ. Если это воспаленіе обнаруживается явнѣ опухолью, краснотой и жаромъ пораженной части и сопряжено съ лихорадкою, то называется ревматическою лихорадкою. Смотри потому, отъ чего происходитъ ревматическая боль: отъ катарральной, лихорадочной, скорбутной, чесоточной или раковой остроты, ревматизмъ раздѣляется на катарральный, лихорадочный, скорбутный и т. д. Точно также, смотря по той части тѣла, на которой онъ находится, ревматизмъ получаетъ названія: шейной, головной, зубной, грудной, ручной и т. д. Онъ особенно случается во время перехода зимы къ веснѣ, отъ лѣта къ осени, и въ болѣе части случаевъ основаніемъ ему служитъ простуда, но и сказанныя находящіяся въ тѣлѣ остроты могутъ причинить его. Такъ какъ ревматизмъ есть воспалительная боль, то даютъ три приема *Aconit-*



tum Napellus, каждый вечеръ по двѣ капли; потомъ если оказывается красноватая, сильная опухоль съ опѣмѣніемъ, — *Bryonia alba*. Если поражена голова, шея, колѣни, которые, то пухнуть, то опадаютъ, и больной чувствуетъ въ этихъ мѣстахъ сильную боль, то помогаетъ *Belladonna*; она же полезна и при сильной зубной боли. Если ревматическая боль въ томъ или другомъ членѣ усиливается, особенно ночью, и боль эта сопряжена съ подергиваніемъ и расслабленіемъ то даютъ *Chamomilla* днемъ и *Pulsatilla* вечеромъ. Если боль сосредоточена болѣе въ спинѣ, плечахъ и груди, то даютъ *Nux vomica*, если же страдаютъ болѣе кости, то *Mercurius vivus*, служитъ специфическимъ средствомъ. *Dulcamara* оказывается главнымъ средствомъ, когда ее принимаютъ тотчасъ за появленіемъ ревматизма отъ простуды. Если эта боль хроническая, если она произведена сказанными острыми соками, то употребляется антипсорическое (\*) лѣченіе т. е. посредствомъ *Sulphur*. Но лучше всего здѣсь довѣриться врачу. Несравненно скорѣе и вѣрнѣе идетъ лѣченіе, если съ приведенными гомеопатическими средствами употребляютъ холодную воду; въ этомъ отношеніи недостаточно только пить много холодной воды, но также надобно мыть и растирать ею пораженные ревматизмомъ части и ежедневно брать по крайней мѣрѣ 2 холодныя ванны (См. Ломота, на стр. 145).

(\*) Антипсорическими называются лѣкарства противъ кожныхъ болѣзней (сыпей и проч.).

## РОЖА.

Рожа есть поверхностное, блѣдно-красное, желтоватое, мѣстное воспаление, — проявляющееся опухолью, жаромъ и зудомъ кожи. Рожа можетъ поражать всякую часть тѣла, продолжается нѣсколько дней и потомъ скрывается. Если придавить пораженное рожею мѣсто пальцемъ, то краснота пропадаетъ, кругомъ пальца образуется блѣлое пятно, но краснота тотчасъ возобновляется, какъ скоро отнять палецъ. Новорожденные дѣти, слабонервные особы, часто страдающіе заноромъ, всего чаще бываютъ подвержены этой болѣзни. Она не опасна, но можетъ сдѣлаться такою, если къ ней присоединится сильная лихорадка. Въ послѣднемъ случаѣ даютъ нѣсколько приѣмовъ *Aconitum Napellus*, а *Belladonna*, въ томъ случаѣ, если рожа распространяется лучеобразно, пораженные ею части сильно напряжены и чувствуется колючая боль. Если преимущественно поражены суставы, и боль въ нихъ отъ всякаго движенія усиливается, дать *Bryonia alba*. *Pulsatilla* служитъ специфическимъ средствомъ, когда рожа переходитъ съ одного члена на другой. Лицевая рожа сама по себѣ тоже не опасна, но можетъ сдѣлаться опасною, особенно если на ней образуются пузыри потому, что тогда обыкновенно присоединяется къ ней еще другое болѣзненное измѣненіе въ организмѣ (въ животѣ). Всего лучше призвать въ такомъ случаѣ доктора, но предварительно можно принять нѣсколько приѣмовъ *Rhus toxicodendron*. Рожѣ всегда предшествуютъ усталость, лѣнь къ работѣ, тягость въ членахъ, тоска, тяжесть въ желудкѣ, тошнота,

рвота и ознобъ, за которыми слѣдуетъ наконецъ сильная лихорадка.

Можно привести еще много средствъ противъ лицевой рожи, но ихъ можетъ назначить призванный докторъ. Противъ рожи холодная вода, употребляемая не иначе какъ подъ руководствомъ опытнаго врача, производитъ самое скорое и благопріятное дѣйствіе. Докторъ Ганъ пишетъ: «Я часто видалъ, что рожа не только на ногахъ, но даже и на лицѣ, отъ холодной воды проходила благополучно въ нѣскольکو дней, не причиняя никакого вреда на кожѣ, ни внутреннимъ органамъ, на противъ присыпаніе рожи розовымъ или бѣлымъ порошкомъ или намазываніе жирными и масляными мазями и пластырями, только закрываетъ потовые поры, уменьшаетъ испарину, увеличиваетъ боль, и возбуждаетъ кожу къ нарыванію, а отъ спиртныхъ примочекъ она воспаляется, лупится. Вообще подобныя пачканья, если не совершенно препятствуютъ леченію, то затрудняютъ и замедляютъ его. — Многіе врачи сомнѣваются въ цѣлебномъ свойствѣ воды, но, говоритъ Д-ръ Ганъ далѣе, я, какъ честный человѣкъ, могу засвидѣтельствовать, что никогда, въ подобныхъ случаяхъ, отъ мытья холодною водою, не проходило ни малѣйшаго вреда, но всякій разъ, когда употребляли ее непрерывно и какъ слѣдуетъ, всегда была очевидная польза, и, если не послѣдовало желаннаго дѣйствія, то или потому, что пораженное рожею мѣсто, изъ неумѣстной осторожности, совершенно не мыли водою, или, употребляли воду горячую или теплую, вмѣсто холодной, или слишкомъ мало времени продолжали лѣченіе.» Докторъ Кольбъ въ Вюрцбургѣ излѣчилъ себя лицевую рожу въ 10 дней питьемъ холодной воды и холодными примочками. Точно такимъ же обра-

зомъ Д-ръ Рейсъ (въ Ашафенбургѣ) избавилъ отъ рожи себя и еще около 20 человѣкъ въ продолженіи 5—6 дней; у него тогда было очень много визитовъ какъ въ городѣ, такъ и въ деревнѣ, и не смотря на рожу, и пузыри, до того распространившіеся и распухшіе, что у него почти закрылся одинъ глазъ, онъ ежедневно, даже ночью, умывался холодною водою каждыя 2—3 часа, гдѣ бы онъ не былъ, даже на дорогѣ, и въ 5—6 дней совершенно выздоровѣлъ. Тоже самое было и съ докторомъ Эртелемъ и не только рожа на лицѣ, но даже и на ногахъ излѣчивалась холодною водою, только не нужно ни въ какомъ случаѣ прерывать питье и обмыванье лица или другихъ пораженныхъ рожею частей свѣжею холодною водою (что надо дѣлать каждыя 2 часа), и исцѣленіе совершится въ самое короткое время, безъ всякихъ дурныхъ послѣдствій.

### КРАСУХА.

Красуха, подобно кори, есть особеннаго рода сыпь; нельзя сказать чтобы она составляла средину между корью и скарлатиною: она скорѣе есть особенный видъ скарлатины, ибо здѣсь горло бываетъ сильно поражено, какъ и въ скарлатинѣ и сыпь бываетъ продолжительнѣе и темнѣе. Она случается только одинъ разъ въ жизни, и именно у дѣтей и женщинъ; поражаетъ обыкновенно большею частію все тѣло, а на лицѣ бываетъ, или очень мало, или совершенно не бываетъ. Она скоро проходитъ и не оставляетъ послѣ себя красныхъ пятенъ. Легкая лихорадка, слабость во всѣхъ членахъ, потеря аппетита,

жаръ въ вѣкахъ и въ рукахъ предшествуютъ этой болѣзни; за тѣмъ уже выступаютъ гладкія, красноватые, неправильныя, угловатыя, остроконечныя пятна, величиною въ перерѣзанное просяное зернышко; эти пятна свѣтлѣе, нежели въ кори и темнѣе, нежели въ скарлатинѣ; нѣсколько дней спустя на каждомъ изъ нихъ образуются маленькіе, содержащіе въ собѣ бѣловатую жидкость, пузырьки, которые чрезъ 6—8 дней подсыхаютъ; послѣ чего краснота совершенно проходитъ и начинается лупленіе кожи. Вообще красуха не опасна; лихорадка при ней бываетъ слегка воспалительнаго свойства, а потому лѣчение ея можно предоставить самой природѣ; при сильнѣйшей же лихорадкѣ надо давать 2—3 приема *Aconitum Napellus*. Если воспаление горла сильное, то достаточно дать 2—3 приема *Belladonna*, попеременно съ *Mercurius vivus*. Какъ лѣчить эту болѣзнь водою, смотри выше при *скарлатинной просовидной сыпи*, стр. 240. Вода и здѣсь полезна: она быстро устраняетъ лихорадку и воспаление горла.

### КРОВАВЫЙ ПОНОСЪ.

Это — болѣзнь слизистой оболочки заднепроходной (прямой) кишки и бываетъ ревматическо — катаральнаго и воспалительнаго свойства. Колики и обыкновенный поносъ предшествуютъ этой болѣзни, и продолжаются 8—9 дней. При поносѣ выходитъ очень много слизи, которая сильно окрашена, или смѣшана съ кровью, если поносъ принимаетъ воспалительный характеръ. Если при сильной коликѣ не бываетъ вовсе испражнений, то такую болѣзнь назы-

ваютъ сухимъ поносомъ (подобно тому какъ другіе роды поноса называются простымъ (бѣлымъ) и кровавымъ); онъ большею частію происходитъ отъ простуды, и почти всегда при переходѣ отъ лѣта къ осени; бываетъ также отъ нездоровой пищи, объяденія, отъ употребленія незрѣлыхъ плодовъ, что часто случается съ дѣтьми. Эта болѣзнь заразительна, и потому должно удалять здоровыхъ дѣтей отъ тѣхъ, которые страдаютъ кровавымъ поносомъ. Изверженія въ высшей степени отвратительнаго запаха и это способствуетъ заразительности болѣзни; по этому надо чаще (послѣ каждого употребленія) мыть золою урильники и посыпать березовымъ углемъ отхожія мѣста. Совѣтуютъ употреблять слизистые и теплые, но никакъ не спиртные, напитки; больной долженъ беречься новой простуды, и держать въ теплѣ нижнюю часть живота и ноги. Специфическія гомеопатическія средства суть слѣдующія: если съ кровавымъ поносомъ соединена лихорадка и сильное воспаление, то даютъ *Aconitum* 1—2 приема и потомъ *Chamomilla*. Если выходитъ слизь перемѣшанная съ кровью, — *Pulsatilla* и *Colocynthis*. Если поносъ соединенъ съ коликами, испражнения пахнутъ гнилью, притомъ дурной запахъ изъ рта то даютъ *Arsenicum album*. Если чувствуется, что какъ будто самыя кишки при испражненіи выходятъ вонъ и притомъ выходитъ много свѣтлой крови, то даютъ *Mercurius vivus*. Какъ окончательное средство даютъ *Sulphur*, и для укрѣпленія очень ослабѣвшихъ частей *China*. Что же касается до лѣченія водою, то она приноситъ очень большую пользу, но не должно ее употреблять иначе какъ по назначенію врача.



## СКАРЛАТИНА.

Скарлатина есть острая, прилипчивая, накожная сыпь, имѣющая свѣтло красный цвѣтъ, распространяющаяся по всей поверхности кожи, соединенная съ сильною лихорадкою и воспаленіемъ горла, и очень часто слѣдствіемъ ея бываетъ подкожная водянка. Лихорадка тѣмъ опаснѣе, чѣмъ сильнѣе краснота тѣла. Предшествующіе признаки суть: дрожь, ознобъ попеременно съ жаромъ, безпокойство, твердый ускоренный пульсъ, жажда, бессонница, потеря аппетита, сухость и жаръ въ кожѣ, сухость во рту и горлѣ, трудность глотанія. Эти припадки продолжаются около 2 дней, послѣ нихъ начинается зудъ, жаръ и покалываніе въ кожѣ, потомъ, въ особенности въ верхнихъ частяхъ тѣла, показывается сыпь въ видѣ большихъ, или меньшихъ ярко-красныхъ пятенъ, распространяется все болѣе и болѣе, и наконецъ до того, что одно пятно сливается съ другимъ. Кожа вспухаетъ, и только на нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ то: подъ мышками и на частяхъ, покрытыхъ волосами, не бываетъ опухоли. Лихорадка усиливается все болѣе и болѣе, глотка воспаляется и потому глотаніе очень затрудняется. Пораженные скарлатиною мѣста обыкновенно бываютъ сухи, и въ продолженіи всей болѣзни на нихъ не бываетъ пота и только по минованіи красноты выступаетъ потъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ кожа начинаетъ лупиться. Даже внутреннія ткань полости рта, желѣзъ, небной занавѣски, язычка, глотки и даже носовой полости покрывается ярко-красными пятнами,

тѣсно усеянными, воспалительными пузырьками, а иногда молочницею и нарывчиками, и причиняетъ жгучую боль и затрудняетъ глотанье. Но эту болѣзнь ни какъ нельзя смѣшивать съ скарлатиною просовидною сынью и также съ корью. Скарлатина — прилипчивая, заразительная, не рѣдко эпидемическая болѣзнь — случается только разъ въ жизни, и болѣею частію поражаетъ дѣтей до десятилѣтняго возраста, а въ старшемъ возрастѣ поражаетъ только слабыхъ женщинъ, роженицъ, и очень рѣдко мужчинъ. Болѣею частію болѣзнь эта появляется осенью или зимою. Болѣзнь эта длится вообще около трехъ или четырехъ недѣль и болѣе. Шелушеніе кожи продолжается иногда нѣсколько недѣль. Въ слѣдъ за скарлатиною часто слѣдуютъ другія опасныя болѣзни, изъ которыхъ самая худшая подкожная водянка. Главнѣйшее средство — *Belladonna*, которая можетъ служить и предохранительнымъ и цѣлительнымъ лѣкарствомъ. Прежде всего дать пріемъ *Aconitum Napellus*, если есть сильная лихорадка. Какъ предохранительное средство *Belladonna* должна быть принимаема черезъ каждые 3—4 дни по одной каплѣ въ день. Какъ цѣлительное средство, должно быть принята только однажды. Противъ слѣдующей за нею подкожной водянки употребляютъ *Arsenicum album* попеременно съ *Helleborus niger*. Противъ воспаления ушей и истеченія изъ нихъ даютъ *Belladonna*, *Hepar Sulphuris*, *Mercurius solubilis*. При костоѣдѣ *Calcareo carbonica*, *Natrum muriaticum*, *Silicea*, а также *Augum*. При очень сильномъ жарѣ, спячкѣ, или безчувственности, рвотѣ, поносѣ, спазмахъ даютъ *Opium*. Вода употребляется точно также, какъ и при скарлатиною просовидной сыни.

## БЕЗСОННИЦА.

Бессонница сама по себѣ не есть болѣзнь, но только симптомъ другой какой нибудь скрывающейся въ организмѣ болѣзни, съ окончаніемъ которой она сама собою проходитъ. Сильное волненіе крови, жестокая боль, сильная лихорадка, сильныя душевныя ощущенія, происходящія отъ досады, горя, ужаса производятъ бессонницу. Во многихъ случаяхъ она проходитъ уже отъ переменъ образа жизни: умѣренности въ пищѣ, большаго моціона, воздержанія отъ всякихъ спиртныхъ напитковъ, употребленія пищи задолго до сна, воздержанія отъ сна днемъ, отъ обильнаго питья воды. Кофе и крѣпкаго чаю не должно пить, потому что они слишкомъ возбуждаютъ кровь. Кто склоненъ къ грусти или печали, тотъ долженъ стараться побѣдить въ себѣ эту склонность, стараясь разсѣиваться, или пріятнымъ обществомъ или чтеніемъ, возбуждающимъ веселость; смотря по причинамъ, произведшимъ бессонницу, употребляютъ противъ нея слѣдующія гомеопатическія средства, если причиною ея были: печаль, грусть, большія заботы и опасенія, то даютъ три вечера сряду по 2 капли *Ignatia amara*; страхъ или испугъ — *Opium*; страхъ и досада вмѣстѣ — *Asopitum Napellus*; одна досада — *Chamomilla*. Бессонница, вслѣдствіе излишняго употребленія волнующихъ кровь, напитковъ, какъ то: кофе, чая, вина и тому подоб., проходитъ отъ *Nux vomica*; а происшедшая вслѣдствіе излишняго употребленія пищи — отъ *Pulsatilla*. Старымъ людямъ, которые не спятъ отъ слабости, помогаетъ *Opium*.

Вѣрнѣе всего можно избавиться отъ бессонницы умѣренностью въ пищѣ, продолжительными прогулками и обильнымъ питьемъ холодной воды; также полезны мытье и купанье.

## ИКОТА.

Икота происходя отъ судорожнаго сжатія грудобрюшной преграды, есть особенное движеніе дыхательныхъ органовъ и производитъ довольно мучительное состояніе, особенно у дѣтей: бываетъ большею частію отъ простуды, а иногда отъ скорого и неумѣреннаго питья. Она неопасна; не нужно даже употреблять противъ нея никакихъ средствъ, только грудныхъ дѣтей надобно держать въ теплѣ, давать имъ грудь. А если икота произошла отъ сильнаго питья, то минуты на двѣ отнять дитя отъ груди. Также и у взрослыхъ особъ случается икота, если они употребляли много холоднаго питья и если пили очень скоро. Растираніе рукою мѣстности желудка помогаетъ при этомъ; или взять не большой стаканъ воды и пить ее медленно не отнимая стакана ото рта и въ продолженіи питья водить кругомъ дна стакана булавкою. Я часто испытывалъ это средство надъ собою и надъ другими, и всегда оно удавалось; не извѣстно на чемъ оно основывается, но опытъ говоритъ за него.

## НАСМОРКЪ.

Такъ называется сильное истеченіе изъ носа, которое сначала бываетъ водянисто, а потомъ дѣлается

гуще; часто становится оно гноеобразно и зловонно; отдѣляется оно изъ слизистой оболочки носовой полости и верхней челюсти, и часто бываетъ слѣдствіемъ сильнаго ея пораженія. Должно отличать описанный здѣсь текущій насморкъ отъ сухаго. Последний обыкновенно бываетъ соединенъ съ сильною головною болью и съ большею или меньшею лихорадкою. Иногда бываетъ также поражена и глотка, и это обнаруживается катарромъ, при чемъ у больного дѣлается хрипота и шепотаніе въ гортани, производящее кашель; вообще онъ безопасенъ и проходить самъ собою, а при правильной діетѣ даже очень скоро. Не слѣдуетъ его тотчасъ останавливать; многіе думаютъ, что при насморкѣ необходимо: не выходить изъ комнаты, совершенно избѣгать свѣжаго воздуха и одѣваться какъ можно теплѣе: это совершенно ложно. Напротивъ должно при благоприятной погодѣ, какъ можно долѣ гулять на чистомъ воздухѣ; это чрезвычайно облегчаетъ болѣзнь, уничтожаетъ головную боль и лихорадку. Передъ прогулкою должно выпивать нѣсколько стакановъ холодной воды, мыть ею шею, голову и грудь и по нѣскольку разъ втягивать еѣ носомъ въ себя: отъ этого и болѣзнь скоро прекратится. Но вмѣстѣ съ тѣмъ можно употребить слѣдующія гомеопатическія средства. Если бываетъ воспаленіе и лихорадка, то употребляютъ *Aconitum Napellus*; если насморкъ сопровождается сильнымъ кашлемъ, даютъ сверхъ того *Nux vomica*. Если кашель особенно бываетъ ночью и мѣшаетъ спать — *Hyoscyamus*. Сильный текущій насморкъ останавливается отъ *Euphrasia*. Если при этомъ бываетъ раздраженіе глазъ, гнетущая головная боль, ознобъ, потеря обонянія, истекающая мокрота дурно пахнетъ, то даютъ *Pulsatilla*. Если ноздри рас-

пухаютъ, губы трескаются, чувствуется сильная жажда, даютъ *Chamomilla*. Сильной сухой насморкъ при сильной сухости во рту, жаръ въ лицѣ, — краснотѣ щекъ, особенно вечеромъ, при постоянномъ зудѣ носа, раздражительномъ и сердитомъ расположеніи духа излѣчивается посредствомъ *Nux vomica*. При сухомъ насморкѣ у дѣтей, мѣшающемъ имъ сосать, вслѣдствіе задержки дыханія отъ чего они сильно и долго плачутъ, помогаетъ слѣдующее: натираютъ переносье какимъ нибудь жирнымъ веществомъ, на пр. миндальнымъ масломъ, или густыми сливками, и даютъ имъ втягивать носомъ паръ теплаго молока. Въ случаѣ недостатка обыкновеннаго отдѣленія мокроты изъ слизистой оболочки носа, намазываютъ, посредствомъ перышка, внутреннюю часть носа также какимъ нибудь жирнымъ веществомъ и тѣмъ самымъ восстанавливаютъ естественное отдѣленіе мокроты. Внутрь даютъ *Nux vomica*. О лѣченіи водой скажемъ въ слѣдующей статьѣ.

### ПРОСТУДНАЯ ЛИХОРАДКА.

Говоря о насморкѣ вообще, мы сказали, что съ нимъ соединяется также лихорадка, которая обнаруживается частою смѣною озноба и жара, жаромъ кожи, обрззгостию, и сильною краснотою лица, при постоянной сонливости и слабости, въ такомъ случаѣ даютъ сначала *Aconitum*, а потомъ нѣсколько приемовъ *Nux vomica*. Если лихорадка сопровождается сильнымъ текущимъ насморкомъ съ изъязвленіемъ носа и ревматическими болями въ членахъ, то даютъ *Mercurius vivus*, а если это средство не поможетъ то *Aurum*.



Насморкъ и соединенная съ нимъ лихорадка очень скоро проходятъ отъ внутренняго и виѣшняго употребленія холодной воды, которая снова укрѣпляетъ очень ослабѣвшую кожу. Для этого должно, чтобы очистить и укрѣпить кожу, втягивать носомъ холодную воду и класть на переносье холодные компрессы. Спустя нѣсколько времени послѣ этого, должно окунуть всю голову въ холодную воду, повторяя это понѣскольку разъ въ день, потомъ выкупаться и гулять долѣе на чистомъ воздухѣ. Если насморкъ и лихорадка произошли отъ простуды ногъ, то взять самыя холодныя ножныя ванны и потомъ завернуть ноги въ теплыя одѣяла; выпить одинъ стаканъ вина и завернувшись въ теплое шерстяное одѣяло, лечь въ постель, чтобы произвести сильный потъ. Потъ произведетъ кризисъ. Люди страдающіе по цѣлому году насморкомъ и катарромъ, скоро освобождаются при подобномъ леченіи отъ этого тягостнаго состоянія; слѣдовательно и тѣ, которые расположены къ этой болѣзни, имѣющіе размягченную, утратившую дѣятельность кожу и часто страдающіе насморкомъ, должны особенно придерживаться этихъ средствъ и не только при самой болѣзни, но и во всякое время чтобы предупредить вліяніе простуды. Кто уже привыкъ всякое утро и всякій вечеръ мыть себѣ глаза, голову и затылокъ холодною водою, втягивать ее носомъ и много пить ее, кто по крайней мѣрѣ два раза въ недѣлю моется или (что еще лучше) купается, въ холодной водѣ, тотъ со временемъ совершенно избавится отъ катарра и насморка. Всего лучше къ подобному леченію приучать дѣтей: они впоследствии будутъ за это благодарны родителямъ.

## ИСПУГЪ.

Испугъ есть внезапное, неожиданное возбужденіе всей внутренней дѣятельности человѣческаго организма и часто влечетъ за собой самыя дурныя послѣдствія; онъ можетъ часто убить человѣка мгновенно. Обыкновенныя слѣдствія суть: сильная головная боль, кислая отрыжка и рвота, ощущение тяжести въ нижней части живота, холодный потъ по всему тѣлу, судороги и дрожь въ членахъ, стѣсненіе дыханія, глубокий сонъ съ громкимъ храпѣніемъ, обморокъ и т. п. Раздражительные и чувствительные субъекты чаще и легче всего подвергаются дурнымъ послѣдствіямъ испуга. Лучшее средство послѣ испуга для предотвращенія дурныхъ послѣдствій есть *Orium*. Если же уже послѣ испуга прошло долгое время, то *Orium* не помогаетъ, но должно дать 1—2 приема *Aconitum Napellus* и потомъ *Sambucus*. Если подобное испугу чувство произведено радостнымъ извѣстіемъ, оно тѣмъ не мѣнѣе легко можетъ имѣть дурныя слѣдствія и въ такомъ случаѣ надо дать *Coffea cruda*, для успокоенія душевнаго волненія. Если съ испугомъ соединена печаль, огорченіе, то помогаетъ *Ignatia amara*; а если съ нимъ соединенъ ужасъ — *Belladonna*. Если случается, что испуганная особа близка къ обмороку, то дать ей какъ можно скорѣе приемъ *Orium*. Также и здѣсь вода можетъ принести большую пользу, только ее надо употреблять осторожностію. Испуганный долженъ выпить сначала очень не много воды, такъ чтобы она едва смочила языкъ и небо, потомъ чрезъ

нѣсколько минутъ по больше, потомъ еще больше и такимъ образомъ долженъ выпить цѣлый стаканъ. Онъ долженъ вмѣстѣ съ тѣмъ постепенно, сперва одинъ, потомъ вмѣстѣ все пальцы, далѣе кисть руки, и наконецъ всю руку опускать въ холодную воду; сперва натереть ему водой лобъ, потомъ смочить его, и наконецъ при сильной головной боли обложить всю голову холодными компрессами. Точно также поступать и съ нижнею частию живота и тѣмъ самымъ предотвратятся могущія произойти отъ испуга опасныя послѣдствія. При обнаруживающемся въ тѣлѣ расположеніи къ обмороку вспрыснуть больному холодной водой лицо и положить холодные компрессы на животъ, что произведетъ успокоительное дѣйствіе на все тѣло.

### МОЛОЧНИЦА.

Молочница состоитъ изъ маленькихъ, бѣленькихъ пузырьковъ или нарывчиковъ, образующихся на воспаленной слизистой оболочкѣ рта; сначала они бываютъ разбросаны отдѣльно, потомъ расширяясь все болѣе и болѣе, они сливаются одни съ другими и составляютъ сплошную кору. Имъ большею частию предшествуютъ: безпокойство и раздражительность, краснота и блѣдность лица попеременно и не большая опухоль полости рта. Неопрятность при кормленіи грудью дитяти, кислоты, образующіяся отъ этого въ желудкѣ, задержанное долго молоко, такъ называемыя соски, которыя даютъ для успокоенія дитяти, большею частию причиняютъ эту безпокойную болѣзнь. Дитя черезъ это не можетъ сосать и

безпрестанно кричитъ. Кислота въ желудкѣ, какъ основаніе болѣзни производитъ разстройство желудка рвоту и поносъ, голосъ дѣлается хриплымъ, дыханіе горячимъ. Мать тоже страдаетъ отъ молочницы дитяти, потому что дитя при сосаніи переноситъ ядъ на грудные соски матери и заражаетъ ихъ. Не должно употреблять тѣхъ средствъ, которыя предлагаютъ обыкновенно повивальныя бабки, такъ на пр. онѣ намазываютъ все пораженныя части рта бурою съ розовымъ медомъ, такъ что это еще болѣе вредитъ, чѣмъ помогаетъ и портитъ желудокъ. Вмѣсто этого надобно употреблять какъ главные средства: *Borax*, *Acidum sulphuricum* и *Mercurius vivus*. Польза *Natrum muriaticum* и *Calcareae carbonicae* также доказана. По *Borax* признано по опыту самымъ лучшимъ средствомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ должно оставить все эти противныя соски, обмывать ежедневно дитя свѣжей водой, слегка вытирать ребенку ротъ полотняной тряпочкой, обмоченной въ холодной водѣ, чтобы удалить содержащейся въ нарывчикахъ ядъ; груди матери передъ кормленіемъ и послѣ него обмывать тоже свѣжей водой, чтобы молоко не оставалось около сосковъ и не образовалось бы здѣсь кислоты; притомъ больше поить ее водой и дать нѣсколько приѣмовъ *Sulphur* и *Acidum sulphuricum*. Дитяти же давать гомеопатическія средство слѣдующимъ образомъ: взять чашку чистой воды, примѣшать сюда 2 капли означеннаго лѣкарства и давать ему черезъ 3—4 часа по чайной ложкѣ. Черезъ нѣсколько дней дитя непременно избавится отъ своей болѣзни.

### НЕДУГИ ПЕРІОДА БЕРЕМЕННОСТИ.

Многія женщины въ періодъ беременности, часто тотчасъ послѣ зачатія, страдаютъ многими недугами, какъ то: тягостью, потерю аппетита, расстройствомъ пищеваренія, тошнотою, рвотою, раздражительнымъ состояніемъ духа; часто у нихъ распухаютъ, особенно въ послѣднее время, ноги и венозные узлы выступаютъ наружу во многихъ мѣстахъ. Съ этимъ конечно нечего дѣлать, потому что всѣ эти припадки имѣютъ естественное основаніе и проходятъ вмѣстѣ съ родами, а иногда уже съ наступленіемъ седьмого мѣсяца беременности. Беременная женщина, если она вообще раздражительна, должна стараться быть постоянно въ веселомъ обществѣ и рисовать себѣ прекрасныя картины тѣхъ радостей, какія доставитъ ей находящееся подъ ея сердцемъ, когда оно родится на свѣтъ. При тошнотѣ, рвотѣ, разстроенномъ пищевареніи, запорѣ, помогаютъ нѣсколько приемовъ *Nux vomica*. Если кровь сильно волнуется, если беременная страдаетъ головою болью, головокруженіемъ, шумомъ и звѣномъ въ ушахъ; то одинъ, или два приема *Aconitum Napellus* доставятъ ей облегченіе, или если *Belladonna* не оказывается слишкомъ сильнымъ средствомъ, то можно бы дать одинъ слабый приемъ этого лѣкарства; такія беременныя должны пить больше холодной воды и въ недѣлю, хотя два раза, мыть все тѣло водой. Это не только разжижаетъ кровь, уменьшаетъ головную боль, уничтожаетъ запоры, тошноту и рвоту, но также много облегчить ихъ въ

трудные часы самыхъ родовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ и новорожденное дитя будетъ здорово и крѣпко. Если бы всѣ беременныя женщины употребляли это средство, то на сколько бы менѣе было опасности при родахъ и на сколько бы крѣпче были новорожденные дѣти, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ избавились бы множества губительныхъ, дѣтскихъ болѣзней!

### ГОЛОВОКРУЖЕНІЕ.

Головокруженіе есть такое состояніе при которомъ кажутся всѣ предметы вертящимися и тѣлу угрожаетъ паденіе. Это — скорѣе болѣзнь побочная нежели самостоятельная т. е. это есть симптомъ болѣзненнаго состоянія организма. Слишкомъ большой приливъ крови къ головѣ, неправильное пищевареніе, отягощеніе желудка, глисты, неправильное кровообращеніе, ослабленіе тѣла, вслѣдствіе потери жизненныхъ соковъ, или отъ раздраженія нервовъ, плаваніе по морю, сидѣніе въ экипажѣ спиною къ лошадамъ, суть главныя условныя причины этого припадка. Иногда головокруженіе предшествуетъ обмороку или удару. Многіе слабого сложенія бываютъ очень подвержены этимъ припадкамъ, потому имъ должно соблюдать строгую діету, чтобъ припадки головокруженія не сдѣлались слишкомъ опасными. Легкая растительная пища, воздержаніе отъ спиртныхъ напитковъ, избѣжаніе всѣхъ сильныхъ и скорыхъ движеній на пр. бѣганья, танцовъ и т. п., содержаніе ногъ въ теплѣ, моціонъ на свѣжемъ воздухѣ, обильное питье свѣжей ключевой воды, мытье и купанье въ ней устраняютъ эту болѣзнь. Вмѣстѣ



съ тѣмъ можно употреблять слѣдующія гомеопатическія средства. Если причиною болѣзни было отягощеніе желудка или запоръ, то принимать *Nux vomica*; если это непомогаетъ — *Opium*, если и это не окажетъ дѣйствія, то *Plumbum metallicum*. Если кровь слишкомъ сильно волнуется, или сгустится и бросившись въ голову, причинитъ сильную боль, шумъ и звонъ въ ушахъ, то даютъ *Aconitum Napellus*, а если это не поможетъ, то *Belladonna*. Если вмѣстѣ съ тѣмъ бываетъ тошнота и отрыжка, то даютъ *Pulsatilla* попеременно съ *Antimonium crudum*. Головокруженіе въ слѣдствіе потери жизненныхъ соковъ излѣчиваетъ *China*. Если головокруженіе случается за столомъ или тотчасъ послѣ него то это довольно опасно и нужно выпить нѣсколько стакановъ холодной воды и употребить одинъ приемъ *Nux vomica*, а потомъ *Rhus toxicodendron* или *Belladonna*. Если же головокруженіе есть признакъ другой какой нибудь болѣзни, то выше приведенныя средства не годятся, а настоящая болѣзнь должна быть предоставлена изслѣдованію искуснаго гомеопатическаго врача.

### ЗОЛОТУХА.

Золотуха есть собственно болѣзнь желѣзъ и лимфатической системы, преимущественно случается у дѣтей, и бываетъ очень часто весьма упорна. Дѣтскій возрастъ отъ 10 мѣсяцовъ до 10 лѣтъ преимущественно расположенъ къ этой болѣзни, безъ различія пола. Лимфатическія и брызжеечныя железы распухаютъ, кожа морщится, бѣлѣтъ, дѣлается почти

прозрачною, мускульная система слабѣтъ, цвѣтъ лица становится большею частію блѣдный, очень рѣдко красенъ; шея распухаетъ, нижняя часть живота вздувается, голова дѣлается до безобразія велика. Съ продолженіемъ хода этой болѣзни, желѣзы все болѣе и болѣе распухаютъ и наконецъ переходятъ въ злокачественныя, почти неизлѣчимыя нарывы. Глаза сильно воспаляются, появляется истеченіе изъ носа и ушей, разбуханіе и даже нагноеніе сочлененій, наросты на суставахъ, англійская болѣзнь, и къ тому присоединяется сильный раздражительный кашель, съ сильнымъ отхаркиваніемъ мокроты. Все болѣе и болѣе худѣющее тѣло дѣлаетъ замѣтнѣе болѣе и болѣе распространяющуюся сыпь. Изъ дѣтородныхъ частей (особенно женскихъ) истекаетъ острая производящая зудъ жидкость; также подчелюстные и подязычныя железы бываютъ поражены; во всѣхъ этихъ частяхъ образуются сначала не очень твердыя круглыя, подвижныя опухоли, или узелки, которые съ теченіемъ времени дѣлаются твердыми, постоянными, — легко воспаляющимися и вслѣдствіе того болѣзненными. Такъ какъ вообще глаза бываютъ тогда воспалены, то они дѣлаются чрезвычайно чувствительными къ свѣту, такъ что если лучи свѣта касаются ихъ, то они начинаютъ слезиться и вѣки судорожно закрываются. Изъ этого видно, что золотуха — болѣзнь чрезвычайно значительная, долговременная, хроническая, препятствующая совершенному развитію тѣла, иссушающая и ослабляющая его; уничтожается она при обыкновенномъ леченіи только въ позднѣйшемъ возрастѣ, оставляя по себѣ печальныя слѣды. Начальныя причины этой, въ высочайшей степени пагубной, болѣе должно искать въ наследственности; особен-

но встрѣчается эта болѣзнь у дѣтей, которыхъ родители, или кто нибудь одинъ изъ нихъ, былъ часто хроническаго, ревматическаго или сифилитическаго свойства, или былъ разслабленъ распутствомъ или тоже страдалъ золотухою. Дальнѣйшія причины этой болѣзни: излишняя изнѣженность дѣтей, пища, не соответствующая ихъ возрасту, неопытность тѣла и постоянное содержаніе ихъ въ комнатахъ, особенно сырыхъ, душныхъ. Къ несчастію бываютъ случаи, что совершенно здоровые дѣти подвергаются этой болѣзни чрезъ прививаніе коровьей оспы, и потому оспопрививатели должны съ большою осторожностію и совѣтливостію прискивать дѣтя, съ котораго они берутъ оспу. Чѣмъ здоровѣе дѣтя, чѣмъ свободнѣе отъ внутреннихъ болѣзней; тѣмъ лучше отъ него оспенная матерія.

Золотушное дѣтя въ началѣ леченія должно приучить къ самой правильной діетѣ. Надо соблюдать величайшую опрятность, мѣнять бѣлье по крайней мѣрѣ два раза въ недѣлю, ежедневно мыть тѣло свѣжею водою и пораженные золотухою мѣста обтирать можно губкою, окраплять и смачивать глаза тоже холодною водою. Пища должна быть питательная, однако должно избѣгать кислаго, соленого, жирнаго и въ особенности свиинны. Спиртныя напитки, употребляемыя обыкновенно для укрѣпленія, должно совершенно оставить, потому что они даютъ новую пищу развитію болѣзни; напротивъ должно пить, какъ можно болѣе холодной воды и больное дѣтя содержать въ чистомъ воздухѣ, а лучше всего въ деревнѣ. Также хорошо класть спать подобныхъ дѣтей на матрасы, набитые конскою гривой, потому что пухъ болѣе способствуетъ развитію болѣзни. Если продолжаютъ такой образъ жизни, въ особен-

ности употребляютъ холодную воду, какъ внутрь, такъ и снаружи, купалъ въ ней дѣтя по крайнѣй мѣрѣ два раза въ недѣлю, то дурные соки мало по малу растворяются, разслабленное тѣло снова получаетъ силу и полноту, отправления тѣла совершаются свободнѣе и по всему тѣлу разливается пріятный, здоровый румянецъ, замѣняя собою прежнюю блѣдность. Если это совершается довольно скоро, то даютъ слѣдующія гомеопатическія лѣкарства: вначалѣ болѣзни даютъ *Calcareæ carbonica*, *Baryta carbonica*, *Hepar Sulphuris*, *Carbo vegetabilis*, *Belladonna*, *Graphites*, *Creosotum*, *Staphysagria*, *Aurum fol.*, *Mercurius vivus*, *Phosphor.*, *Silicea*; также *Tinctura Sulphuris* есть средство, уже испытанное при этой болѣзни. Всего лучше совѣтываться съ гомеопатическимъ врачомъ и слѣдовать его предписаніямъ, но хотя бы этого захотѣлъ самъ врачъ, не оставлять ежедневнаго обмыванія и купанія въ водѣ. Это даетъ новую силу дѣйствію гомеопатическихъ средствъ. Въ возможно короткое время золотушное дѣтя не только выздоравливаетъ, но въ немъ даже не остается ни какихъ слѣдовъ золотухи, если только его будутъ лѣчить слѣдующими пятью средствами: строго и правильною діетой, питьемъ холодной воды, обмываньемъ ею, ваннами изъ нея и гомеопатіею.

### КОЛОТЫЕ ВЪ БОКУ.

Колотые въ боку есть воспаленіе реберной плевы и бываетъ или истинное, или фальшивое. Последнее болѣею частію есть только простая ревматическая боль, которая не всегда остается въ боку, а пере-

ходить на другія части груди, не имѣя ни одного изъ тѣхъ признаковъ, какими сопровождается воспаленіе реберной плевы. *Bryonia* — главное средство противъ этой болѣзни; помогаетъ также и *Nux vomica*. При истинномъ или дѣйствительномъ колотѣ въ боку бываетъ сначала дрожь, съ жаромъ и лихорадкою, твердый пульсъ и горячее дыханіе, потомъ присоединяется къ тому сильное колотье подъ ребрами, которое весьма усиливается отъ всякаго движенія и напряженія. Лице блѣднѣетъ, говорить больному становится очень трудно, особенно мѣшаетъ этому болѣзненный кашель, который обыкновенно сопровождается изверженіемъ кровянистой слюны. Къ вечеру и ночью лихорадка обыкновенно увеличивается, а вмѣстѣ съ тѣмъ усиливается и боль; къ утру же больному бываетъ легче. Эта болѣзнь есть слѣдствіе простуды, происшедшей отъ разгоряченія, или отъ неумѣреннаго питья; особенно суровые сѣверные и восточные вѣтры способны произвести эту болѣзнь. Вообще она сама по себѣ не опасна и при правильной діетѣ и нѣсколькихъ приемахъ сперва *Aconitum Napellus*, а потомъ *Bryonia* легко уничтожается; однако при не соблюденіи предписаннаго и при невоздержаніи принимаетъ очень опасный характеръ. Въ такомъ случаѣ должно поспѣшить призвать къ постели больного врача. Кто желаетъ скорѣе освободиться отъ этой болѣзни; тотъ при назначенныхъ лекарствахъ долженъ употреблять холодную воду, но только по назначенію врача. — Надо пить больше холодной воды и мыть ею больной бокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ купать въ ней все тѣло и ноги и заворачивать потомъ ихъ въ шерстяное одѣяло, отъ чего произойдетъ благотворительный потъ.

## ИЗЖОГА.

Она состоитъ въ особенномъ, жгучемъ, судорожномъ чувствѣ въ пищепріемномъ горлѣ и бываетъ обыкновенно у такихъ людей, у которыхъ пищеварительные органы ослаблены и при всякомъ отягощеніи желудка дѣлается боль въ животѣ. Въ особенности способствуетъ развитію этой болѣзни у такихъ людей употребленіе жирныхъ, трудно варимыхъ кушаній, на пр. сдобнаго печенья. Послѣ ощущенія жженія, изъ желудка поднимается въ ротъ чрезъ пищеводъ свѣтлая, чрезвычайно противная, острая жидкость; на зубахъ дѣлается оскомина и они скрипятъ. Главными средствами служатъ 2—3 приема *Nux vomica*, *Antimonium crudum* или *Pulsatilla*. Помогаетъ также и *Staphisagria*, если причиною изгаги было излишнее куреніе табаку. При этомъ надобно выпивать по нѣскольку стакановъ воды и воздерживаться отъ неудобоваримой пищи. Особамъ страдающимъ болѣе или менѣе изжогаю и слабостію желудка, полезно и леченіе водою, какъ сказано при слабости желудка, стр. 205.

## ВОСПАЛЕНІЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА У НОВОРОЖДЕННЫХЪ МЛАДЕНЦЕВЪ (SOOR).

Эта болѣзнь прежде всего обнаруживается необыкновенною краснотой полости рта, потомъ показываются на сильно покраснѣвшихъ мѣстахъ маленькія бѣловатыя полупрозрачныя точки, которыя въ ско-



ромъ времени принимаютъ бѣлый матовый или сѣрый, и наконецъ желтоватый цвѣтъ и бываютъ похожи на прилипшія къ этимъ мѣстамъ частички молока. Потомъ эти разрозненные точки мало по малу сближаются и наконецъ покрываютъ сплошь всю полость рта. Появляется слизистый, не пахучій гной подъ кожицей, который, прорвавъ ее, выступаетъ наружу, и легко отъ нея отдѣляется. Дитя притомъ бываетъ очень безпокойно, часто плюетъ, съ жаждой; припадаетъ къ груди и тотчасъ же отъ нея отрывается, потому что сказанная слизь, сильно раздражая ротъ, мѣшаетъ сосать. Кожа суха и горяча, крикъ соединенъ съ хрипомъ, испражненія жидки и смѣшаны съ клячами, которые суть не что иное, какъ проглоченныя частички сказанной бѣловатой слизи. Если болѣзнь распространится далѣе и поразитъ глотку, пищепріемное горло и кишечный каналъ, то нужно немедленно призвать врача, чтобы воспрепятствовать всеобщему разрушенію нѣжнаго организма дитяти. Причинъ этой болѣзни, кромѣ расположенія къ ней самаго дѣтскаго организма, надо искать въ сильномъ напряженіи рта отъ сосанія, при недостаткѣ молока, въ остротѣ молока, въ испорченности искусственныхъ сосокъ, которыя долго остаются во рту ребенка, и которыхъ онъ не покидаетъ даже во снѣ, въ нечистотѣ воздуха, сырости комнатъ, въ золотушномъ и сифилитическомъ ядахъ, которые переходятъ къ ребенку отъ матери или кормилицы вмѣстѣ съ молокомъ. Вотъ почему въ воспитательныхъ домахъ это болѣзнь бываетъ болѣе распространена и болѣе злокачественна.

Средства противъ этой болѣзни. Прежде всего надо содержать дитя въ опрятности, устранять не-

здоровую пищу, которая только поддерживаетъ болѣзнь, мѣнять кормилицъ, какъ скоро молоко ихъ окажется дурно; удалять всякаго рода соски; смачивать пораженные части рта (посредствомъ палочки, обвернутой корпіею) растворомъ 1 грана квасцовъ въ 16 золотниковъ воды. Какъ внутреннее средство можно употреблять *Mercurius solubilis*, а всего лучше *Borax venet.* Последнее средство можно давать и самой матери, сосочки которой могутъ заразиться отъ дитяти и причинять ей невыносимую боль при сосаніи. Хорошо ей также мыть себѣ грудь и сосочки холодною водою каждый разъ послѣ сосанія.

### СОБАЧЬЯ ОСПА.

Эта оспа схожа съ натуральною по своему виду, тѣмъ болѣе, что она показывается у однихъ въ то время когда, настоящая оспа бываетъ у другихъ, но при болѣе внимательномъ наблюденіи ее можно отличить отъ простой оспы, потому что послѣдняя показывается большею частію на лицѣ, а собачья оспа высыпаетъ по всему тѣлу. Этого рода оспа лишена также того особеннаго запаха, какой свойственъ простой оспѣ. Она въ своемъ теченіи не продолжительна, легка и не опасна. Раздражительныя особы могутъ при ней получить сильную лихорадку, но это состояніе нельзя назвать опаснымъ и 2-хъ 3-хъ пріемовъ *Aconitum Napellus* достаточно для прекращенія лихорадки. Противъ нея вода также есть хорошее средство; см. при Оспѣ, стр. 52.

## ОЖОГА.

Сюда какъ нельзя лучше относится правило Ганемана — чѣмъ болѣе, тѣмъ и лечись (*Similia similibus curantur*). Если ожогъ легокъ и незначителенъ, обожженное мѣсто надо поддержать надъ огнемъ и боль утихнетъ. Такъ какъ обыкновенная крапива производить дѣйствіе на тѣлѣ подобное ожогу и производить тѣже ощущенія: то мы имѣемъ въ крапивѣ (*Urtica urens*), или въ тинктурѣ ея; самое лучшее средство противъ ожоги; *Tinctura Urticae urentis* — можно получить въ каждой гомеопатической аптекѣ. Надо смачивать часто этимъ настоемъ обожженное мѣсто, пока боль не уймется совершенно, что случается раньше или позже, смотря по пространству ожога, только всегда скорѣе, нежели при другихъ средствахъ. При томъ не образуется никакихъ нарывовъ и ранъ. Также подогрѣтый винный спиртъ и водка уменьшаютъ и предохраняютъ отъ нарывовъ и ранъ. Если ожогъ занимаетъ большое пространство, то накладывать на обожженные части тѣла компрессы, смоченные въ подогрѣтомъ винномъ спиртѣ, и мѣнять ихъ каждый разъ какъ боль возобновится. Хлопчатая бумага или вага, наложенная слоями на обожженное мѣсто приносить также большую пользу. Если образовались пузырьки то ихъ надобно проколоть. Далѣе имѣемъ мы хорошее средство противъ ожоги въ обыкновенномъ мылѣ: наскобливъ его въ чашку, налить туда теплой воды, стереть это въ мазь и потомъ наложить на обожженное мѣсто, или намазать на тряпку и приложить

къ больному мѣсту поплотнѣе, чтобы прикрыть все обожженное мѣсто. Сначала это нѣсколько увеличитъ боль, но вскорѣ почувствуется облегченіе. Тряпка эта должна лежать цѣлый день или цѣлую ночь а потомъ надо перемѣнить ее. Это средство ускоряетъ заживленіе и уничтожаетъ всѣ признаки ожога.

## ОДЫШКА ДѢТЕЙ.

Одышка случается у дѣтей оттого, что родители или безразсудныя кормилицы и няньки выносятъ ихъ вдругъ на вѣтеръ; тогда дѣти должны вдыхать слишкомъ много воздуха, задыхаются и простужаются. Щемленіе подъ ложечкою, тоскливое задержаніе дыханіе, безпокойство, крикъ и притягиваніе ляшекъ къ животу вотъ слѣдствія одышки. Два или три приѣма *Chamomilla* быстро уничтожаютъ эти припадки.

## НАДОРВАНІЕ, НАДСАДА.

Если кто вѣбудъ съ усиленіемъ и съ величайшимъ напряженіемъ подниметъ съ земли чрезъ чуръ огромную тяжесть, которая ему не по силамъ, тотъ очень легко, какъ говорятъ, надрываетъ себѣ животъ; слѣдствіемъ этого бываетъ боль въ головѣ, въ груди, или въ животѣ и т. д. *Rhus toxicodendron*, а если это не принесетъ ожидаемой и достаточной помощи: то *Calcareae carbonica* — въ этомъ случаѣ специфическія средства. Съ большимъ успѣхомъ можно употреблять холодную воду, или въ видѣ ком-

прессовъ т. е. въ нѣсколько разъ сложенныхъ полотенцовъ, намоченныхъ холодною водою, которые положить на больное мѣсто, или въ видѣ обмыванія, окачиванія, растиранія больныхъ частей холодною водою.

### ВЫВИХЪ.

Вывихъ бываетъ, когда кости образующія составъ лишаются своего нормальнаго положенія, и сами собою никакъ не могутъ занять своего прежняго мѣста; тогда вывихнутую кость надо вправить, и это должно поручить опытному хирургу, хотя бы больной чувствовалъ самую незначительную боль. Тотчасъ послѣ вправки, надо сдѣлать перевязку чтобы предохранить составъ отъ новаго разъединенія. Перевязку должно намочить крѣпкою тинктурою изъ Arnica. Внутри надо дать нѣсколько приѣмовъ, Aconitum Napellus и потомъ Arnica montana. Чтобы не произошло онѣмѣнія должно вывихнутый членъ и снова вправленный осторожно приводить въ движеніе. Холодные компрессы тоже очень полезны и ихъ должно чаще мѣнять. При этомъ надо пить больше холодной воды.

### ПОВРЕЖДЕНІЕ СОЧЛЕНЕНІЙ. РАСТЯЖЕНІЕ СВЯЗОКЪ.

Хотя это болѣзненное состояніе схоже съ вывихомъ, но не такъ важно, какъ вывихъ. Оно происходитъ отъ сильнаго паденія или оступленія; поврежденный членъ распухаетъ, краснѣетъ воспа-

ляется и причиняетъ сильную боль, особенно при движеніи. Здѣсь помогаютъ тѣже самыя средства, какъ и при вывихѣ.

### ЗАПОРЪ.

Запоръ состоитъ въ томъ, что испраженія слишкомъ долго остаются въ прямой кишкѣ, отъ чего становятся чрезвычайно густыми, твердыми. Запоръ самъ по себѣ не есть самостоятельная болѣзнь, (чѣмъ и считаютъ его многіе) но когда къ нему присоединяются другіе болѣзненные признаки, какъ на пр. головная боль, тоскливость, сердцебіеніе, темнота передъ глазами и головокруженіе, въ такомъ случаѣ онъ становится самостоятельною болѣзнію, противъ которой нужно употребить надлежащія средства. Нѣкоторые особы испражняются въ продолженія 2—3 сутокъ одинъ разъ, не дѣлаясь больными, другіе же ежедневно 2 или 3 раза. Количествомъ вводимой въ тѣло жидкости условливается количество испраженій. Чѣмъ меньше человекъ пьетъ, или если онъ употребляетъ только одни спиртные напитки, тѣмъ меньше у него бываетъ испраженій. Чѣмъ болѣе пьютъ воды: тѣмъ правильнѣе и нормальнѣе бываютъ испраженія. Если человекъ при частомъ позывѣ къ испраженію не можетъ достигнуть цѣли, не смотря на всѣ его усилія и напряженія, въ такомъ случаѣ это есть дѣйствительный запоръ и тутъ необходима медицинская помощь; если же не бываетъ и самаго позыва, то это еще очень полезно, потому что всѣ питательныя начала пищи всасываются въ это время въ желудкѣ и кишечномъ каналѣ. Если же запоръ соединенъ съ другими припадками какъ



на пр. пученіемъ живота, потерю аппетита, жаждою, чувствомъ непріятной полноты, головною болью и т. д. то дать по 2—3 приѣма *Orium*, черезъ три часа; больной долженъ избѣгать неудобоваримаго кушанья, ѣсть меньше мяса, пить кофе, пиво, вино, больше воды, или кислаго молока, ѣсть не сырые, а спѣлые плоды, дѣлать больше движенія на чистомъ воздухѣ и кругообразно натирать мѣстность желудка и нижнюю часть живота холодною водою. Также можно поставить нѣсколько клистировъ изъ холодной воды. Если хоть сколько нибудь бываетъ испражнений, но онѣ бываютъ клейки, тверды и комковаты и если прямая кишка стужена: то надо принимать *Plumbum metallicum* черезъ каждые 3 часа. Если же запоръ сдѣлается отъ сильного отягощенія желудка, или послѣ поноса, который очень легко переходитъ въ запоръ; если притомъ тошнота, лѣнь къ работѣ, бессонница, стѣсненіе дыханія, дурной вкусъ во рту и совершенная потеря аппетита: то полезно *Nux vomica*. Но скорѣе всего болѣзнь устраняется водою. Она какъ растворяющее средство разжижаетъ окрѣпшія испраженія, и такъ сказать, своею тяжестью выводитъ ихъ вонъ. Острота желудочнаго сока уменьшается, жаръ и сухость желудка и кишечнаго канала умѣряются и устраняются; разстроенный кишечный каналъ приходитъ въ то нормальное состояніе, въ котораго онъ не можетъ совершать своихъ отправленій. Потому воду должно употреблять и внутрь и старужи. Частое питье холодной воды, обмываніе всего тѣла и особенно живота водою, купанье, ванны, клистиры изъ холодной воды, частая прогулка на свѣжемъ воздухѣ при умѣренной температурѣ, — все это побѣдитъ какой угодно запоръ и всѣ соединенные съ нимъ недуги.

## СУДОРОГА ВЪ ИКРАХЪ.

Судорога въ икрахъ, или сокращеніе ножныхъ мускуловъ, соединенное съ болью, происходитъ часто безъ всякой причины, не рѣдко во снѣ, рѣже при бодрствованіи и проходить само по себѣ очень скоро, часто чрезъ нѣсколько секундъ. Лучше всего помогаетъ здѣсь треніе, нажиманіе икръ. Совѣтуютъ также во время судорогъ крѣпче упираться ногою о кровать, что не всегда можно позволить. Если судороги случаются при снѣ: то принимать *Rhus toxicodendron*; кто часто ими страдаетъ тотъ избавится отъ нихъ нѣсколькими приѣмами *Veratrum album*, а также натираніемъ и мытьемъ ногъ въ свѣжей холодной водѣ.

## БОРОДАВКИ.

Бородавки суть маленькіе твердые наросты на кожѣ, которыя или сидятъ на ея поверхности или входятъ въ нее глубоко. *Sulphur* и *Dulcamara* суть главныя средства противъ обыкновенныхъ сухихъ маленькихъ бородавокъ. Если же онѣ нарывають, то дать *Arsenicum album*; а если точатъ кровь или гноятся, то *Causticum* (специфическое средство), также *Thuja*. Сухія бородавки, (самыя обыкновенныя) легко уничтожаются, особенно на пальцахъ, если всякій день или по нѣскольку разъ въ день, стучать по нимъ спичкою ножа.

## ВОДЯНКА.

Водяною болѣзнію называется такое болѣзненное состояніе организма, когда въ пустыхъ пространствахъ тѣла, въ подкожной клетчаткѣ, или въ другихъ какихъ нибудь полостяхъ собирается водянистая жидкость, и смотря по частямъ тѣла, въ которыхъ скопляется эта жидкость водяная болѣзнь называется подкожною, брюшною, грудною, головою. Эта самая злая и опасная болѣзнь и очень рѣдко бываютъ случаи совершеннаго выздоровленія отъ нея больного. Особенно между вышеупомянутыми водянками, грудная есть самая худшая и никакая помощь не спасетъ отъ нея, когда ею тамъ заражены и разрушены самыя благороднѣйшія части. Болѣзнь эту или ея симптомы легко узнать. На тѣхъ мѣстахъ, гдѣ собирается жидкость, появляется значительная опухоль, мягкая какъ тѣсно, которая при давленіи пальцемъ оставляетъ углубленіе, отпечатокъ. Натянутая кожа очень лоснится и между тѣмъ остается сухою. Опухоль между тѣмъ бываетъ колеблющаяся, зыблущаяся, отдѣленіе мочи значительно уменьшается. *Подкожная водянка* то распространяется по всему тѣлу, то ограничивается только одною частию тѣла, преимущественно ногами, или животомъ. *Брюшная водянка* бываетъ въ нижней части живота и узнается частию по опухоли этой части, частию по глухому звуку, какъ бы шлепанію, когда одною рукою ударяють по одной сторонѣ живота, а другою держатъ противоположную сторону. *Грудная водянка*, кромѣ общихъ всѣмъ водянкамъ признаковъ, имѣетъ еще тотъ характеристическій признакъ, что

страдающій ею чувствуетъ стѣсненіе дыханія, часто кашляетъ и всегда принужденъ класть голову высоко, чтобы не задохнуться. *Головная водянка* или *мозговая водянка* бываетъ большею частию у дѣтей; ее трудно узнать; это болѣзнь чрезвычайно острая, быстро прекращающая жизнь ребенка; она обыкновенно бываетъ вслѣдствіе воспаленія мозга. Есть также *хроническая головная водянка*, гдѣ объемъ головы значительно увеличивается. Эта болѣзнь или врожденная, или образуется въ слѣдствіе предшествовавшихъ какихъ нибудь болѣзней. Люди, страдающіе тою или другою водянкою, вмѣстѣ съ тѣмъ страдаютъ запорами и вѣтрами, въ высочайшей степени падаютъ духомъ, теряютъ аппетитъ, истощаются и пораженные части худѣютъ. Здѣсь ясно видна необходимость призванія искуснаго врача, потому что оба гомеопатическія средства: *Arsenicum album* попеременно съ *China* также *Helleborus niger* не достаточны. Но я уже сказалъ, что излѣчить эту болѣзнь чрезвычайно трудно. Такъ называемое выцѣживаніе, выпусканіе накопившейся жидкости конечно можетъ продлить жизнь больного и доставить ему облегченіе на нѣсколько времени; но жидкость собирается снова, пока не послѣдуетъ совершенное разрушеніе пораженныхъ частей и приведетъ за собою смерть. Выведеніе большого количества жидкости естественнымъ образомъ есть единственное спасительное средство, и если оно достигается, то болѣзнь скоро проходитъ.

Самое лучшее, единственное средство, которое при постоянномъ употребленіи помогло уже многимъ больнымъ водянкою, есть леченіе водою. Подъ руководствомъ опытнаго врача, если съ помощію своей холодности, тяжести и растворяющей силы она мо-

жетъ уничтожить запоръ, гнать мочу, очищать кровь, то признается единственно вѣрнымъ средствомъ для уничтоженія этой болѣзни, если она еще не развилась слишкомъ сильно и глубоко. Все таки не должно ждать немедленной помощи отъ этого леченія; но терпѣливо переносить всѣ непріятности, соединенныя съ этимъ леченіемъ. Потому что не достаточно, чтобы больной ежедневно пилъ много свѣжей охладной, ключевой воды: онъ долженъ брать одну, двѣ, три холодныя ванны въ день и какъ можно болѣе окачиваться и растираться водою. Рано утромъ выпивши нѣсколько стакановъ долженъ онъ взять самую холодную ванну, натерѣть сильно все тѣло и потомъ, не отеревшись завернуться сперва въ простыню и потомъ въ шерстяное одѣяло и такимъ образомъ лечь въ постель. Въ скоромъ времени, когда холодная дрожь начинаетъ уменьшаться, появляется постепенно возвышающійся жаръ и наконецъ выступаетъ сильный потъ, столь необходимый для успѣшнаго лѣченія. Когда потъ выступитъ очень сильно, больного, не давъ ему высохнуть, вторично сажаютъ въ ванну и поступаютъ какъ въ первомъ случаѣ. Это повторяютъ по крайней мѣрѣ до трехъ разъ, послѣ чего больному можно дать успокоиться и отдохнуть. Вечеромъ больной долженъ взять холодную ножную ванну, мочья ноги завертываютъ ему въ одѣяло, такъ что онъ скоро согрѣваются, потомъ пьетъ еще нѣсколько стакановъ воды и ложится спать. Само собою разумѣется, что при такомъ леченіи надо оставить все могущее дать новое развитіе болѣзни, какъ то спиртные напитки, трудно варимыя и производящія запоры кушанія. Только при этомъ леченіи можно ожидать помощи: вода здѣсь скорѣе помогаетъ чѣмъ

самыя дорогіе медикаменты. Приведемъ примѣръ подобнаго леченія, сообщенный профессоромъ Эртелемъ. Маіорша фонъ М... говоритъ о самой себѣ въ одномъ письмѣ: «Многіе искусные врачи пользовали меня, какъ опасно больную печенью, железы которой чрезвычайно затвердѣли и въ маленькой брыжейкѣ которой должно было по ихъ мнѣнію искать корень болѣзни. Употребленіе Висбаденскихъ и Карсбадскихъ водъ, хотя доставило мнѣ облегченіе, но когда я прошлый годъ поѣхала туда вторично: то тамошній докторъ объявилъ мнѣ, что болѣзнь взяла другое направленіе, что у меня сильная водянка. Другой врачъ подтвердилъ мнѣ это и посоветовалъ немедленно сдѣлать операцію. Я поѣхала въ Ландау и докторъ Д. сдѣлалъ мнѣ счастливо операцію, въ которой, при точномъ изслѣдованіи живота, ни одной части не нашли пораженною. Однакоже упомянутый докторъ, по свойству выпущенной жидкости вывелъ заключеніе, что я уже нѣсколько лѣтъ страдала этою болѣзнію и вѣроятно скоро упаду въ прежнее состояніе. Предсказаніе было справедливо, потому что, когда я чрезъ полгода пріѣхала въ Бамбергъ, тамошній лекаръ объявилъ мнѣ, что я снова должна быть подвергнута вторичной операціи. Въ Гессенѣ знаменитый докторъ хотѣлъ избавить меня отъ этого посредствомъ внутреннихъ средствъ, и я слѣдовала его рецепту въ продолженіе шести недѣль. Но мое невѣріе въ науку, къ счастью, предохранило меня отъ употребленія многихъ лѣкарствъ и потому желудокъ мой остался совершенно способнымъ къ долѣченію, я лѣчусь водою уже 3 мѣсяца. Рано, натошакъ, выпиваю я 2 кружки холодной, чистой, ключевой воды безъ всякой примѣси, потомъ чашку кофе съ булкою, чтобы предотвратитьъ



ознобъ. Тотчасъ потѣмъ я пью опять воду до 11-ти часовъ утра 2 кружки; потомъ умѣренно обѣдаю и ложусь часа въ 2 въ постель. Потомъ опять пью чашку кофе съ булкою и опять 2 кружки воды. Утромъ и послѣ обѣда 3 часа гуляю, въ хорошую погоду на воздухъ, въ дурную дома; въ 7 часовъ вечера ѣмъ легкій супъ и ложусь рано въ постель, сплю до полуночи, а послѣ полночи рѣдко. Предъ тѣмъ, какъ идти спать, мою я все тѣло холодною водою и чувствую себя гораздо лучше, нежели прежде леченія водою. Я твердо убѣждена, что безъ этого леченія я давно бы умерла. Уже ничѣмъ не излѣчимые запоры, которыми я страдала нѣсколько лѣтъ уничтожены; меланхолія, мой тайный врагъ, изгнана; соединенные съ моими страданіями геморрой и боль въ поясницѣ и груди, тоже меня уже не беспокоятъ.» Если бы эта дама употребляла ванны выше упомянутымъ образомъ: то вѣроятно она давно бы извѣстала насъ о своемъ совершенномъ выздоровленіи.

### БѢЛИ.

Это одна изъ женскихъ болѣзней. Она появляется то предъ менструаціями, то послѣ нихъ. Иногда бываетъ она слѣдствіемъ исторического худосочія, большею частію бываетъ у женщинъ сладострастныхъ и развратныхъ, или отъ зараженія при соитіи, или отъ частаго чрезмѣрнаго полового раздраженія. Лѣченіе послѣдняго рода бѣлей должно предоставить врачу гомеопату. *Mercurius vivus* и *China* при строгой діетѣ и воздержности отъ сладострастныхъ раз-

драженій, продолжительное и постоянное лѣченіе водою внутреннее и наружное суть самыя лучшія средства. Бѣли случающіяся у женщинъ хорошаго поведенія предъ мѣсячными очищеніями или послѣ нихъ, совершенно исцѣляются продолжительнымъ употребленіемъ *Sulphur* и *Natrum muriaticum*. Только при этомъ необходимо соблюдать строгую діету, воздерживаться отъ соитія, пить холодную воду и брать ванны. Особенно же должно нѣсколько разъ въ день обмывать холодною водою втородные органы и части съ ними сопрякосновенныя.

### РАНЫ, РАНЕНІЕ, ССАДИНЫ.

Здѣсь говорится конечно не о большихъ и глубокихъ ранахъ, лѣченіе которыхъ предоставляется хирургу, но только о маленькихъ ранкахъ и язвинахъ. Каковы бы они ни были прежде всего надо подумать объ очищеніи ихъ и остановленіи кровотеченія. Вымывши раночку, края ея соединяютъ и скрѣпляютъ, такъ называемымъ англійскимъ пластыремъ и смотрятъ чтобы они не разошлись снова; иначе ихъ нужно будетъ сшить. Тогда надо наложить тряпочку, смоченную водою съ *Agnica*, или прежде капнуть ея больше на края, пока они еще не соединены. Тряпочку все таки можно наложить. Если раненный потеряетъ чувства: то влить ему въ ротъ немного воды и уксуса. Когда это не поможетъ: то дать 1—2 приема *China*, также нѣсколько чайныхъ ложекъ хорошаго стараго вина и потомъ опять *China*. Вообще каждому пораненному надо дать для укрѣпленія 1 приемъ *China*. Полезно выпить нѣсколь-

ко стакановъ холодной воды и умѣренно полить раночку водою. Если рана незначительна, то достаточно вымыть ее водою и наложить тряпочку, смоченную водою изъ *Agnica*, и время отъ времени эту тряпочку мѣнять. Ссадины отъ многого хожденія или тѣды вылѣчиваются частымъ промываніемъ ихъ простою водою, или примочкою изъ *Agnica*. Такимъ же образомъ поступаютъ для излѣченія пролежней у больныхъ, которые долго оставались въ постелѣ. Для предохраненія отъ пролежней хорошо ставить подъ кровать больного большой сосудъ съ холодною водою и перемѣнять ее ежедневно. Ссадины и пролежни у грудныхъ младенцевъ заживаютъ отъ обмыванія или смачиванія больныхъ мѣстъ холодною водою и принятіемъ внутрь *Chamomilla*; не поможетъ это, давать *Mercurius vivus*, съ *Carbo vegetabilis* попеременно; если и это не окажетъ дѣйствія, и корень болѣзни окажется внутри, то дадутъ *Sulphur* и потомъ нѣсколько примовъ *Silicea*.

Хотя я уже сказалъ, что здѣсь идетъ рѣчь не о большихъ ранахъ которыя требуютъ врача или хирурга, но бываютъ случаи пораненія артеріи или пульса, и жизнь раненаго подвергнется опасности, если окружающіе его не подадутъ ему немедленной помощи до пріѣзда врача: въ такихъ случаяхъ я позволю себѣ замѣтить слѣдующее: Если перерѣзана артерія и изъ нея бьетъ фонтаномъ свѣтлая кровь, то повыше раны крѣпко перевязываютъ пораненный членъ, чтобы удобнѣе видѣть ортерію. Когда она выдвинется: то взявши пробку, разрѣзать ее вдоль и половинку ея круглой стороны наложить на артерію, сверхъ этого наложить компрессъ и стянуть все бинтомъ, до тѣхъ поръ пока не остановится кровь, предоставляя остальное леченіе приз-

ванному врачу. Больного кладутъ на постель, такъ чтобы раненный членъ лежалъ выше и даютъ два приема *China* и нѣсколько ложекъ винограднаго вина.

## ГЛИСТЫ.

Глисты не столько опасны для страждущаго ими, сколько безпокойны и мучительны, также это болѣзненное состояніе или страданіе есть большею частію условное; оно зависитъ отъ болѣзненнаго разстройства пищеварительныхъ органовъ и особенно отъ не правильного образа жизни, а большею частію отъ вредной пищи, даваемой родителями дѣтямъ. Самостоятельною болѣзнію глисты бываютъ рѣдко, почти никогда. Отсюда ясно, что эта болѣзнь можетъ быть уничтожена только перемѣною образа жизни и правильною діетою, а насильственное изведеніе глистовъ посредствомъ употребляемыхъ для того лекарствъ только на время выгонитъ нѣсколько глистовъ, но не воспрепятствуетъ развитію новыхъ. Дѣтямъ даютъ легкую, удобоваримую, впрочемъ питательную пищу, запрещаютъ кофе и всѣ разслабляющіе напитки, заставляютъ пить больше холодной воды, ежедневно моютъ имъ все тѣло, купаютъ ихъ, заставляютъ больше гулять на воздухѣ, запрещаютъ на нѣсколько времени спать на перинахъ, но замѣняютъ ихъ матрацами, а наконецъ даютъ имъ нѣсколько примовъ *Aconitum Napellus*, потомъ *China* и *Nux vomica* попеременно съ *Mercurius vivus*; отъ такого лѣченія дитя вскорѣ освобождается отъ глистовъ. Если эти средства не помогутъ, берутъ доктора для дальнѣйшаго пользованія.

## ПРОРЪЗАНІЕ ЗУБОВЪ У ДѢТЕЙ.

Прорѣзаніе зубовъ у дѣтей часто сопровождается различными припадками, и часто, особенно у дѣтей слабаго сложенія, соединено бываетъ съ опасностію жизни. Если видятъ, что зубы прорѣзываются тяжело и показываются опасные симптомы, то родители уже изъ любви къ дѣтямъ должны прибѣгнуть къ помощи врача. Если же страданія при этомъ не такъ сильны, не соединены ни съ какими другими болѣзненными припадками, тогда этотъ процессъ можно предоставить самой природѣ. Такъ какъ мѣсто на деснѣ гдѣ прорѣзываются зубы сильно раздражается; то можно положить дитяти корочку чернаго хлѣба для жеванія, отъ чего раздраженіе уменьшается и мѣсто становится способнѣе для прорѣзанія зуба. Также частое треніе и нажатіе этого мѣста пальцемъ облегчаетъ дитя. Когда прорѣзываніе сопровождается лихорадочными припадками: то даютъ внутрь нѣсколько приѣмовъ *Aconitum Napellus* и потомъ *Coffea cruda*, а если дѣти были приучены къ кофею то *Chamomilla*; если же у ребенка запоръ: то *Nux vomica*. Въ упорнѣйшихъ случаяхъ *Opium*. Если же зубы рѣжутся слишкомъ тяжело, и выше упомянутыя средства не помогутъ: то дать *Belladonna* въ нѣсколькихъ приѣмахъ. При появленіи другихъ болѣзненныхъ признаковъ должно призывать доктора. Также и дѣтямъ во время прорѣзыванія зубовъ употребленіе холодной воды приноситъ большую пользу. Лучше всего чрезъ 14 дней послѣ рожденія приучать дитя къ холодной водѣ, т. е. къ ежеднев-

ному обмыванію ею и также давать иногда пить по нѣскольку чайныхъ ложекъ холодной воды, что очень укрѣпитъ ребенка, такъ что онъ легко вынесетъ періодъ прорѣзыванія зубовъ, и этимъ средствомъ устранятся многія болѣзни, развитіе которыхъ дѣлало бы опаснымъ прорѣзаніе зубовъ. Въ самый періодъ прорѣзанія надо мыть или купать дитя въ холодной водѣ, потому что приученное къ холодной водѣ дитя чувствуетъ себя въ ней очень хорошо.

## ЗУБНАЯ БОЛЬ.

Кто когда либо страдалъ настоящею зубною болью, и знаетъ, какъ сильна она и до какого невыносимаго страданія можетъ достигнуть, тотъ конечно охотно пожелаетъ узнать вѣрныя средства противъ нея. Къ несчастію они до сихъ поръ не отысканы, даже если причина болѣе извѣстна. Одному помогаетъ то, другому другое средство, но всѣ эти средства помогаютъ только на время и боль возвращается снова и остается единственное средство вырывать зубъ, если онъ гнилой; потому надо бы немедленно вырывать зубъ, а не подвергаться добровольно сначала цѣлымъ днямъ мученія. Гомеопатическія средства не всегда помогаютъ; аллопатическія тоже, но послѣднія не рѣдко еще способствуютъ порчѣ прочихъ здоровыхъ зубовъ. Зубная боль бываетъ или самостоятельна или происходитъ отъ другой какой нибудь болѣзни. Первая бываетъ тогда, когда зубъ дѣлается пустымъ и входящій туда воздухъ раздражаетъ зубной нервъ. Противъ этой зубной боли, (которая есть самая сильная) если зубъ



не можетъ быть выдернуть, помогаетъ *Odontonecrosyn*, попеременно съ *Chamomilla*; еще лучше взять зубную пломбу и залѣпить имъ пустоту больного зуба. Если мы уже знаемъ, что боль происходитъ отъ пустоты зуба: то излишне будетъ упоминать здѣсь о ближайшихъ признакахъ этой болѣзни. Если зубная боль есть ревматическаго свойства, если не одинъ зубъ болитъ, но боль эта чувствуется и въ другихъ, если она происходитъ отъ легкой простуды или перехода отъ горячаго къ холодно-му кушанью: то помогаетъ *Nux vomica*. Если зубъ болитъ именно при влѣханіи холоднаго воздуха: то употребляютъ *Hyoscyamus*; это средство помогаетъ и тогда, когда боль становится невыносима. Если при зубной боли показывается на щекѣ краснота то совѣтуютъ употреблять *Chamomilla*. Если боль бываетъ сверлящая, дергающая: то помогаетъ *Nux vomica*. Если кажется, что больной зубъ удлиняется, то употребляютъ *Arnica montana* или *Arsenicum album*. Последнее средство употребляютъ также въ такомъ случаѣ, когда отъ сильной боли человѣкъ приходитъ въ изступленіе, или бѣшенство, при этомъ *Arsenicum album* даютъ попеременно съ *Belladonna*. Если дерганіе отдается въ голову и уши, если налившаяся десна отстаетъ отъ зуба: то даютъ *Antimonium crudum*. Кромѣ названныхъ средствъ употребляютъ еще: *Coffea cruda*, *China*, *Calcearea carbonica*, *Hepar Sulphuris*, *Mercurius vivus*. (Это средство помогаетъ преимущественно тѣмъ людямъ у которыхъ зубы разрушены ртутью, а десны стали губковаты и кровоточивы). *Pulsatilla*, при ознобѣ, когда подергивающая боль ощущается даже въ головѣ и ушахъ и кажется, что зубной нервъ то вытягивается, то сжимается; *Rhus toxicodendron*, *Staphys-*

*agria* (особенно последнее средство) — при ревматическихъ боляхъ, пустотѣ зубовъ, кровотеченіи, опухолѣ, блѣдности и нарываніи десенъ.

Холодная вода тоже очень полезна при зубной боли; но и здѣсь должно сказать правду, что и это прекрасное, сильное средство не всегда помогаетъ. Когда берутъ холодную воду и держатъ ее на той сторонѣ, гдѣ болитъ зубъ: то боль прекращается почти мгновенно, но скоро возобновляется, какъ только вода согрѣется, это будетъ повторяться если бы вы и полдня держали воду. Погруженіе щеки въ сосудъ, наполненный холодною водою, имѣетъ тоже дѣйствіе, но боль всетаки возвращается. Тоже самое бываетъ при погруженіи всего тѣла въ воду и прикладываніи холодныхъ компрессовъ. Медленное вливаніе холодной воды въ ухо той стороны гдѣ чувствуется боль облегчаетъ ее, но совершенно не уничтожаетъ ее и можетъ повести еще за собою головную боль. Больше помогаетъ погруженіе ногъ въ холодныя ванны, минутъ на десять, при чемъ надо старательно тереть ноги и потомъ завернуть ихъ въ шерстяное одѣяло, не давъ еще имъ обсохнуть. Потомъ больной долженъ лечь въ постель. Если и это не поможетъ, при томъ если не гнилой зубъ причиняетъ боль и его нельзя выдернуть: то взявши холодную ванну, тѣло пока оно еще не обсохло обернуть сперва въ мокрую простыню, а потомъ въ шерстяное одѣяло и лечь въ постель, только не на перину, перья которой нерѣдко только усиливаютъ боль, и выжидать сильного пота. Потъ надо поддерживать долѣе и боль уймется.

## АНГЛІЙСКАЯ БОЛѢЗНЬ.

Англійская болѣзнь есть только мелификація, или измѣненіе золотухи, или просто золотуха въ другомъ видѣ и появляется болѣею частію въ періодъ зубовъ или послѣ него, у дѣтей отъ 9 мѣсяцовъ до 2 лѣтъ. Боль сосредоточивается преимущественно въ костяхъ. Дѣти одержимыя этою болѣзнію, не могутъ ни хорошо ходить, ни держаться на ногахъ; и задерживаются въ ростѣ. Лицо дѣлается старообразнымъ и искажается, кожа сохнетъ и желтѣетъ, вѣки распухаютъ, животъ сильно вздувается, тѣло сильно худѣетъ, тогда какъ умственные и душевные силы преждевременно развиваются. При томъ бываетъ упорный запоръ, попеременно съ поносомъ, вѣтры, колики, тошнота, дурной запахъ изо рта; моча пахнетъ аммоніакомъ. Сильныя кислоты развиваются во всемъ тѣлѣ. Но самая боль ощущается собственно въ костяхъ. Концы цилиндрическихъ костей припухаютъ, суставы толстѣютъ особенно на ногахъ, въ кистяхъ, колѣнкахъ и локтяхъ, которыя потому кажутся двойными. Оттуда и нѣмецкое названіе англ. болѣзни: *Zweiwuchs* — *двойной ростъ*. Всѣ кости принимаютъ неестественное образованіе, даже челюстные кости бываютъ совершенно искажены, а череповыя расмягчаются и принимаютъ другую форму. И это искаженіе костей становится еще замѣтнѣе въ томъ случаѣ, когда руки и ноги дѣлаются ощутительно тоньше. Я не буду болѣе рассказывать признаковъ англійской болѣзни, потому что онѣ слишкомъ ясны и рѣзки. Первоначальныя причины

этой болѣзни тѣже самыя, которыя производятъ и золотуху, только образованіе матеріи, изъ которой она развивается, происходитъ иначе. Здѣсь предписывается такое же лѣченіе, какъ и при золотухѣ — измѣненія въ образѣ жизни и пищѣ ребенка, и соблюденіе надлежащей опрятности. Но самое пользованіе болѣзни должно предоставить опытному врачу. Лучшія гомеопатическія средства для приготовительнаго леченія англійской болѣзни, до прибытія доктора, суть: *Calcareæ carbonica*, *Phosphor. acidum*, *Acidum nitri*, *Petroleum*, *Rhus toxicodendron* и *Sulphur*. При наступленіи костоѣды *Silicea*.

И при этой болѣзни лѣченіе водою могло бы быть очень полезно и дѣйствительно: но его надо поддерживать довольно долгое время. Здѣсь употребляютъ холодныя ванны, и описанное выше обертываніе мокрою простыней и одѣяломъ, для произведенія пота. Какъ должно поступать при этомъ, уже объяснено прежде. При этомъ надо заставлять ребенка пить какъ можно болѣе холодной воды.

КОНЕЦЪ.

## ОПЕЧАТКИ.

| Стр. | Напечатано :           | Должно быть :   |
|------|------------------------|-----------------|
| 1    | сверху 6 послѣдняя     | послѣдняя       |
| 18   | снизу 9 2-хъ стакановъ | 12-ти стакановъ |
| 42   | сверху 14 эрѣвн        | эрѣвн           |
| 84   | — 17 Ганнеманъ         | Ганеманъ.       |
| 90   | — 17 Carbonica         | carbonica       |
| 114  | снизу 3 поразить       | поразить        |
| 228  | — 1 выборъ             | выборъ.         |

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

### А.

Англійская болѣзнь 288.  
Аноплексія 27.  
Аппетитъ, потеря его 29.

### Б.

Бессонница 232.  
Беременность, недуги во время ея 260.  
Біеніе сердца 164.  
Блѣдная немощь 57.  
Бокъ, колотье въ немъ 263.  
Боли послѣродовыя 222.  
— при мочеиспусканіи 160.  
Боль въ поясницѣ 192.  
— головная 184.  
Болѣзнь падучая 97.  
Болячки на лицѣ у дѣтей 27.  
Бородавки 273.  
Бѣли 280.

### В.

Верёда 63.  
Вкусъ противный 142.

Вода, употребленіе ея вообще 8.  
Водобоязнь отъ укушенія бѣшеною собакою 168.

Водянка 276.

— брюшная 276.  
— головная 277.  
— головная хронич. 277.  
— мозговая 277.  
— подкожная 276.

Волосы, выпаденіе ихъ 42.

Воспаленіе въ груди 73.

— — животѣ 47.  
— — мозгу 138.  
— — глазъ 33.  
— — у поворожденныхъ 38.  
— — глотки 138.  
— — желудка 201.  
— — лёгкихъ 200.  
— — печени 197.  
— — пищенріемнаго горла 158.  
— — почекъ 234.  
— — слизистой оболочки рта у новорожд. 267.  
— — уха 238.

Воспаленія наружныя, переходящія въ нарывы 93.



Воспалительная горячка 166.  
— — — лихорадка 96.

Вѣтры въ животѣ 30.

Вывихъ 272.

Выкидышъ 122.

Выпаденіе волосъ 42.

## Г.

Гастрическая лихорадка 134.

Геморрой 134.

Геморроидальная колика 182.

Глистная колика 183.

Глисты 283.

Глухота 139.

Гнилость во рту 220.

Голова, приливъ крови въ ней 24.

Головная боль 184.

Головокруженіе 261.

Голодъ, подаеніе помощи умирающимъ отъ него 109.

Гомеопатическія лѣкарства 9.

Горячка воспалительная 166.

— лазаретная 228.

— нервная 223.

— — медленная 227.

— послѣрозовая 179.

Гриппъ 133.

Грудица 70.

Грудь, воспаленіе въ ней 73.

— приливъ крови къ ней 24.

— спазмы въ ней 77.

Грыжа пупочная 221.

Грыжи 68.

## Д.

Діета 4.

Досада 21.

Дыханіе зловонное 31.

## Ж.

Желтуха 141.

Желудокъ, воспаленіе его 201.

— — испорченный 207.

— — катарръ его 207.

— — ослиженіе его 207.

— — слабость его 203.

— — спазмы въ немъ 202.

Желчная лихорадка 133.

Животъ, воспаленіе въ немъ 47.

— вѣтры въ немъ 30.

— приливъ крови къ органамъ его 24.

— рѣзь въ немъ 181.

Жилы, узлы на нихъ 20.

## З.

Задохнувшіеся, о спасеніи ихъ 118.

Замерзшіе, помощь имъ 104.

Запоръ 273.

Затвердѣніе печени 199.

Зловонное дыханіе 31.

Зобъ 194.

Золотуха 262.

Зубная боль 283.

Зубы, прорѣзаніе ихъ у дѣтей 284.

Зудъ въ заднемъ проходѣ 134.

— — кожѣ 162.

## И.

Играніе на фортеціано, утомленіе рукъ отъ того 30.

Изжога 267.

Икота 233.

Ипохондрія 172.

Испорченный желудокъ 207.

Испугъ 237.

Истерика 176.

## К.

Катарръ желудка 207.

Кашель 170.

Кожа, растрескиваніе ея 34.

Коклюшъ 177, 172.

Колика 181.

— геморроидальная 182.

— глистная 183.

— отъ простуды 182.

— отъ скопленія вѣтровъ въ животѣ 30.

— свинцовая 183.

Колотые въ боку 263.

— — селезенкѣ 220.

Корь 210.

Кошмаръ 22.

Крапивная лихорадка 231.

— — сыпь 129.

Красуха 247.

Кровавый поносъ 248.

Кровотеченіе горломъ 60.

— — изъ лёгкихъ 62.

— — — матки 62.

— — — носу 223.

Кровохарканіе 60.

Круть 63.

## Л.

Лёгкіе, воспаленіе ихъ 200.

Летучая оспа 33.

Лихорадка 123.

— — воспалительная 96.

— — гастрическая 134.

— — желчная 133.

Лихорадка крапивная 237.

— — молочная 217.

— — простудная 233.

— — родильная 179.

Лицо, болячки на немъ у дѣтей 27.

Лишай 127.

Ложная оспа 33.

Ломота 143.

## М.

Мозгъ, воспаленіе въ немъ 138.

Мозоли 167.

Молиа, пораженные ею 38, 114.

Молоко, недостатокъ его у кормящихъ грудью 218.

— переносы его 219.

— разлитіе его 219.

— рвота имъ у дѣтей 213.

Молочная лихорадка 217.

Молочница 238.

Моченспусканіе болѣзненное 160.

Мѣсячное очищеніе неправильное 213.

## Н.

Навалъ 22.

Напорваніе 271.

Надсала 271.

Нарывы въ слѣдствіе наружныхъ воспаленій 93.

— на пальцѣ 123

Насморкъ 233.

Недостатокъ молока у кормящихъ грудью 218.

Недуги періода беременности 260.

Немощь блѣдная 37.

Неправильные и трудные роды 232.

Нервная горячка 228.

Ноготьда 128.

## О.

Обжорство 163.

Обморокъ 238.

Одышка дѣтей 271.

Ожога 270.

Ошмѣлость членовъ 94.

Опухоль щекъ 43.

Ослизненіе желудка 207.

Оспа 52.

— летучая 55.

— ложная 55.

— собачья 269.

Остановка регулъ 213.

Отмороженные члены, лечение ихъ 107.

Охриплость 162.

Очищеніе мѣсячное неправильное 203.

## П.

Падучая болѣзнь 97.

Память, слабость ея 136.

Паразитъ 198.

Парша 180.

Переносы молока 219.

Перепопчатая жаба см. крупъ.

Печень, воспаленіе въ ней 197.

— затверденіе ея 199.

Писаніе, утомленіе руки отъ того 30.

Поврежденіе ногъ 133.

— — сочлененій 272.

Повѣщенные, подаваніе помощи имъ 103.

Подавившіеся, подаваніе помощи имъ 103.

Полагра 143.

Помятія 242.

Поносъ 91.

— кровавый 248.

Пораженные молніею 88, 114.

Послѣродовая горячка 179.

Послѣродовыя боли 222.

Потеря аппетита 29.

Потрясеніе тѣла 117.

Потъ скрывшійся ногъ 131.

Почки, воспаленіе ихъ 234.

Поясница, боль въ ней 192.

Преждевременные роды 122.

Приливъ крови къ головь 24.

— — — груди 24.

— — — органамъ живота 24.

Пролежни 33.

Прорѣзаніе зубовъ у дѣтей 284.

Просовидная сыпь 128.

— — — — — скарлатинная 240.

Простуда 110.

Простудная лихорадка 253.

Противный вкусъ 142.

Пупочная грыжа 221.

Пьянство 49.

## Р.

Разлитіе молока 219.

Раковое худосочіе 191.

Ракъ 191.

Раненіе 281.

Раны 281.

Растрескиваніе кожи 34.

Растяженіе связокъ 272.

Рвота 101.

Рвота молокомъ у дѣтей 215.

Ревматизмъ 243.

Регулы, неправильности и остановка ихъ 213.

Родильная лихорадка 179.

Роды неправильные и трудные 232.

— преждевременные 122.

Рожа 245.

Рѣзь въ животѣ 181.

## С.

Свищовая колика 183.

Связки, растяженіе ихъ 272.

Селезенка, колотье въ ней 220.

Сердцебиеніе 164.

Скарлатина 250.

Скарлатинная просовидная сыпь 240.

Слабость желудка 203.

— — — — — памяти 136.

Слизистая оболочка рта, воспаленіе ея у новорожденныхъ 267.

Слѣпота 58.

Собачья оспа 269.

Солитеръ 44.

Сочлененія, поврежденіе ихъ 272.

Спазмы 186.

— внутренние 187.

— въ груди 77.

— желудка 202.

— челюстей 188.

Ссадины 242, 281.

Столбнякъ 189.

Стрѣльба въ ушахъ 239.

Судороги въ груди 77.

— — — — — икрахъ 273.

Сухотка у дѣтей 88.

Сыпь просовидная 128.

— — — — — скарлатинная 240.

## Т.

Темная вода 58.

Тифъ 225, 228.

Трудные и неправильные роды 232.

## У.

Удавленные, подаваніе помощи имъ 103.

Ударъ 27.

Узлы на жилахъ 20.

Укушеніе бѣшеною собакою 168.

Утомленіе вообще 112.

— руки во время писанія или игравія на фортепіано 30.

Утопленіе, о спасеніи ихъ 119.

Ухо, воспаленіе его 238.

— шумъ въ немъ 237.

Уши, стрѣльба въ нихъ 239.

Ушибы 242.

## Ф.

Фистула 126.

Флюсъ 43.

## Х.

Хиарагра 145.

Холера 79.

Хроническая головная воднянка 277.

Худосочіе раковое 191.

**Ц.**

Цынга 220.

**Ш.**

Шумъ въ ушахъ 237.

**Ч.**

Чахотка 13.

Чесотка 190.

Чесъ 162.

Чирьи 63.

Члены отмороженные, леченіе  
ихъ 107.**Щ.**

Щека, опухоль ея 43.

**Я.**

Язвы 143.